

*Herm.
A.
Hesse
1949/50*



Preisliste

Wiederverkäufer

ire ich auf sämtliche Preise dieses
chnisses

25 % Rabatt.

HERM. A. HESSE
BAUMSCHULEN
WEENER (EMS)

ist-BAUME rein NETTO-PRINSE

Gegründet 1879



Herbst 1949

1950 Frühjahr

70. Jahrgang

Preis- und Sortenliste

über winterharte Freilandpflanzen
aller Art von

Herm. A. Hesse

Baumschulen

(23) WEENER (EMS)

Ostfriesland (Land Niedersachsen)

Bankverbindungen:

Landeszentralbank
216/92 in Leer-Ostfr.
Oldenburgische Landesbank, Filiale Leer,
Leer (Ostfrld.)

Sparkasse (Zweck-
verbandssparkasse)
Weener-Holthusen,
Weener (Ems)

Draht-Anschrift:

Hesse Baumschulen
Weener

Postcheckkonto:

Hannover 1342

Fernsprecher:

Weener 117

★

Markenbaumschulen

Mitglied des Bundes
deutscher Baumschulen
(B.d.B.) und zahlreicher
weiterer Fachorgani-
sationen.

★

Reisevertretung:

H. H. Rulemann Grisson,
(24a) Ahrensburg (Holst.)
Manhagener-Allee 9

Meine sehr verehrten Kunden!

Es freut mich, durch das Erscheinen dieses Verzeichnisses die immer wieder an mich herangebrachten Wünsche nach einem neuen Hesse-Katalog erfüllen zu können.

Ich bin mir bewußt, daß es leider nur erst ein bescheidener Anfang sein kann, da mir die drucktechnischen Feinheiten und Möglichkeiten noch nicht wieder zur Verfügung stehen.

Der Inhalt möge Sie aber davon überzeugen, daß ich auf dem besten Wege bin, die Reichhaltigkeit meiner Sortimente auf allen Gebieten der Freilandpflanzen wieder in bester Kulturware anzubieten.

Die angeführten Pflanzen versetzen jeden Käufer durchaus in die Lage, Wirtschaftlichkeit eines Gartens mit Schönheit und Wohnlichkeit in Einklang zu bringen.

Ich lade zum Besuch meiner ausgedehnten Kulturen ein — Gesamtbetrieb ca. 80 Hektar Sand-, Lehm- und Moorboden — und bitte bei beabsichtigtem Besuch an Sonnabend-Nachmittagen sowie an Sonn- und Feiertagen um vorherige Verständigung.

Ich bitte, mich auch weiterhin mit Ihren Aufträgen zu beehren und werde stets bemüht bleiben, durch mustergültige Belieferung mir Ihre Zufriedenheit zu erhalten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Herm. A. Hesse, Baumschulen

(23) Weener (Ems)

Obstsortiment

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstgehölzen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BDB) entspricht.

Vor Neuanlage einer Erwerbsobstpflanzung wende man sich wegen der Sortenwahl an die örtlich zuständige Landwirtschafts- oder Bauernkammer, wo die Erfahrungen der Praxis in bezug auf Bewährung der einzelnen Sorten niedergelegt sind. Dort ist auch Auskunft zu erlangen über staatliche Zuschüsse für Neupflanzungen.

Äpfel

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme, a. Wildlg. u. EM XVI, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme, „ „ „ 7—9 „ „	4.—	—
Halbstämme, „ „ „ 6—8 „ „	3.50	—
Buschbäume, a. EM II, IX, XI, XVI, 2jährig	3.50	280.—
„ „ „ 3—4 „ „	4.—	320.—
Cordons, Schnurbäumchen, a. EM II u. IX		
senkrechte, 2jährig	3.—	—
„ 3—4jährig	3.50	280.—

Apfelsorten

Die Buchstaben H, M, h, B, C bedeuten, daß die betreffende Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Halbstamm, Busch oder senkrechter Cordon lieferbar ist, „+“ bedeutet selbstfertil oder guter Pollenspender, „-“ bedeutet das Gegenteil, die Sorte muß also mit einer Pollenspender-sortenart zusammengepflanzt werden, um guten Fruchtansatz zu erreichen.
Die römischen Zahlen der letzten Rubrik geben den Monat an, in dem die Sorte ihre Genußreife erlangt.

H M h B C Adersleber Kalvill	+ Tafelapfel	XI—III
H M h B C Allington	+ Tafelapfel	X—XII
H M - B C Baumanns Renette	+ Winter-Tafelapfel	XII—II
H M h B C Blesterfelder Renette	— Tafelapfel	X—XII
- - - B C Blenheimer Goldrenette	— Tafelapfel	XII—II
- - - B C Charlamowsky	+ Koch- u. Marktapfel	VIII—IX
- - - B - Coulons Renette	— Tafel- u. Küchenapfel	
	Beste für Moorboden	XII—III
- - - B C Cox' Orangen-Renette	— Tafelapfel	XI—I
H M h B C Croncels	+ Tafel- u. Kompottapfel	IX—X
- - - B C Danziger Kantapfel	+ Winter-Tafelapfel	X—XI
- M - - Englscher Winterprinz	+ Tafel- u. Wirtschafts-	I—II
H M h B C Geheimrat Oldenburg	+ Für Massenanbau	X—XII
- M h B C Geheimrat Wesener	+ Tafelapfel	XII—IV
H M h B C Goldparmäne	+ Tafelapfel	XI—I
H M h B C GrahamsJubiläumsapfel	+ Tafel- u. Küchenapfel	XI—I
H M - B C Gravensteiner	— Tafelapfel	IX—XII
H M h B C Groninger Krone	— Tafelapfel	III—IV
- - - B - Großherzog Friedrich	+ Wirtschaftsapfel	X—XII
H M h B C Jakob Lebel	— Tafel- u. Wirtschafts-	X—XII

Apfelsorten (Fortsetzung):

H M h B - James Grieve	+ Herbst-Tafelapfel	IX—X
- - B C Jonathan	+ Tafelapfel	XII—VI
H M h B C Klarapfel	+ Früher Tafel- u. Küch.	VII—VIII
- M h B C Krügers Dickstiel	+ Tafelapfel	IX—III
H M h B C Landsberger Renette	+ Tafel- u. Wirtschafts-	XI—XII
- - B - Moringer Rosen	— Tafelapfel	X
- - B C Nathusius Taubenapfel	+ Tafelapfel	XII—IV
H M h B C Neuer Berner Rosen-	+ Tafelapfel	XI—I
H M h B C Ontario-Apfel	+ Winter-Tafelapfel	I—V
H M h B - Ostfriesischer Kalvill	+ Weihnachtsapfel	X—I
- - B C Peasgoods Sondergleich.	+ Tafelapfel	X—XII
- - B C Pfirsichroter Sommer-	+ Frühapfel	VIII—IX
- - B - Purpurroter Cousinot	+ Tafelapfel	XII—II
H M - B C Roter Bellefleur	+ Tafel- u. Mostapfel	XII—V
- M - - Roter Eiserapfel	— Wirtschaftsapfel	I—VI
- M h B C Rote Sternrenette	+ Tafelapfel	XI—III
- M - B - Ruhm von Winschoten	+ Süßapfel	VIII—IX
H M h B C Schöner aus Boskoop	— Tafel- u. Wirtschafts-	XI—V
H M - B C Signe Tillisch	+ Herbst-Tafelapfel	XI—I
H M - B - Süße Winterkrone	+ Süßer Winterapfel	XII—III
- - B C Williams Liebling	+ Früher Tafel- u. Küch.	VII—VIII
Woltmanns Renette, siehe Krügers Dickstiel		
- - B C Zigeunerin-Apfel	+ Frühapfel	VIII—IX
H M h B C Zuccalmaglio-Renette	+ Tafelapfel	XII—III

Birnen

	1 Stck.	100 Stck.
	DM	DM
Hochstämme, auf Wildling, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme, „ 7—9 „	4.—	—
Halbstämme, „ 6—8 „	3.50	—
Buschbäume, auf Quitte 2jährig	3.50	—
„ auf Wildling 3-4	4.—	—
Cordons, Schnurbäumchen, auf Quitte, senkrecht, 2jährig	3.—	—
„ „ „ 3-4 „	3.50	—

Birnen-Sorten

Erläuterungen siehe wie bei „Äpfel“

- M - - Alexander Lucas	— Winter-Tafelbirne	XI—XII
H M h B - Beuckes Butterbirne	+ Tafelbirne	IX
H M h B - Blumenbachs Butterb.	+ Herbst-Tafelbirne	X—XI
H M h - - Boscs Flaschenbirne	+ Tafelbirne	X—XI
H M h - - Bunte Jullbirne	+ Frühe Tafelbirne	VII—VIII
H M h B C Clapps Liebling	+ Tafelbirne	VIII—IX
H M h B - Conférencé	+ Herbstbirne	IX—XI
H M h - - Diels Butterbirne	— Winter-Tafelbirne	X—XII
H M h - - Esperens Herrenbirne	+ Tafelbirne	IX—X
H M h B - Gräfin von Paris	+ Winter-Tafelbirne	XI—I
H M h - - Gute Graue	— Frühe Sommerbirne	VIII—IX
H M h B - Gute Luise	+ Tafel- u. Küchenbirne	IX—X
H M h B - Herzogin Elsa	+ Herbst-Tafelbirne	IX—X
- M - B - Holländ. Zuckerbirne	+ Frühbirne	VIII—IX
H M h B C Kongreßbirne	— Tafel- u. Küchen-	IX—X
H M h B - Köstliche aus Charneu	+ Tafel- u. Küchen-	X—XI
H M h - - Madame Verté	+ Wirtschaftsbirne	XII—I

Birnensorten (Fortsetzung):

H M h - - Napoleons Butterbirne	+ Herbstbirne	X—XI
H M h B - Neue Poiteau	+ Tafelbirne	X—XI
H M h - - Schmelz. aus Thirriot	+ Herbstbirne	X—XI
H M h B C Triumph aus Vienne	+ Herbst-Tafelbirne	VIII—IX
H M h - C Vereins Dechantsbirne	— Herbst-Tafelbirne	X—XI
H M h B C Williams Christbirne	+ Tafel- u. Küchen-	IX

Brombeeren

	1 Stck. DM	100. Stck. DM
Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher	—,75	70.—

Brombeer-Sorten

Dorchester, groß, süß	VII—VIII
Kittatinny, sehr wohlschmeckend, reichtragend	VII—VIII
Laciniatus, wie Wildbrombeere, geschlitzblättrig	VIII
Lawton, sehr groß, länglich	Ende VIII
Lucretia, sehr groß, saftreich, wohlschmeckend	VII—VIII
Rathbun, sehr groß, süß, reichtragend aufrecht	VII—VIII
Sandbrombeere, siehe Theodor Reimers	
Taylor's Fruchtbare, zuckerhutförmig, fruchtbar, aufrecht	VIII
Theodor Reimers, wohlschmeckend, wüchsig, reichtragend	VIII
Wilsons Frühe, groß, vortrefflich, tiefschwarz, aufrecht	VIII

1 Stck. 100 Stck.
DM DM

Loganbeere (Brombeere X Himbeere) Rubus loganobaccus	2.—	—
Sehr wüchsig, reichtragend; glänzendrot, IX		
Japanische Weinbeere, Rubus phoenicolasius	2.—	—
Wüchsig, süß, Frucht gelblich, borstig, VIII—IX		

Haselnüsse

Großfrüchtige, starke Sträucher, ca. 80—100 cm hoch	2.—	160.—
---	-----	-------

Haselnuß-Sorten

f = frühblühend, m = mittelfrüh, s = spätblühend, P = besonders guter Pollenspender.

Bandnuß - Große Lamberstnuß		Landsberger Lange Nuß	f—m
Barcelloner Eckige	f	Längliche Riesennuß	m
Barrs Spanische	f	Lucas Zellernuß	m—s
Barrs Zellernuß	m	Meßmers Zellernuß	m
Bergers Zellernuß	m	Mogulnuß	s
Cosford	P m	Nottingham = Fertile	
Englische Zellernuß	P f	Prinzeß Royal	m
Fertile	m	Römische Zellernuß	P f
Frizzled = Gekräuselte Nuß		Rotblättrige Zellernuß	f
Garibaldi	m	Rudolphs Zellernuß	m
Gekräuselte Nuß	f—m	Sizilianer = Römische Zellernuß	
Große Lambertsnuß	s	Spanische (Lamberts)-Nuß	m—s
Gunslebener Zellernuß	m	Trapezunter Kaiserhasel	m
Gustavs Zellernuß	m	Von Mehl	m
Hallesche Riesennuß	P s	Webbs Preisnuß	f
Heynicks Zellernuß	m—s	Weißer Lambertsnuß	P m
Jeeves Sämling	m	Wunder von Bollweiler	f—m
Lambert Cobs	m		
Zierblättrige „Bluthasel“, siehe bei Corylus unter „Laubhölzer“.			

Himbeeren

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Kräftige, reichbewurzelte Pflanzen in nachstehenden rot- und gelbfrüchtigen Sorten	—40	32.—
Gelbe Antwerpener, hell-rötlichgelb, mittelgroß, süß, ertragreich		
Herrenhäuser König, dunkelrot, sehr groß, aromatisch, edel		
Immertragende v. Feidbrunnen, dunkelrot, groß, saftreich, würzig		
Lloyd George, dunkelrot, immertragend, aromatisch, ertragreich		
Magnum Bonum, dunkelgelb, groß, aufrecht, fruchtbar		
Preußen, hellrot, lange Ruten, wüchsig, ertragreich		
Schwarzfrüchtige „Shaffers Colossai“	—75	60.—
Brombeerartig, reichtragend, nicht wuchernd		

Johannisbeeren

	1 Stck. DM	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
Rotfrüchtige, in Sorten wie:			
Hornsche Gelbstiel, Kaukasische, Rote Holländische, Rote Versailler, Vierländer Rote			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—40	36.—	320.—
„ „ 5—8 „	—60	54.—	480.—
„ „ 8—12 „	—80	72.—	—
Rotfrüchtige, in neueren Sorten wie:			
Heros, Laxtons Nr. 1, Fays Fruchtbare			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—50	45.—	—
„ „ 5—8 „	—70	63.—	—
Weißfrüchtige, Weiße Holländische			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—40	36.—	320.—
„ „ 5—8 „	—60	54.—	480.—
„ „ 8—12 „	—80	72.—	—
Weißfrüchtige, Weiße Jüterboger			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—50	45.—	400.—
„ „ 5—8 „	—70	63.—	560.—
„ „ 8—12 „	—90	80.—	—
Schwarzfrüchtige, Johannisbeeren (Ahlbeeren) in Sorten wie: Boskoop Giant, Lees Schwarze, Rosenthais			
lange schwarze Traube			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—40	36.—	320.—
„ „ 5—8 „	—60	54.—	480.—
Schwarzfrüchtige Neuheit „Silvergrieter“			
Sträucher mit 3—5 Trieben	1.—	90.—	—
„ „ 5—8 „	1.50	—	—

Kirschen

Süßkirschen-Hochstämme, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—	—
„ -Mittelstämme, 7—9 „	4.—	—	—
„ -Halbstämme, 6—8 „	3.50	—	—

Kirschen-Sorten

Die Buchstaben H, M, h bedeuten, daß die betreffende Sorte als Hochstamm, Mittelstamm oder Halbstamm lieferbar ist. Die angegebene Woche gibt die erreichte Genußreife in jedem Ernteablauf an.

H M h	Badacsoner Riesenkirsche, rotbraun	5. Woche
H M h	Dönnissens gelbe Knorpel, reichtragend, fest	5. Woche
H M h	Eltonkirsche, bunte Herzkirsche, sehr reichtragend	3. Woche
H M -	Große Germersdorfer Knorpel, schwarz, schmalkronig	5. Woche
H M h	Große schwarze Knorpel, reichtragend, fest	5. Woche
H M h	Große Prinzessinkirsche, bunte Knorpel, spitz, fest	3.—4. Woche
H M h	Hedelfinger Riesen, schwarze Knorpel, Wuchs breit	5. Woche
H M -	Kassins Frühe, schwarze Herzkirsche, anspruchslos	1.—2. Woche
H M -	Schneiders späte Knorpel, schwarz, fest, hochwachsend	5. Woche

Sauerkirschen

	1 Stck, DM	100 Stck, DM
Hochstämme, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme, 7—9 „	4.—	—
Halbstämme, 6—8 „	3.50	—
Büsche, 1jährig	3.—	240.—
Königliche Amarelle und Schattenmorelle 6.—7. Woche		

Mispeln

Büsche, in nachstehenden Sorten, 2jährig	3.50	—
Großfrüchtige, sehr groß, reichtragend		
Holländische, sehr groß, dunkelbraun		
Kernlose, klein, wohlschmeckend		
Königliche, groß, wohlschmeckend, reichtragend		
Nottingham, klein, angenehm kräftiger Geschmack		

Pfirsiche

Büsche, in nachstehenden Sorten, auf Pflaume, 1jährig	4.—	—
„ „ „ „ 2jährig	4.50	—
„Alexander, ziemlich groß, „weißgelb“, saftig VII—VIII		
Cumberland, sehr groß, schön gefärbt VIII		
Mayflower, groß, rund, karminrot, sehr früh VII		

Pflaumen

Pflaumen, Mirabellen, Renekloden, Zwetschen

Hochstämme, nicht auf Stammbildner, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme, „ „ „ 7—9 „ „	4.—	—
Halbstämme, „ „ „ 6—8 „ „	3.50	—
Büsche, 3—4jährig	4.—	—

Pflaumen-Sorten

Erläuterung siehe wie bei „Äpfel“

- - - B	Angeline Burdett, rötlich-schwarzblau	IX
- M h B	Anna Späth, groß, rötlichblau	IX—X
- M - B	Blaue von Belgien, rund, dunkelblau	X
- M - B	Emma Leppermann, lachfarben und rot, saftig	IX
- M - B	Frühe Fruchtbare, schwarzblau, reichtragend	VIII
- - h -	Gelbe Eierpflaume, groß, gelb, fruchtbar	IX
- - h B	Königin Viktoria, sehr groß, rot, reichtragend	VIII—IX

Pflaumensorten (Fortsetzung):

- - h B Rote Eierpflaume, groß, reichtragend	IX
H - - B Schöne aus Löwen, eiförmig, dunkelblaurot	VIII
- M h B The Czar, groß, dunkelblau	VIII

Mirabellen-Sorten

H M - B Flotows Mirabelle, gelb, reichtragend	VII
- M h B Herrenhäuser Mirabelle, gelb, reichtragend	VIII
H - h B Königin der Mirabellen, gelb mit rot, mittelgroß	VIII
- - h B Nancy-Mirabelle, zitronengelb mit rot, groß	VIII

Renekloden-Sorten

- M - - Boddaerts Reneklode, groß, gelb, reichtragend	VIII
H M - B Graf Althans, sehr groß, schwarzblau	IX
- M h B Kaiserliche Reneklode, (Impérial), groß, gelb	VIII
- M h B Von Oullins, sehr groß, hellgelb, saftig	VIII

Zwetschen-Sorten

- - h B Borssumer Zwetsche, groß, süß, aromatisch	IX
- - - B Bühler Frühzwetsche, mittelgr., dunkelblau, ertragsicher	VIII—IX
- M - B Ersinger Frühzwetsche, tiefblau, köstlich, gut lösend	VIII
Goldquelle = Ersinger Frühzwetsche	
H M h B Lukas Frühzwetsche, mittelgr., tiefblau, beduftet	VIII
H M h B Wilhelmine Späth, klein, süß	IX

Quitten

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Büsche, in nachstehenden Sorten, 1jährig	3.—	—
" " " " 2jährig	4.—	—
Beretzy, Birnquitte, groß, weißfleischig, fein		
Königliche, Birnquitte, sehr groß		
Portugieser, Birnquitte, strohgelb, spät		
Von Bourgeaut, Apfelquitte, groß, starkwüchsig		
Von Leskovatz, Riesen-Apfelquitte, weißfleischig, früh		

Stachelbeeren

in nachstehenden, besten Sorten:

Hoch- und Halbstämme, mit 4—6 Trieben	2.—	180.—
Sträucher, „ 3—5 „	—70	63.—
„ „ 5—8 „	1.—	90.—
H h Str. Bloodhound, purpurrot	m	
- - Str. Früheste aus Nèuwied, grün	sehr f	
H h Str. Gelbe Triumphbeere, hellgelb	m	
- - Str. Golden Drop, gelb	f	
H h Str. Grüne Flaschenbeere, dunkelgrün	m	
H h Str. Grüne Hansa, grün, weiß geadert	f	
H h Str. Grüne Riesenbeere, hellgrün	s	
H h Str. Hellgrüne Samtbeere, gelblichgrün	m	
H h - Hönigs Früheste, gelb	sehr f	
H h Str. Lady Delamere, gelblichgrün	m	
H h Str. Maiherzog, (May Duke), dunkelrot	f	
H h Str. Maurers Sämling, schwarzrot	m	
- - Str. Rote Triumphbeere, dunkelrot	m	
H h Str. Victory, blaßrosa	s	
H h Str. Weiße Triumphbeere, gelblichweiß	m	

Süße Eberesche

Sorbus aucuparia moravica

						1 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme,	7—8	cm	Stammumfang	.	.	4.—	—
"	8—10	"	"	.	.	5.—	—
"	10—12	"	"	.	.	6.50	—
Mittelstämme,	8—10	"	"	.	.	4.50	—

Walnüsse

Juglans regia

aus Samen angekörter Mutterbäume erzogen

Hochstämme,	8—10	cm	Stammumfang	.	.	8.—	—
Mittelstämme,	7—9	"	"	.	.	7.—	—
Halbstämme,	6—8	"	"	.	.	6.—	—

Obst-Wildlinge

Wegen der Knappheit der heute wieder verfügbaren Wildlinge für Unterlagen bin ich leider noch nicht wieder in der Lage, irgendwelches Unterlagenmaterial abzugeben.

Dies bezieht sich sowohl auf alle EM-Typen als auch auf Sämlinge der verschiedenen erprobten Edelorten oder Wildobstarten.

Erdbeeren und Rhabarber

führe ich nicht.

Es ist ratsam, sich jeweils an den örtlichen Gartenbau zu wenden

Weinreben

führe ich nicht.

Ich bin aber jederzeit gerne bereit auf Wunsch zuverlässige Bezugsquellen nachzuweisen.

Rosen

Edelrosen - Hochstämme

		1 Stck. DM	100 Stck. DM
In nachstehendem Sortiment mit „H“ bezeichnet.			
Stammhöhe	ca. 50—75 cm	2.—	—
„	ca. 75—100 cm	3.—	—
„	ca. 100—120 cm	4.—	—

Niedrige Busch-Edelrosen

Einschließlich Polyantha und Floribunda-Hybriden.

Preisgruppe I	—95	85.—
Preisgruppe II	1.20	108.—
Preisgruppe III	1.40	126.—
Preisgruppe IV	1.60	144.—

Kletter-Rosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, vieltriebig

Preisgruppe III	1.40	126.—
Obige Preise gelten für Güteklasse A			

Überwinterungszuschlag für Rosenpflanzen.

Für die in der Frühjahrsversandzeit (1. Februar — 15. Mai) zum Verkauf gelangenden niedrigen und hochstämmigen Rosenpflanzen wird ein Überwinterungszuschlag von 10% berechnet.

Edelrosen-Sorten

Boub.-Bourbonrose, Rem.-Remontantrose, Tee-Teerose, TH-Teehybridrose. Die mit „D“ bezeichneten Sorten sind durch besonders guten Duft ausgezeichnet.

Name, Klasse, Beschreibung	Preisgruppe
Andenken an Wilhelm Pfitzer, Rem., karminrot, gut gef., D	1
H Arabella, TH, karminrosa, gef., wüchsig, reichblühend	1
Betty Uprichard, TH, lachrosa, innen orange, langstielig	1
Cathrine Kordes, TH, rubin-blutrot, samtig, nicht blauend	2
H Comtesse Vandal, TH, kupfrig-korallenrot, innen lachs, edel, D	2
H Dame Edlth Helen, TH, rein leuchtendrosa, groß, gut gef., D	2
Edlth Krause, TH, resedaweiß, gut gef., edel, spitze Knospen	2
H Elli Knab, TH, außen kräftig rosa, innen rosigweiß, gut gef., D	2
Etoile de Hollande, TH, dunkel- bis blutrot, edel, nie blauend	2
Eugen Fürst, Rem., samtig karmesinrot, gut gef., Herbstblüher, D	1
H Eulalia, TH, kräftig rosa mit Gelb, vollgef., reichblühend	1
Bishop & Holmes, Rem., leuchtend scharlachrot, kräftig, Weltrose	1

Edelrosensorten (Fortsetzung):

	Name, Klasse, Beschreibung	Preisgruppe
	Florex, TH, korallen-salmrosa mit orangekarmin, edel	3
H	Frau Karl Druschki (Schneekönigin) Rem., reinweiß, groß	1
H	Geheimrat Duisberg, TH, reingelb, groß, hochedel	3
	General-Superior Arnold Janssen, TH, karminorange bis rosa, D	1
	George Dickson, Rem., dunkelblutrot mit schwarz, groß, kräftig	1
	Gloire de Dijon, Tee, kupfrig-goldgelb, Spalierrose, D	3
H	Gloria Dei, TH, reingoldgelb, karmin Rand, sehr groß, gef., edel	4
H	Gloria di Roma, TH, hellrot, vollgef., groß	3
	Granat, TH, schwärzlichrot, samtig, üppig, edel	2
H	Hadley-Rose, TH, dunkelblutrot, gut gef., kräftig, D	2
	Heinrich Wendland, TH, kupferrot mit Goldgelb, edel, D	2
	Hugh Dickson, Rem., leuchtend feurigrot, gef., groß, Weltrose	1
	Königin Luise, TH, weiß, groß, gut gef., starkwüchsig	1
	La France, TH, silbrigrosa mit Fleischfarben, groß, gef., Weltrose	2
H	Laurent Carlé, TH, glänzend scharlachkarmin, groß, edel, D	1
	Liebesglut, TH, feurig-blutrot, edel, gef., nicht blauend, D	4
H	Luis Brinas, TH, orange, groß, edel, kräftig, D	1
	Luise Krause, TH, rötlichorange, mit Hellgelb, groß, gef.	1
	Madame A. Meilland = „Gloria Dei“	
	Mad. Bérard, Tee, gemsledergelb mit Lachs, groß	2
H	Mad. Butterfly, TH, rosa, aprikosenrot und goldgelb getönt	2
	Mad. Caroline Testout, TH, fleischfarbigrosa, Mitte feuriger	1
H	Mad. G. Forest Colcombet, TH, dunkelkarmin mit Scharlach, edel	2
	Mad. Jules Bouché, TH, reinweiß mit Kupfriggelb, groß	2
	Maréchal Niel, Tee, leuchtend schwefelgelb, oft kupfern, D	3
	Marie van Houtte, Tee, gelblichweiß, Rand rosa, edel, gut gef.	2
	Mary Hart, TH, samtig blutrot, nie verblauend, edel	1
	Max Krause, TH, rötlich orangegelb, später goldgelb, gef., edel	2
	Mevrouw G. A. van Rossem, TH, aprikosenrot auf Gelb, groß	1
	Mrs. John Laing, Rem., hellrosarot, groß, edel, kräftig	2
H	Mrs. Pierre S. du Pont, TH, reingelb, groß edel, gef.	2
	Mrs. Sam Mc. Gredy, TH, scharlachkupfrig-orange, gef., edel	2
	Peace = „Gloria Dei“	
	Pius XI, TH, rahmgelb in Weiß übergehend, haltbar, D	2
	Poinsettia, TH, rein scharlachrot, spitze Petalen, reichbl.	3
	Président Herbert Hoover, TH, goldgelb mit Feurigrot, gef., spitz	2
	Red Guard, TH, orange mit Blutrot, gut gef., kräftig	1
	R. M. S. Queen Mary, TH, leuchtend dunkellachorange, gef., D	3
	Roselandia, TH, goldgelb, groß, sehr blühwillig, D	3
H	Roslyn, TH, rein sonnengelb, kräftig gestielt, gut gef.,	1
	Souvenir de la Malmaison, Bourb., blaß fleischf., Saum rot, D	2
	Sterling, TH, hellrot mit Rosa, gut gef., buschig edel	1
	Talisman, TH, scharlach, rosa, kupfrig und goldgelb, gef., D	1
H	Texas Centennial, TH, blutroter Sport v. „Prés. H. Hoover“	2
	Ulrich Brunner Fils, Rem., kirschrot, gut gefüllt	1
	Ville de Paris, TH, goldgelb, leicht orange schattiert, spitz, D	2
H	Westfield Star, TH, atlasweiß bis leicht schwefelgelb, groß	2

Polyantha-Rosen Vielblumige Beetrosen

Einschließlich der bewährten Floribunda-Hybriden

Name und Beschreibung	Ungef. Höhe	Preis-Gruppe
Adolf Grille, feurigrot, gef., haltbar, reichbl.	40—50	3
Anne-Mette Poulsen, feurig-hellrot, halbgef., D	60—70	2
August Seebauer, rein seidenfarbig-rosa, vollgef.,	70—80	4
Baby Château, dunkelrot, samtig, vollgef., edel	50—60	2
Dagmar Späth, alabasterweiß, groß, halbgef.,	40—50	2
Dance of Joy, leuchtend scharlachrot, samtig, groß	60—70	2
Donald Prior, feurigrot, schalenförmig, leuchtend	50—60	3
Dr. Kater, tiefsamtigdunkelrot, großdoldig	40—50	1
Elfe, reinweiß, rosa getönt, einfach; Dauerblüher	50—60	4
Else Poulsen, zartrosa, halbgef., groß, haltbar	60—75	1
Erna Grootendorst, dunkelrot, groß, reichblühend	50—60	1
Feuersehnen, leuchtend feurigrot, Sport von „Joseph Guy“	40—50	2
Fortsehrift, primelgelb mit Orangerosa, groß	60—75	1
Frau Astrid Späth, korallenrosa, großdoldig	40—50	2
Frau Dr. Erreth, dunkelgelbe „Gruß an Aachen“, gef.	30—40	2
Gruppenkönigin, kräftig karminrosa, innen hellrosa, gef.	40—50	2
Heidekind, korallenrosa, Mitte lachs, gef., Dauerblüher	35—45	1
Heidezauber, leuchtend sattrot, gef., gut nachblühend, D	35—45	1
Herzblut, leuchtend blutrot, halb einf., groß	40—50	4
Holstein, leuchtend dunkelrot, groß, einfach	40—50	3
Ingar Olsson, rein karminrosa, gef., groß, in Dolden	40—50	1
I. F. Müller, feurigblutrot, große Dolden, Dauerblüher	35—45	2
Johannes Böttner, blutrot, groß, voll gef., reichbl.	60—70	4
Joseph Guy, leuchtendrot, gut gef., großdoldig	40—50	2
Käthe Duveigneau, dunkelglutrot, großdoldige Beetrose	40—50	4
Karen Poulsen, feurig scharlachblutrot, einf., haltbar	60—70	1
Karl Weinhausen, dunkelrot, gef., wetterbeständig	60—70	4
Katharina Zelmet, reinweiß, gef., doldig, D	40—50	1
Kirsten Poulsen, leuchtend scharlachrot, einf., doldig	60—75	1
Koralle, leuchtend korallenrot, Dauerblüher	60—75	1
Martha Kordes, orangerosa, halbgef., groß, haltbar	40—50	3
Minna Kordes, feurig blutrot, samtig, halbgef., edel	50—60	3
Orange Triumph, orangescharlachrot, gef., großdoldig	60—70	3
Paul Crampel, dunkelorangescharlach, Dauerblüher	40—50	2
Poulsens Yellow, reingelb, halbgef., gefranst	50—60	3
Rödhütte, leuchtendrot, großdoldig, altbewährt	40—50	1
Rosenelfe, silbrigrosa, groß edel, Dauerblüher	50—60	2
Rosenmärchen, zartrosa, groß, vollgef., dold. Dauerblüher	50—60	4
Rouge, feurig blutrot, gef., nicht blauend	30—40	1
Rufus, dunkel samtigkarmesinrot, gef., großdoldig	40—50	1
Swantje, weiß mit Gelb, sehr groß, gef., Wildrosenduft	40—50	1
Tantaus Triumph, orangerot, halbgef., leuchtend	50—60	4
Tantaus Überraschung, tief blutrot, gef., farbbeständig	60—70	4

Kletterrosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, vieltriebig

Preisgruppe III 1 Stck. DM 140 100 Stck. DM 126.—

Bourb. = Bourbon-Rose, Klett. Pol. = Kletternde Polyantha-Rose, Lamb. = Lambertiana-Rose, Lut. = Lutea-Rose, Macr. = Macrantha-Rose, Mult. = Multiflora-Rose, Set. = Setigera-Rose, Tee = Teerose, Wich. = Wichuraiana-Rose.

Name, Klasse und Beschreibung

Albertine, Wich., lachsfarben kupfrigrosa, edel, reichblühend
 American Pillar, Wich., rein rosenrot, Mitte weiß, einfach, ries. Dold.
 Auguste Kordes, Klett. Pol., feurig scharlachrot, remontiert
 Captain Kidd, Set., dunkelblutrot, edel, gef., groß, früh
 Crimson Rambler, Mult., kirschrot, stark kletternd, Riesendolden
 Dorothy Perkins, Wich., kirschrot-lachsrosa, gef., Riesendolden
 Dr. W. van Fleet, Wich., fleischrosa, edel, gef., haltbar
 Eva, Lamb., feurig-blutrot, innen weiß, doldiger Dauerblüher
 Excelsa, Wich., dunkelblutrot, gef., großdoldig, reichblühend
 Fragezeichen, Mult., sattrosa, groß, gef., reiche Dolden
 Fräulein Octavia Hesse, Wich., reinweiß, edel, gef., mittelgroß, D.
 Francois Guillot, Wich., milchweiß, halbgef., groß, reichblühend
 Gloire de Dijon, Tee, kupfrig-goldgelb, gef., groß, D.
 Golden Climber, Wich., goldgelb, edel, orange gestreift
 Hamburg, Lamb., feurig-scharlachrot, groß, halbgef., remontiert
 Hiawatha, Wich., blutrot, Mitte gelblichweiß, einfach, in Dolden
 Ida Klemm, Mult., schneeweiße Rambler, große, dichte Dolden
 Jane Lafitte, Set., rein orangerosa, edel, gef., harter Kletterer
 Le Réve, Lut., rein goldgelb, groß, halbgef., früh
 Leuchstern, Mult., leuchtendrosa, Mitte weiß, einfach, großdoldig
 Long John Silver, Set., rein schneeweiß, groß, gef., großdoldig
 Louis Rödiger, Macr., orangegelb, haltbar, starkwachsend
 Maréchal Niel, Tee, leuchtend schwefelgelb, oft kupfern, edel, D.
 Marie Henriette Gräfin Chotek, Mult., karmesin, groß, gef., kräftig
 Minnehaha, Wich., rosenrot, gef., großdoldig, starkwachsend
 New Dawn, Wich., zart weißlichrosa, edel, gef., Dauerblüher, D.
 Pauls Scarlet Climber, Mult., scharlachrot, groß, gef., doldig
 Sangerhausen, Lamb., leuchtend feurigrot, halbgef., große Dolden
 Schwerin, Lamb., feurigblutrot, gef., haltbarer Dauerblüher
 Sodnia, Wich., karminrot, gef., reichblühend, große Dolden
 Wartburg, Mult., karminrosa, gef., reichblühend, große Dolden
 White Dorothy, Wich., weiß, gef., zahlreiche große Dolden
 Wilhelm, Lamb., leuchtend blutrot, gef., reichblühend, große Dolden
 Zephirine Drouhin, Bourb., leuchtend karminrosa, locker gef., Dauerbl.

Hochstämmige Trauerrosen sind in diesem Jahre leider noch nicht lieferbar.

Niedrige botanische Wild- u. Parkrosen

PARKROSEN, in schönsten Sorten meiner Wahl
100 Stück DM 100.—

ROSA — Rose — Rosaceae		1 Stck. DM
<i>acicularis</i> <i>gmellini</i> , siehe <i>R. carelica</i>		
<i>alba</i> Maidens Blush Kew. (<i>R. alba incarnata</i> West.)		1.40
Blaß fleischfarbigrosa, gef., 150, VI—VII		
<i>alpina</i> L. (<i>R. pendulina</i> L.) Alpen-Zimtrose		1.40
Karmin mit Weiß, einf., Fr. zierend, bis 150, V—VII		
— <i>plena</i> Hort.		1.40
Gefülltblühende Form der Alpenzimtrose, 200—250, VI		
<i>amblyotis</i> , siehe <i>R. cinnamomea oxyodon</i>		
<i>arvensis</i> Huds. (<i>R. repens</i> Scop.) Feldrose		1.40
Weiß, einf., dünntriebzig, kriechende Felsenrose, VI—VII		
<i>biebersteini</i> , siehe <i>R. ferox</i>		
<i>burgundiana</i> Roess. (<i>R. centif. parvifolia</i> Rehd.) Burgunderrose		1.40
Dunkelrosenrot, buschig, würziger Duft, 80, VI—VII		
<i>californica plena</i> , siehe <i>R. theano</i>		
<i>canina</i> L. Hundsrose, Heckenrose	100 St. DM 50.—	.60
Weiß bis leichtrosa, einf., Fr. scharlach, bis 300, V—VI		
<i>carelica</i> Fries. (<i>R. acicularis gmellini</i> CS.)		1.40
Hellrosa, einf., buschig, Fr. birnförmig, bis 100, IV—V		
<i>caroliniana</i> , siehe <i>R. lucida</i>		
<i>centifolia</i> L. Zentifolienrose		1.40
Hellrosa, dichtgef., würziger Duft, 80—150, VI—VII		
— <i>muscosa</i> Julie de Mersan		1.40
Purpurrosa Moosrose, Duft, 100, VI—VII		
— — <i>bifera</i> Madame Moreau		1.40
Zinnober, weiß gestrichelt, groß, gef., remontiert, 100, VII		
— — — Nuits de Young		1.40
Kastanienbraun bis purpurrot, remontiert, 100, VI—VII		
— <i>parvifolia</i> , siehe <i>R. burgundiana</i>		
— Rose des Peintres		1.40
Rosa, Mitte dunkler, groß, gef., duftig, 100, VI—VII		
— <i>Unica</i> (<i>Unique blanche</i> , White Provence)		1.40
Milchweiß, gef., starkwüchsig, Duft, 100, VI—VII		
<i>cinnamomea oxyodon</i> Hort. (<i>R. amblyotis</i> Meyer)		1.40
Hellrosa mit dunkler Aderung, reichbl., 200, VI		
<i>dahurica</i> Pall. (<i>R. daurica</i> , <i>R. davurica</i>)		1.40
Leuchtend tiefkarminrot, Mitte weiß, einf., 150, VI		
<i>damascena</i> Madame Hardy		1.40
Reinweiß, groß, flach, gef., 100, VI		
— <i>mundi selfcoloured</i>		1.40
Karmin, halbgefüllt, fruchtet reich, Duft, 100, VI		
<i>dingleri</i> CS. (<i>R. glauca</i> X <i>rubiginosa dingleri</i>)		1.40
Lichtrosa, groß, einf., reichblühend, wüchsig, 200, VI		
<i>eglanteria</i> , siehe <i>R. rubiginosa</i>		
<i>fargesii</i> Hort. (<i>R. moyesii fargesii</i> Rolfe)		2.—
Samtig karminrot, einf., Fr. flaschenförmig, 300, VI		
<i>fendleri</i> Crép.		1.40
Weißlichrosa, reichbl., Fr. klein, dunkelrot, 200, VI—VII		

ROSA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM
ferox M. Bieb. (R. biebersteini Ldl.)	1.60
Weiß, einf., dicht, für Vogelschutz, 40—70, VI—VII	
ferruginea , siehe R. rubrifolia	
gallica grandiflora Hort. Ölrose. Für Hecken!	1.40
Leuchtend hell- bis tiefkarminrot, wüchsig, 100—150, VI	
giraldi Crép.	1.40
Rosa, reichbl., buschig, Fr. scharlach, bis 250, VI	
glauca , siehe R. rubrifolia	
Griseldis , Geschwinds Nordlandsrose	1.40
Rosarot, stark gef., starkwüchsig, Duft, bis 250, VII	
haematodes Boiss. (R. oxyodon haematodes Arb. Zöschen)	1.40
Rosarot, starkbuschig, zierfrüchtig, 300, VI	
helcnae Rehd. & Wils.	1.40
Weiß in Büscheln, Fr. rot, Duft, bis 5 m Triebe, VI—VII	
hibernica Sm. (R. spinosissima X canina)	1.40
Leucht. rosa, groß, einf., reichbl., Fr. rot, bis 300, V—VI	
highdownensis B. Ruys. Moyesi-Hybride	2.—
Reinkarminrot, Auge weiß, Laub u. Fr. zierend, bis 300, V	
hugonis Hemsl. Chinesische Goldrose	2.—
Kräftig gelb, einf., reichbl., Fr. schwarzrot, 150—250, V	
humilis Marsh. (R. virginiana humilis CS.)	1.40
Rosa, für trockne, steinige Stellen, bis 100, V—VI	
hybrida bifera Hermann Löns	1.40
Rot einf., sehr groß, reichbl., Duft, 150, VI—IX	
lambertiana-Hybriden , siehe unter „Kletterrosen“	
lucida L. (R. caroliniana Mchx.)	1.40
Leichtrosa, schönlaubig, zierfrüchtig, bis 120, VI	
— plena Hort.	1.40
Hellrosa, gef., groß, Duft, bis 150, VIII	
lutea hybrida Parkfeuer	1.40
Glühend scharlachrot, mittelgroß, einf., 400, VII	
— — von Scharnhorst	1.40
Schwefel- bis buttergelb, halbgef., reichbl., remontiert, 150, VI—IX	
macrantha Desp.	1.40
Fast weiß, sehr großblumig, einf., 200, VI—VII	
macrophylla Ldl.	1.40
Rosa, Fr. flaschenförmig, 150—200, VI—VII	
Madame Plantier (R. indica noisettiana-Hybride)	1.40
Schneeweiß, reichbl., gef., zu Hecken, 150, VI—VIII	
manca Greene	1.40
Weiß, einf., reichbl., Laub glänzend, Fr. korallenrot, 100, V—VI	
microphylla Roxb. (R. roxburghi Tratt.)	1.40
Rosa, einf., Laub zierlich, Fr. kugelig, rot, 150—200, VII	
moschata Herrm. Moschus-Rose	1.40
Hellrosa, halbgef., reichbl., rottriebzig, bis 300, VI—VII	
moyesi Hemsl. & Wils.	2.—
Samtig scharlachrot, einf., Fr. flaschenförmig, 400, VI—VII	
— fargesii , siehe R. fargesii	
multibracteata Hemsl. & Wils.	1.60
Rot, traubig, zierende Brakteen,, Fr. orangerot, 200, VI—VII	

ROSA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM
multiflora Thgb.	100 St. DM 50.— —.60
Weiß, klein, einf., große Dolden, überhängend, 300, V—VI	
— nana Hort. (R. polyantha nana Sieb. & Zucc.)	1.40
Weiß bis rosa, einf. bis halbgef., erbsenfr., 60—100, ab V	
nitida Willd. Glanzrose. Auch für feuchte Böden!	1.40
Lebh. dklrosenrot, einf., rotborstig, Fr. rot 50, VI—VII	
omeiensis pteracantha R. & W. (R. sericea pterac. Franch.)	2.—
Weiß, 4petalig, Stacheldrahtrose, Fr. klein, 200, V	
oxyacantha M. Bieb. (R. pimpinellifolia X acicularis)	1.40
Rosapurpurn, Fr. dklschwarzbraun, 200, V	
oxyodon haematodes , siehe R. haematodes	
pendulina , siehe R. alpina	
pimpinellifolia L. (R. spinosissima L.) Bibernell-Rose	1.40
Weißlichrosa, einf., borstig, Laub 7-zählig, 100, VI—VII	
— Maria Stuart	1.40
Zartrosa, gelbgrundig, gef., Duft, 100, VI	
— xanthina Ldl.	1.40
Leuchtend dunkelgelb, groß, einf., reichbl., 100, VI	
polyantha nana , siehe R. multiflora nana	
pomifera Herrm. (R. villosa L.) Apfelrose	1.40
Rosa, einf., Laub blaugrün, Fr. birnförmig, 200—250, VI—VII	
pratti Hemsl.	1.40
Tiefrosa, Stacheln goldgelb, Fr. orangescharlach, 150—250, VI	
provincialis Oeillet parfait	1.40
Rot, lila und purpurn gestreift, mittelgroß, gef., 100, VII	
pubescens Roxb.	1.40
Leuchtend rosarot, einf., zierfrüchtig, bis 300, VI	
repens , siehe R. arvensis	
roxburghi , siehe R. microphylla	
rubiginosa L. (R. eglanteria L.) Schott. Zaunrose	100 St. DM 50.— —.60
Rosenrot, einf. reichbl., Duft, „Sweet Briar“, 250, VI	
— Lady Penzance	1.40
Kupfriggelb, einf., Fr. orangescharlach, 250, VI	
— magnifica Hesse	1.40
Leuchtend karminrot, halbgef., reichblühend, für Hecken! 200, VI	
— Refulgence	1.40
Leuchtend blutrot, halbgef., groß, reichbl., 250, VI	
rubrifolia Vill. (R. glauca, R. ferruginea)	100 St. DM 50.— —.60
Karmin, einf., Laub hechtblau, 150—200, VI	
rugosa Thgb. Nordische Apfelr., Kartoffelr.	100 St. DM 50.— —.60
Rot, einf., groß, Fr. großkugelig, Duft, 150, V—VI	
— alba Hort.	100 St. DM 50.— —.60
Weiß, einf., groß, reich fruchtend, Duft, 150, V—VI	
— calocarpa Hort.	1.40
Rosa, gef., trotzdem gut fruchtend, 150—200, V—VI	
— hybrida Agnes	1.40
Hellgelb, gef., groß remontiert, 150, VI—IX	
— Blanche double de Coubert	1.40
Reinweiß, halbgef., sehr groß, remontiert, 150, VI—IX	
— Carmen	1.40
Leuchtend dklblutrot, einf., dicht bestachelt, 200, VI—X	

ROSA (Fortsetzung):

	1 Stck DM
<i>rugosa hybrida</i> Conrad Ferdinand Meyer	1.40
Silbrigrosa, starkgef., sehr groß, stark bestachelt, 200, VI—IX	
— — Dr. Eckener	1.40
Sattgelb mit Orange, groß, reichbl., sehr früh, 200, VI—VII	
— — F. J. Grootendorst „Nelkenrose“	1.40
Satt klrschrot, dicht gef., in Büscheln, 80—100, VI—VIII	
— — Kaiserin des Nordens (R. <i>rugosa rubra plena</i> Rehd.)	1.40
Violettpurpur, gefüllt, groß, 250, VI—VIII	
— — Madame Georges Bruant	1.40
Glänzendweiß, halbgef., groß, reichbl., Duft, 150, VI—X	
— — Roseraie de l'Hay	1.40
Dunkelrot, festgef., groß, frühbl., stark duftend, 150, VI—VII	
— — Schneellcht	1.40
Blendendweiß, einf., leicht kletternd, 50, VI—VII	
— — Schneezwerg	1.40
Blendendweiß, halbgef., doldig, für Hecken, 60, VI—X	
— — Souvenir de Christophe Cochet	1.40
Lebhaft fleischrosa mit Karmin, groß, halbgef., 150, VI—VII	
— <i>rubra plena</i> , siehe R. <i>rugosa hybrida</i> Kaiserin des Nordens	
<i>sericea pteracantha</i> , siehe R. <i>omeiensis pteracantha</i>	
<i>setigera</i> Mch. Prärie-Rose	1.40
Rosarot, einf., reichbl., weißlich werdend, 100—200, VI—VIII	
<i>spinossima</i> , siehe R. <i>pimpinellifolia</i>	
<i>spinulifolia</i> Dem.	1.40
Rosa, einf., reichbl., Laub schön, Fr. rot, 100—150, VI—VII	
<i>sweginzowi</i> Koehne	1.60
Hellrosa, Fr. urnenförmig, bis 300, VI	
<i>theano</i> J. C. Schm. (R. <i>californica plena</i> Hort.)	1.40
Leuchtendrosa, gef., reichbl., großdoldig, 150, VI—VII	
<i>villosa</i> , siehe R. <i>pomifera</i>	

ROSENFREUNDE

gehören in den

„VEREIN DEUTSCHER ROSENFREUNDE“

Für den Jahresbeitrag von DM 7.— wird folgendes geboten:

Beratung in allen Rosenangelegenheiten.

Teilnahme an den Versammlungen des Vereins

Das alljährliche Rosenjahrbuch

Alle sonstigen Veröffentlichungen des Vereins

Anmeldungen nimmt entgegen: Herr Wilhelm Kordes, Stellv.

Präsident und Geschäftsführer (24) BARMSTEDT, Düsterlohe 1

Koniferen - Nadelhölzer

Ballenpflanzen

Gut geformt. — Oft verpflanzt. — Gut Ballen haltend

Δ — Für Steingärten geeignet

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
ABIES — Tanne — Pinaceae			
<i>alba pendula</i> Aschers & Graebn. (A. pectinata pend.)	40—60	6.75	—
Trauer-Weißtanne, üppige Hängeform			
— <i>pyramidalis</i> Voss. (A. pectinata pyram. Carr.)	30—40	5.40	—
Besonders schön aufstrebende Säulenform	60—80	9.—	—
<i>amabilis</i> Forb. Purpurtanne	60—80	9.—	—
Benadelung dicht, aromatisch, glänzend	80—100	12.—	—
<i>arizonica compacta</i> Hort. Δ	30—40	6.—	—
Schwach- und dichtwachsende Form der Korktanne	40—60	8.—	—
<i>balsamea</i> Mill. Balsamtanne	200—225	12.—	—
Raschwachsend, schmalpyramidal			
— <i>argentea</i> Beissn.	200—225	25.—	—
Mit weißgespitzten Nadeln			
— <i>hudsonia</i> Sarg. & Engelm. Δ breit	20—30	6.—	—
Flache Zwergform, kissenartig,	30—40	7.50	—
dunkelgrün	40—50	9.—	—
	50—60	10.—	—
	70—80	18.—	—
— <i>nana</i> Carr. (A. bals. globosa Hort.) Δ	20—30	6.—	—
Breite Zwergform, dunkelgrün	30—40	7.50	—
	40—50	9.—	—
<i>brachyphylla</i> , siehe A. homolepis			
<i>cephalonica</i> Loud. (A. panachaica Heldr.)	100—125	10.—	—
Dunkelgrüne, spitznadelige Weißtanne			
<i>concolor</i> Lindl. & Gord. Grautanne	60—80	7.—	—
Breitnadeliger, graublauer Baum	100—125	10.—	—
	150—175	18.—	—
	250	40.—	—
	300—350	60.—	—
<i>homolepis</i> Sieb. & Zucc. (A. brachyphylla Maxim.)	125—150	12.—	—
Regelmäßig pyramidale Nikkotanne, dklgrün			
<i>mariesi</i> Mast.	175—200	20.—	—
Stumpf dunkelgrün, ziemlich kurznaelig	200—225	25.—	—
<i>nobilis glauca</i> Beissn.	30—40	6.—	—
Prächtig dunkelblaue Form der Adeltanne	40—60	8.—	—
	60—80	10.—	—
	100—125	18.—	—
	150—175	25.—	—
	175—200	30.—	—
	300—325	50.—	—
<i>nordmanniana</i> Spach. Nordmanns-Tanne	150	18.—	—
Wuchtige, dunkelgrüne Art	200	25.—	—

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
ABIES (Fortsetzung):			
<i>nordmanniana pendula</i> Beissn.	30—40	6.—	—
Hängeform der Nordmannstanne	40—60	7.—	—
	60—80	9.—	—
	100—125	15.—	—
	125—150	18.—	—
	200—225	25.—	—
<i>numidica</i> de Lannoy			
Dunkelgrün, büstenförmig benadelt, üppig			
<i>panachaica</i> , siehe <i>A. cephalonica</i>			
<i>pectinata</i> , siehe <i>A. alba</i> und Formen			
<i>pinsapo</i> Boiss. Spanische Tanne	60—80	6.—	—
Grün, dicknadelig, rundgestellt, auffallend			
— <i>glauca</i> Carr.	40—60	7.—	—
Blaue Form der spanischen Tanne, hart	60—80	9.—	—
<i>veitchi</i> Lindl. Veitchs Weißtanne	200	25.—	—
Glänzendgrün, unten silberweiß, wüchsig			
<i>vilmorini</i> Mast. (<i>A. pinsapo</i> X <i>cephalonica</i>)	40—60	8.—	—
Dichtzweigige Hybridtanne, frischgrün			
ARAUCARIA — Schmucktanne — Araucariaceae			
<i>araucana</i> K. Koch (<i>A. imbricata</i> Pav.) m. Tb.	30—40	8.—	—
Dachziegelartige, dunkelgrüne, breite Blätter			
<i>lanceolata</i> , siehe <i>Cunninghamia lanceolata</i>			
BIOTA, siehe Thuja			
CEDRUS — Zeder — Pinaceae			
<i>atlantica</i> Manetti Atlas-Zeder	80—100	6.—	—
Pyramidal, grünnadelig	200—250	25.—	—
	275—300	45.—	—
— <i>aurea</i> Beissn.	30—40	6.—	—
Dunkelgelbe bis gelbgrüne Form d. Atlas-Zeder			
— <i>robusta</i> den Ouden	40—50	7.50	—
Auffallende, gelbnadelige Form mit grauem Ton			
— <i>glauca</i> Carr.	30—40	6.—	—
Schön stahlblaue Form	60—80 cm Stamm	200—225	40.—
	80—100 "	400—450	160.—
<i>deodara</i> Law. Himalaya-Deodara-Zeder	80—100	6.—	—
Blaugrüne, lange Nadeln, überhängende Zweige	175—200	18.—	—
	200—250	25.—	—
— <i>albo-spicata</i> Beissn.	40—50	7.50	—
Überhängende weiße Zweigspitzen			
— <i>aurea</i> Nelson Gold-Zeder	40—50	7.50	—
Prächtig goldgelbe Form der Deodara-Zeder	150—175	20.—	—
<i>libani pendula sargentii</i> , siehe <i>C. libanitica sargentii</i>			
<i>libanitica sargentii</i> Hornibr.	60—80	8.—	—
Interessante, grüne Hängeform			
CHAMAECYPARIS — Schein-Zypresse — Cupressaceae			
<i>lawsoniana alumi</i> Beissn.	60—80	3.50	—
Wertvolle, schmale, blaue Säulenform	80—100	4.50	—
	125—150	7.—	—
	175—200	12.—	—
	200—225	15.—	—
— <i>conica</i> , siehe <i>Ch. laws. wisseli</i>			
— <i>darlyensis</i> Beissn.	30—40	2.50	—
Goldbunt, breitkegelförmig	100—125	6.—	—
	275—300	30.—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
<i>lawsoniana erecta filiformis robusta</i> Hort. Holl.	100—125	6.—	—
Kräftige Säulenform mit federförmigen Zweigenden			
— — <i>glauca</i> , siehe Cham. law. <i>monumentalis nova</i>			
— — <i>viridis</i> Beissn.	30—40	2.50	—
Schlank, frisch saftiggrün			
— <i>filiformis</i> Beissn.	80—100	20.—	—
hoch und breit			
Zierlich, rundlich, fadenförmig, frischgrün			
— <i>fletcheri</i> Hornibr.	30—40	3.50	—
Dicht, bläuliche, zierlich federige Säulen			
	60—80	6.—	—
	200—250	25.—	—
— <i>forsteckensis</i> Beissn. Δ	50—60	30.—	—
hoch und breit			
Langsam wachsend, dicht breitkegelförmig, blau			
— <i>fraseri</i> Beissn.	40—60	2.50	—
Dunkelblaue, harte Säulenform			
	80—100	4.50	—
— <i>glauca argentea</i> Hort.	40—60	2.50	—
Streng pyramidal, herrlich blau, hart			
	60—80	3.50	—
— <i>intertexta</i> Beissn.	30—40	2.—	—
Schwer überhängende, grüne Form			
	200—225	15.—	—
	225—250	18.—	—
— <i>krameri</i> Beissn.	100—125	6.—	—
Breite, dunkelgrüne Kegelform			
	150—175	10.—	—
— <i>lanei aurea</i> Hort. Holl.	40—60	4.50	—
Goldgelbe Form, sehr farbbeständig			
	60—80	5.50	—
	300—325	40.—	—
— <i>minima glauca</i> Beissn. Δ	20—30	5.—	—
hoch und breit			
Dichte, dunkelgrüne, breite Kugel			
	100—125	35.—	—
	140	40.—	—
— <i>monumentalis nova</i> Hort.	40—60	2.50	—
Wertvolle, hellblaue Säulenform			
— <i>nana</i> Beissn. Δ	80—100	25.—	—
hoch und breit			
Schöne, grüne Kugelform			
	100—125	35.—	—
— <i>patula</i> Beissn.	150—175	9.—	—
Feinzweigige, bräunlich-dunkelgrüne Form			
— <i>pendula vera</i> Hesse	200—225	15.—	—
Wertvolle, grüne Hängeform			
	250—300	25.—	—
— <i>pulcherrima</i> Hort.	100—125	9.—	—
Lockere, weiß schimmernde Form			
	125—150	12.—	—
— <i>robusta glauca</i> Beissn.	30—40	2.—	—
Üppige, tiefblaugrüne Säulenform			
	150—175	9.—	—
	200	15.—	—
— <i>rosenthalii</i> P. Smith	30—40	2.—	—
Saftig hellgrüne, leichtbezweigte Säulenform			
	250	18.—	—
— <i>schongariana</i> Pfitzer	30—40	2.50	—
Stahlgrüne, fächerzweigige Form			
	125—150	7.—	—
— <i>Silver Queen</i> Beissn.	40—60	4.50	—
Besonders harte, silberschimmernde Form			
	200—225	24.—	—
— <i>stewartii</i> Hort.	40—60	4.50	—
Intensiv gelbe Form von aufrechtem Wuchs			
	60—80	6.—	—
— <i>tharandtensis caesia</i> Buett. Δ	30—40	6.—	—
Ähnlich „forsteckensis“ aber lockerer			
— <i>versicolor</i> J. Coninck	30—40	3.50	—
Harte, gold- und silbern-schimmernde Form			

	Höhe in cm	1 Stk. DM.	100 St. DM.
CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):			
<i>lawsoniana westermanni</i> Beissn.	30—40	3.50	—
Dichte, goldgelb schimmernde Pyramidenform	60—80	5.50	—
— <i>wissell</i> Hort. Holl.(Cham. laws. conica Beissn.)	40—60	4.50	—
Blaugrüne Säulenform, farnartige Zweige	100—125	9.—	—
	150—175	15.—	—
— <i>youngi</i> Beissn.	30—40	2.—	—
Üppige, dunkelgrüne, dekorative Form	175—200	12.—	—
	250	20.—	—
<i>nootkatensis</i> Sudw. (Cham. nutkaensis Endl.)	40—60	4.50	280.—
Zierliche grüne Nutka-Zypresse, sehr hart	60—80	5.50	360.—
— <i>glauca</i> Beissn.	40—60	4.50	—
Überhängende, ausgeprägt blaugrüne Form	60—80	5.50	—
— <i>aureo-variegata</i> Beissn.	60—80	5.50	—
Beständig goldbunt, Grundton blaugrün			
— <i>lutea</i> Beissn.	40—60	4.50	—
Goldgelbe, auffallende, gesunde Form			
— <i>pendula</i> Beissn. Hänge-Nutka-Zypresse	60—80	10.—	—
Fahnenartig schwer hängende Zweige	175	25.—	—
	200—225	45.—	—
<i>nutkaensis</i> , siehe Cham. <i>nootkatensis</i> und Formen			
<i>obtusa albo-spicata</i> Beissn. (Retinispora) Δ	100—125	12.—	—
Weißbunte japanische Feuerzypresse	150—175	18.—	—
— <i>aurea</i> Beissn.	100—125	12.—	—
Beständig goldgelbe Form	250	25.—	—
— <i>compacta</i> Hartw. & Ruempl. Δ	60—80	7.—	—
Dichrundliche Kegelform	100—125	12.—	—
	200—225	30.—	—
— <i>coralliiformis</i> Beissn.	60—80	7.—	—
Korallenförmig gabelig verzweigte Form	80—100	9.—	—
	100—125	12.—	—
— <i>crippsi</i> Beissn.	30—40	6.—	—
Dichte, blaß- oder goldgelbe Form			
— <i>filicoides</i> Beissn. Δ	40—60	8.—	—
Schwachwüchsige, farnwedelige Form	60—80	10.—	—
	80—100	12.—	—
— <i>gracilis aurea</i> Beissn.	250—300	40.—	—
Schön überhängend, goldig schimmernd	300—350	50.—	—
— <i>lycopodioides</i> Carr. Bärlapp-Zypresse Δ	80—100	12.—	—
Dunkelgrüner Zwerg, lycopodiumartige Zweige	100—125	15.—	—
— <i>aurea</i> Beissn. Δ	15—20	4.—	—
Kurz, teils monströs bezweigte, goldige Kugel	40—50	7.50	—
— <i>magnifica</i> Beissn.	30—40	5.—	—
Üppige, glänzend frischgrüne Form			
— <i>mariesi</i> Beissn. Δ	20—30	5.—	—
Form mit hellgelben und milchweißen Trieben	30—40	6.—	—
	40—50	7.50	—
— <i>nana aurea</i> Carr. Δ	20—30	5.—	—
Fächerförmige, goldgelbe Bezweigung	40—60	8.—	—
	200—225	40.—	—
— — <i>gracilis</i> Beissn. Δ	15—20	5.—	—
Glänzend dunkelgrüne Zwergkegelform	30—40	8.—	—
	40—50	10.—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):		Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
obtusa pygmaea Carr. Δ	breit	80—90	25.—	—
Glänzend bräunlichgrüne, breite Zwergform				
pisifera Sieb & Zucc. (Retinispora)		40—60	2.—	—
Schön locker, leicht überhängend bezweigt				
		100—125	4.50	—
— aurea Beissn.		60—80	3.50	—
Reingelbe Form				
		80—100	4.50	—
		100—125	5.50	—
— Dwarf Blue Hort. Δ	hoch und breit	15—20	4.—	—
Dichtknäuelig, federig, blau				
		20—30	5.—	—
		40—50	8.—	—
— filifera Beissn.		60—80	5.50	—
Allseitig, fadenförmig überhängende Zweige				
		175—200	18.—	—
		200—225	24.—	—
— — aurea Beissn. Δ		30—40	8.—	—
Fadenförmige, goldgelbe Bezweigung				
— — aureo-variegata Beissn.		40—60	7.—	—
Goldbunte, fadenförmige Bezweigung				
		60—80	10.—	—
		80—100	12.—	—
		100—125	15.—	—
		150—175	20.—	—
		250—275	30.—	—
— — nana Beissn. Δ	hoch und breit	20—30	5.—	—
Grüne, dichte, fadenförmige Zwergform				
		80—100	30.—	—
		150	40.—	—
		200	60.—	—
— nana aureo-variegata Beissn. Δ		50—60	6.—	—
Dichte, goldbunte Kugel				
		60—80	7.50	—
		100—125	35.—	—
		150—175	50.—	—
— plumosa Beissn.		30—40	2.—	—
Dunkelgrüne, harte, gedrungene Form				
		40—60	2.50	—
		60—80	3.—	—
		80—100	4.50	—
		100—125	5.50	—
— — aurea Beissn.		30—40	2.—	160.—
Schön goldgelb gefärbt				
		40—60	2.50	200.—
		60—80	3.50	—
— — compressa Hort. Δ		10—15	4.—	—
Dichte, gelblichgrüne Zwergform				
		15—20	5.—	—
— — flavescens Beissn.		20—30	1.80	—
Breite Kegel mit gelbweißen Zweigspitzen				
— — nana aurea Hornibr. Δ	hoch und breit	15—20	4.—	—
Dichte, leuchtend goldgelbe Kugel				
		20—30	5.—	—
— squarrosa Beissn.		30—40	2.—	—
Buschige, silbergraue Pyramiden				
— — intermedia Hornibr.		60—80	9.—	—
Langsam wachsende, lockere Form				
		100—125	12.—	—
— — sulphurea Beissn.		30—40	2.—	—
Im Sommer gelb gefärbt, zierlich				
		40—60	3.—	—
— sulphurea Hesse		30—40	2.—	—
Kräftig, leuchtend hellschwefelgelb				
sphaeroidea, siehe Cham. thyoides und Formen				

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM
CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):			
<i>thyoides andelyensis</i> CS.	30—40	5.50	—
Dicht kegelförmige Pyramide	200—225	30.—	—
— <i>atrivirens</i> Sudw.	40—60	5.50	—
Tiefdunkelgrüne Form	80—100	9.—	—
	100—125	12.—	—
	175—200	18.—	—
— <i>aurea</i> Fitschen	40—60	5.50	—
Zierlich, spitze, ganz goldgelbe Kegel	80—100	9.—	—
	150—175	15.—	—
	250	30.—	—
	300—350	60.—	—
CRYPTOMERIA — Sichelanne — Taxodiaceae			
<i>japonica</i> Bandai-Sugi Yokohama Δ	20—30	4.—	—
Dicht knäuelig bläulichgrün, unregelmäßig	30—40	5.—	—
	60—70	12.—	—
— <i>compacta</i> Beissn. (Cr. lobbi compacta Hort.) Δ	20—30	5.—	—
Dicht und breit wachsend			
— <i>cristata</i> Beissn. (Cr. monstrosa Hort.) Δ	50—60	6.—	—
Buchige, monströse Form	80—90	8.—	—
	200—225	25.—	—
— <i>Jindai-Sugi</i> Yokohama Δ	20—30	4.—	—
Frischgrün, feinnadelig, dicht eiförmig	30—40	5.—	—
	80—100	15.—	—
— <i>lobbi compacta</i> , siehe Cr. compacta japonica			
— <i>pyramidalis</i> , siehe Cr. japonica pyramidata			
— <i>monstrosa</i> , siehe Cr. japonica cristata			
— <i>pyramidata</i> Carr. (Cr. lobbi pyramidalis Hort.)	60—80	5.—	—
Schön pyramidal straff wachsend	300—350	40.—	—
— <i>selaginoides</i> , siehe Cr. japonica viminalis			
— <i>vilmoriniana</i> Hornibr. Δ	20—30	5.—	—
hoch und breit	30—40	8.—	—
Dicht, kurztriebig, frischgrün			
— <i>viminalis</i> Hort. (Cr. jap. selaginoides Hort.)	100—125	9.—	—
Langzweigig, mit anliegenden Nadeln			
<i>monstrosa</i> , siehe Cr. japonica cristata			
CUNNINGHAMIA — Spießanne — Taxodiaceae			
<i>lanceolata</i> Hook. (C. sinensis R. Br.)	100—125	12.—	—
Grüne, an Araukarie erinnernde Konifere	125—150	15.—	—
— <i>glauca</i> Fitschen (C. sinensis glauca Beissn.)	30—40	5.—	—
Blaugrüne, besonders schöne und harte Form	40—60	6.—	—
	80—100	10.—	—
	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
EPHEDRA — Meerträubel — Ephedraceae			
<i>distachya helvetica</i> Hegi (E. helvetica C. A. Mey.) Δ	20—30	4.—	—
Flache, grüne, schachtelhalmartige Sträucher			
<i>gerardiana sikkimensis</i> Stapf. Δ	30—40	5.—	—
Frischgrün, straff aufrecht			
GINKGO — Fächerblattbaum — Ginkgoaceae			
<i>biloba</i> L. (Salisburia adiantifolia Sm.)	60—80	4.—	—
Interessanter, laubabwerfender Baum	80—100	5.—	—
	100—125	6.—	—
— <i>pendula</i> Beissn.	60—80	9.—	—
Hängeform des Fächerblattbaumes			

GLYPTOSTROBUS — Chinesische Zypresse — Taxodiaceae

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
penzilis K. Koch (Taxodium jap. heterophyllum Brogn.)	30—40	6.—	—
Laubwerfend, frischgrün, dünnzweigig			

JUNIPERUS — Wacholder — Cupressaceae

chinensis, siehe J. sinensis und Formen

communis arborea candelabriformis Kuph.	30—40	5.—	—
Kandelaberartiger Baumwacholder, dunkelgrün	40—50	6.—	—
	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
— pyramidalis pendula Kuph.	20—30	4.—	—
Baumwacholder mit hängenden dunkelgrünen	30—40	5.—	—
Zweigspitzen	40—50	6.—	—
	80—100	9.—	—
	125—150	15.—	—
— columnaris Hornibr.	60—80	8.—	—
Pyramidale Form, im Alter baumartig			
— compressa Carr. (J. com. hib. compacta Hort.) Δ	15—20	15.—	—
Zierliche Zwergssäulenform	20—25	20.—	—
	30—40	30.—	—
— cracovia Knight	40—60	4.—	—
Aufrechte, hellgrüne, harte Säulenform	100—125	7.—	—
	170	15.—	—
— depressa Pursh. (J. nana canadensis Carr.) Δ	(80—100	12.—	—
Ganz flach niederliegend	breit (125—150	15.—	—
— aurea Hort. (J. nana canad. aurea Hort.) Δ	(50—60	7.50	—
Goldgelbe Form	breit (60—70	9.—	—
— hibernica Gord. Irändischer Wacholder	40—60	4.—	—
Dichte, schmale, blaugrüne Säulenform	60—80	5.—	—
— compacta, siehe J. communis compressa			
— pyramidalis Hort.	40—60	3.50	280.—
Von etwas breiterem Wuchs als die Art	60—80	4.—	320.—
— hornibrooki Hort. Δ	30—40	5.—	420.—
Ganz flache hellgrüne Form	„ 50—60	10.—	—
— nana repanda Hort. Δ	30—40	5.—	—
Breit, grobnadelig, graugrün	„		
— oblongo-pendula Sudw.	30—40	5.—	—
Zierend, überhängend, langtriebzig	60—80	7.50	—
	80—100	9.—	—
— pendula Carr.	60—80	8.—	—
Hängeform des gemeinen Wacholders	100—125	10.—	—
— prostrata Beissn. Δ	60—80	10.—	—
Niederliegend, dicht rundlich	„ 80—100	12.—	—
— succulca Ait. Schwedischer Wacholder	40—60	3.50	—
Steif aufstrebend, Zweigspitzen überhängend	60—80	4.—	320.—
	130	10.—	—
conferta Parl. (J. litoralis Maxim.) Δ	15—20	5.—	—
Langnadelig, hellgrün, flach, Lärchenwacholder			
horizontalis douglasi Rehd. Δ	40—50	7.50	—
Niederliegend, stahlblau bis hellpurpur	breit		
— plumosa Rehd. Δ	30—40	4.—	320.—
Breitrund, graugrün, dichtfederig	„ 40—50	5.—	400.—

JUNIPERUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
horizontalis prostrata Hort. (J. sabina prostr. Loud.) Δ	30—40	5.—	—
Grün, dicht, flach			
japonica aurea , siehe J. sinensis plumosa aurea			
keteleeri , siehe J. sinensis keteleeri			
litoralis , siehe J. conferta			
macrocarpa Sibth. & Smith. (neaboriensis Laws.)	40—60	5.—	—
Nadeln lang pinselartig, Fr. blau bereift	60—80	6.—	—
	100—125	9.—	—
	150—175	15.—	—
nana canadensis , siehe J. com. depressa und Formen			
recurva densa , siehe J. squamata prostrata			
reevesiana , siehe J. sinensis femina			
sabina L. Gemeiner Sadebaum Δ	30—40	3.50	280.—
Dunkelgrün, ausgebreiteter Wuchs	40—60	5.50	350.—
	100—125 breit	70—80	8.—
	125—150 „	70—80	12.—
— cupressifolia Ait. (J. sab. humilis Endl.)	breit	60—80	8.—
Niederliegend, blaugrün Δ	„	100—125	15.—
— mas L. Δ	20—30	2.50	—
Männliche Form des grünen Sadebaumes	30—40	3.50	—
— prostrata , siehe J. horizontalis prostrata			
— tamariscifolia Ait. Δ	breit	20—30	4.—
Bläulichgrüne, breitgehende Form	„	30—40	5.—
	„	50—60	7.50
sinensis albo-variegata Veitch	30—40	4.50	—
Dichte Kegel mit weißen Zweigspitzen	40—60	5.50	—
	60—80	7.—	—
— aurea Young	20—30	5.—	—
Schlank, Färbung goldgelb, männlich			
— femina Beissn. (J. reevesiana Hort.)	20—30	3.50	—
Weiblich, schuppenförmig, überhängend	80—100	7.—	—
— japonica Lav.	hoch und breit	40—50	5.—
Gelblichgrün, buschig, sehr stachelig	„	60—70	7.—
— keteleeri Hort. (J. sinensis keteleeri Hort.)	150—175	15.—	—
Dunkelgrün, dicht pyramidal, schuppenförmig			
— pfitzeriana Spaeth Δ	hoch oder breit	30—40	3.50
Breite Pyramiden, kräftige,	„	40—60	4.50
waagerechte Äste	„	60—80	5.—
	„	80—100	6.—
	breit	100—125	9.—
	250 cm „	100	30.—
— plumosa aurea Hornibr. Δ	hoch und breit	20—30	3.50
(J. chin. procumb. aurea Beissn.)	„	30—40	5.—
(J. japonica aurea Hort.)	„	40—50	6.—
Goldgelb belaubt, übergebogene Äste	„	50—60	8.—
— sargentii Henry Δ	breit	30—40	5.—
Breitwachsend, grüne bis bläuliche Form	„	40—50	6.—
— stricta Hort. Δ	60—80	6.—	—
Dicht, blau, grobnadelig, breitpyramidal			

JUNIPERUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
<i>squamata meyeri</i> Rehd. Blauzeder-Wacholder Δ	20—30	3.—	240.—
Aufrecht, langsam wachsend, weißblau	30—40	4.50	320.—
	40—50	6.—	400.—
	50—60	7.—	500.—
	60—80	9.—	650.—
	100—125	12.—	—
	150—175	15.—	—
— <i>prostrata</i> Hornibr. Δ breit	40—50	6.—	—
Niederliegend, blauweiß.	50—60	7.50	—
	125—150	15.—	—
— <i>wilsoni</i> Rehd. Δ	20—30	3.50	—
Aufrechte grüne Form, leicht übergebogen	30—40	5.—	—
	40—50	6.—	—
	60—80	10.—	—
	100—125	15.—	—
<i>virginiana</i> L. Virginischer Wacholder	200—225	12.—	—
Dichte, graugrüne Pyramiden			
— <i>burki</i> Slavin	80—100	8.—	—
Blaugraue, eiförmige Form	100—125	10.—	—
— <i>canaerti</i> Sénécl.	40—60	4.50	—
Dicht, dunkelgrün, reicher Fruchtsatz	60—80	5.50	—
	80—100	7.—	—
	150—175	15.—	—
	200—225	24.—	—
— <i>elegantissima</i> Hochst.	60—80	5.50	—
Pyramidal, junge Zweigspitzen goldgelb			
— <i>glauca</i> Carr.	40—60	4.50	—
Üppige, blaugrüne Form	200—250	15.—	—
— — <i>pendula</i> Sim.-Louis	60—80	6.—	—
Überhängend, blaugrau, schuppenförmig			
— <i>globosa</i> Beissn. Δ hoch und breit	50—60	6.—	—
Dicht kugelig, hellgrün			
— <i>kosterlana</i> Beissn. Δ breit	40—50	4.50	—
Niedrig, zierlich schuppig	80—100	9.—	—
	80—100	15.—	—
— <i>nana compacta</i> Beissn. Δ 150—200 "	40—50	7.50	—
Blaugrüne Kugelform			
— <i>pendula</i> Carr.	60—80	10.—	—
Männlich, überhängend, frischgrün	80—100	12.—	—
— <i>pseudocupressus</i> Hort.	60—80	5.—	—
Säulenförmig, grau-blaugrün	225—250	18.—	—
— <i>pyramidalis glauca</i> Beissn.	60—80	10.—	—
Säulenförmig, blaugrün, nadelförmig	80—100	12.—	—
	100—125	15.—	—
	150—175	20.—	—
— <i>schottii</i> R. Smith	60—80	8.—	—
Frischgrün, buschig pyramidal	100—125	10.—	—
— <i>tripartita</i> Beissn. Δ	40—50	6.—	—
Niedrigbleibend, dichte kurze Zweige			
LARIX — Lärche — Pinaceae			
<i>leptolepis pendula</i> Beissn. Δ	60—80	10.—	—
Hängeform der japanischen Lärche			
Halbstamm 80—100 cm Stammhöhe	150	15.—	—
PICEA — Fichte, Rottanne — Pinaceae			
<i>ajanensis</i> Fisch. Ajanfichte (P. jezoensis Carr.)	150—175	24.—	—
Unterseits blauweiße Nadeln, zierlich			

PICEA (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
ajanensis aurea P. Smith (<i>P. jezoensis aurea</i> Hort.) Goldgelb schimmernde Form, auffallend	20—30	5.—	—
alba , siehe <i>P. glauca</i>			
albertiana conica Bean. Zuckerhutfichte Δ	20—30	3.50	240.—
Langsam wachsend, hellgrün, weichnadelig	30—40	4.50	320.—
	40—50	6.—	400.—
	50—60	7.50	500.—
	60—70	9.50	650.—
	140	20.—	—
alcockiana Carr. (<i>P. bicolor</i> Mayr)	80—100	10.—	—
Spätaustreibend, dicknadelig, dicht bezweigte Äste	150—175	24.—	—
	200—225	45.—	—
	300—350	60.—	—
	200—225	25.—	—
brachytyla Pritz.			
Zweige hängend, Nadeln unten auffallend weiß			
breweriana Wats.	40—60	8.—	—
Dunkelblaugrün, lang herabhängende Zweige	60—80	9.—	—
excelsa Link. Rotfichte, Rottanne	60—80	1.80	120.—
Heimischer, bekannter Nadelbaum	80—100	2.40	160.—
— acrocona Fries. Δ	40—60	7.—	—
Schon in der Jugend starke, zierende Zapfenbildung	60—80	9.—	—
	80—100	12.—	—
	100—125	15.—	—
	125—150	18.—	—
	150—175	24.—	—
	275—300	30.—	—
— alpestris Bruegger Alpenfichte Δ			
Gedrungen, derbnadelig, bläulich bereift			
— argenteo-spicata Hesse	60—80	6.—	—
Wirkungsvoller weißer Austrieb	80—100	7.—	—
	100—125	8.—	—
	125—150	10.—	—
— barryi Beissn. Δ	20—30	5.—	—
Stumpfkegelige Zwergform, schwachwachsend	40—60	6.—	—
— clanbrassiliana Carr. Δ	20—30	4.—	—
Gedrungene, rundliche, dichte Zwergform	40—60	6.—	—
— columnaris Carr. Säulenfichte	150—175	12.—	—
Starkwachsend, dichte schmale Säulen	200—250	18.—	—
— compacta Sénécl.	20—30	2.50	200.—
Zierlich, Wuchs dicht, rundlich	40—50	5.—	—
	60—80	7.50	—
	400—425	40.—	—
— cranstoni Carr.	125—150	9.—	—
Aufrechter Schaft mit wenig Verzweigung	150—175	12.—	—
— cupressina Thomas, Zypressenfichte	30—40	4.—	—
Dichtgeschlossen, Form einer Pyramidenpappel	200—225	18.—	—
	300—350	25.—	—
— echiniformis Beissn. Igelfichte Δ hoch und breit	15—20	7.50	—
Kissenartig, grob igelförmig benadelt	20—30	10.—	—
	30—40	18.—	—
	50—60	30.—	—
— gregoryana Beissn. Δ	30—40	6.—	—
Kurzadelig, dichte rundliche Zwergform	40—50	7.50	—
	60—70	12.—	—
— veitchi Hornibr. Δ	10—15	4.—	—
Breit kegelförmig, gescheitelte Nadeln	20—30	8.—	—
	30—40	12.—	—
	40—50	15.—	—

PICEA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM	100 St FM
<i>excelsa humilis</i> Beissn. Δ	20—30	4.—	—
Rundliche dichte Kissen, feinzweigig	80—100	12.—	—
— <i>inversa</i> Beissn. Hängefichte Δ	40—60	5.—	—
Äste und Zweige stark hängend	60—80	7.—	—
	80—100	10.—	—
	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
	175—200	20.—	—
— <i>mariae-orffii</i> Hesse Δ	30—40	18.—	—
Hexenbesenartige, frischgrüne Kugel			
— <i>maxwelli</i> Beissn. Δ hoch und breit	20—30	3.50	240.—
Dicht, flachkugelig, hellgrüner	30—40	4.50	—
Zwerg	50—60	8.—	—
	70—80	10.—	—
	80—100	12.—	—
— <i>merki</i> Beissn. Δ	20—30	4.—	—
Dichte breite Zwergform			
— <i>nana compacta</i> Hort. Δ	40—50	6.—	—
Abgeplattete, kurzweilige Zwergform			
— <i>nidiformis</i> Beissn. Nestfichte Δ hoch und breit	20—30	3.50	240.—
Kissenbildend, ohne Mitteltrieb	30—40	4.50	320.—
	40—50	6.—	—
	125—150	15.—	—
— <i>parviformis</i> Beissn. Δ	30—40	4.50	—
Breitpyramidale Zwergform			
— <i>pendula major</i> Beissn.	125—150	15.—	—
Großnadelig, Zweige hängend, locker beästet	150—175	20.—	—
— <i>procumbens</i> Carr. Δ breit	20—30	3.50	240.—
Flach auf dem Boden aufliegende Form	30—40	4.50	—
	50—60	7.50	—
	60—70	10.—	—
	80—100	15.—	—
— <i>pumila glauca</i> Beissn. Δ	20—30	3.50	240.—
Dichte, plattrunde, blaue Zwergform			
— <i>nigra</i> Beissn. Δ	30—40	4.50	—
Dunkelgrüne, plattrunde Zwergform	60—70	10.—	—
— <i>pygmaea</i> Carr. Gnomenfichte Δ	20—30	3.50	—
Hellgrüne, dichte Kegel	40—50	6.—	—
	50—60	7.50	—
	60—80	9.—	—
— <i>remonti</i> Beissn. Δ	30—40	5.—	—
Spitzkegelig, regelmäßig, dichtzweigig	60—80	9.—	—
— <i>virgata</i> Casp. Schlangenfichte	150—175	12.—	—
Mit sehr gering bezweigten Ästen			
<i>glauca</i> Voss. (P. alba Link.)	100—125	3.50	—
Nordamerikanische Weißfichte, Wildverbißsicher			
— <i>albertiana conica</i> , siehe P. albertiana conica			
<i>glehnii</i> Mast.	40—60	6.—	—
Kurznadelig, oberseits graugrün	175—200	24.—	—
	200—225	30.—	—
	300—350	75.—	—
<i>jezoensis</i> , siehe P. ajanensis und Formen			
<i>mariana beissneriana</i> Rehd. Wilhelmhöher Schwarz-	40—50	7.—	—
Fichte; Kurznadelige, dichte graublaue Pyramiden	50—70	8.—	—
	70—90	12.—	—
	100—125	15.—	—
	150—175	20.—	—

PICEA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
mariana nana Rehd. (<i>P. nigra pumila glauca</i> Hort.) breit	10—15	4.—	—
Kurznadelig, kissenartig, blaugrau Δ	15—20	5.—	—
„	20—30	6.—	—
„	30—40	8.—	—
„	40—50	10.—	—
morinda Link. Himalaya-Fichte	200—225	30.—	—
Tiefdunkelgrün, langnadelig, dekorativ			
nigra pumila glauca , siehe <i>P. mariana nana</i>			
omorika Purk. Serbische Fichte	60—80	3.50	220.—
Schmalpyramidal, dunkelgrün mit weißer	80—100	4.50	280.—
Unterseite	100—125	5.—	360.—
	125—150	7.—	450.—
	150—175	9.—	600.—
	175—200	12.—	—
	200—225	15.—	—
	225—250	18.—	—
	250—300	24.—	—
	350—400	50.—	—
orientalis Link.	60—80	4.50	300.—
Glänzend dunkelgrün, kurznadelig	80—100	5.50	—
— aureo-spicata Beissn.	80—100	9.—	—
Sehr zierender, goldgelber Austrieb	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
	150—175	18.—	—
	175—200	24.—	—
	300	75.—	—
— gracilis Beissn. Δ	30—40	5.50	—
Zierlich benadelte Zwergpyramide	40—50	6.50	—
	60—80	9.—	—
	150—175	20.—	—
— nutans Niemetz	175—200	18.—	—
Elegant überhängende Bezweigung	300—350	50.—	—
pungens glauca endtzi Hort.	40—50	10.—	—
Lebhaft weißblau, weichnadelig			
— — kosteri Hort	40—60	10.—	—
Prächtig graublau gefärbte Blaufichte	60—80	12.—	—
— — pendula Beissn.	60—80	12.—	—
Silberweiße Hängeform der Blaufichte	80—100	15.—	—
	100—125	20.—	—
purpurea Mast. Purpur-Fichte	40—60	8.—	—
Spitzkegelig, kleinnadelig, dunkelbraun, dicht	60—80	10.—	—
	80—100	15.—	—
	100—125	20.—	—
	125—150	25.—	—
	150—175	30.—	—
	175—200	50.—	—
wilsoni Mast. (<i>P. watsoniana</i> Mast.)	125—150	15.—	—
Schlankzweigig, feinnadelig, dunkelgrün	150—175	18.—	—

PINUS — Kiefer, Föhre — Pinaceae

cembra L. Zürbelkiefer, Arve (5)	60—80	5.—	360.—
Heimische Kiefer, dicht schmalpyramidal	80—100	6.—	450.—
	100—125	8.—	600.—
	125—150	10.—	—
— pygmaea Carr. (5) Δ	70—80	10.—	—
Zwergkiefer, blaugrau, großfrüchtig			

PINUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
<i>densiflora</i> Sieb. & Zucc. (2)	30—40	4.—	—
Feine pinselartige Benadelung, bläulichgrün			
— <i>pumila</i> Hort (2) Δ	30—40	5.—	—
Lebhaftgrüne Zwergkiefer			
<i>excelsa</i> Wall. Tränenkiefer (5)	40—60	3.50	—
Langnadellg, bläulichweißgrün			
<i>koraiensis</i> Sieb. & Zucc. Korea-Kiefer (5)	200—225	25.—	—
Langsam wachsend, ähnlich <i>P. cembra</i>			
<i>laricio</i> siehe <i>P. nigra</i> und Formen			
<i>leucodermis</i> Ant. Schlangenhautkiefer (2)	60—80	8.—	—
Schwarzgrün, starr, lebhaft gelb blühend	80—100	10.—	—
	200—250	20.—	—
<i>maritima</i> , siehe <i>P. pinaster</i> und Formen			
<i>montana</i> Mill. Bergkiefer (2)	30—40	3.50	240.—
Strauchartige, heimische Kiefer	40—60	4.—	280.—
— <i>mughus</i> Willk. Zwerggatsche (2) Δ	30—40	4.—	280.—
Dichtbuschig, niederliegende Krummholzkiefer			
— <i>pumilio</i> Willk. Legföhre (2) Δ	20—30	3.50	240.—
Breitwachsend, dunkelgrün			
<i>nigra austriaca</i> Aschers. & Graebn. (2)	40—60	3.50	—
Üppige schwarzgrüne österr. Schwarzkiefer			
<i>parviflora</i> S. & Z. (<i>P. pentaphylla</i> Mayr.) (5)	250—275	30.—	—
Prächtige pyramidale Mädchenkiefer, grün			
— <i>glauca</i> Beissn. (5)	40—60	8.—	—
Blaue Form der Mädchenkiefer	60—80	10.—	—
	100—125	15.—	—
<i>peuce</i> Griseb. Rumelische Weymouthskiefer (5)	200	15.—	—
Spitzpyramidal, hart, langsam wachsend	250—275	30.—	—
<i>pinaster hamiltoni</i> Gord. (2)	175—200	25.—	—
Üppig, breitkronig, dunkelgrün			
<i>resinosa</i> Alt. Amerikanische Rotkiefer (2)	200—225	20.—	—
Sehr langnadellig, breitkronig			
<i>silvestris argentea compacta</i> Ordn. (2) Δ	30—40	5.—	—
(<i>P. silv. watereriana</i> Hort.)	80—100	12.—	—
Dichte, rundliche, stahlblaue Form	175—200	25.—	—
— <i>fastigiata</i> Carr. (2)	30—40	4.—	—
Auffallend blau, straff aufrecht, schmal	100—125	12.—	—
	150—175	18.—	—
<i>tabuliformis</i> Carr. (<i>P. sinensis</i> Mayr. (2—3))	200—250	30.—	—
Grün benadelt, leicht grau angehaucht			

PSEUDOTSUGA — Douglasfichte — Pinaceae

<i>douglasii pyramidalis brevifolia</i> Hort. Δ	60—80	10.—	—
Kurznadellig, hellgrün, schwachwachsend	80—100	12.—	—
	100—125	15.—	—
<i>glauca compacta glauca</i> Fitschen Δ	125—150	25.—	—
Kurznadellig, blaugrün, schwachwachsend			

RETINISPORA, siehe *Chamaecyparis obtusa* und *pisifera*SALISBURIA, siehe *Ginkgo biloba*

SCIADOPITYS — Schirmtanne — Taxodiaceae

<i>verticillata</i> Sieb. & Zucc.	60—80	20.—	—
Hart, sehrzierend, Nadeln lang, frischgrün	80—100	25.—	—
	100—125	30.—	—

SEQUOIA — Sequoie *Taxodiaceae*

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
<i>gigantea</i> Decne. Mammutbaum m. Tb.	20—30	10.—	—
Spitze Pyramide, dunkelblaugrün			
— <i>pyramidalis</i> Beissn.	200—250	75.—	—
Ausgesprochen straff pyramidal wachsend			

TAXODIUM — Sumpfyzypresse — *Taxodiaceae*

<i>distichum</i> Rich. Sumpfyzypresse	80—100	10.—	—
Frischgrün, pyramidal, Laub abwerfend	100—125	12.—	—

TAXUS — Eibe — *Taxaceae*

<i>baccata</i> L. Heimische gemeine Eibe	30—40	3.50	220.—
Dunkelgrün, zu Unterpflanzung und Hecken	40—60	4.50	280.—
	60—80	5.50	360.—
	80—100	7.—	—
	100—125	9.—	—
	150—175	15.—	—
— <i>adpressa</i> Carr.	60—80	10.—	—
Breite, niedrige, unregelmäßige Büsche	80—100	12.—	—
— <i>aurco-variegata</i> Beissn. Δ	20—30	5.—	—
Goldgelb mit grünen Streifen	30—40	6.—	—
— <i>stricta</i> Beissn.	100—125	12.—	—
Schnellwachsend, straff aufstrebend			
— <i>aureo-variegata</i> Beissn.	60—80	8.—	—
Auffallende, goldbunte Form			
— <i>conica</i> Hort.	80—100	8.—	—
Schmalpyramidale Form			
— <i>davisiae</i> CS.	60—80	7.—	—
Schlankpyramidal, schön blaugrün	80—100	9.—	—
	100—125	12.—	—
	150—175	18.—	—
— <i>dovastoni aureo-variegata</i> Beissn. Δ breit	30—40	5.—	—
Goldbunt, aufstrebend, leicht überhängend	50—60	8.—	—
— <i>elegantissima</i> Beissn.	40—60	6.—	—
Lebhaft goldbunte Form			
— <i>crecta aureo-variegata</i> Beissn.	40—60	6.—	—
Zierlich hellgelb-bunte Form	175—200	30.—	—
— <i>overeynderi</i> Hort.	80—100	10.—	—
Wertvolle breite Pyramidenform, dunkelgrün	125—150	15.—	—
	150—175	18.—	—
	175—200	24.—	—
— <i>ericoides</i> Carr. Δ	40—50	5.—	—
Schwachwüchsige Zwergform, Nadeln sehr spitz	50—60	6.—	—
— <i>fastigiata</i> Loud. (T. bacc. hibernica Hort.)	60—80	12.—	—
Dunkelgrüner Säulen-Eibenbaum	80—100	15.—	—
	150—175	25.—	—
	200	30.—	—
— <i>aurea</i> Stand. Δ	20—30	6.—	—
Fast rein goldgelb			
— <i>aureo-variegata</i> Beissn.	60—80	12.—	—
Sehr schön goldbunt	80—100	15.—	—
	100—125	18.—	—
	125—150	24.—	—
	175—200	30.—	—
— <i>hessei</i> Hort. Hesse	30—40	4.50	280.—
Konstant frischgrün, straff, wüchsig	40—60	5.50	360.—
	60—80	7.—	450.—
Wertvolle Heckentaxus!	80—100	9.—	—
— <i>hibernica</i> , siehe T. bacc. <i>fastigiata</i> und Formen			

TAXUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
<i>baccata horizontalis</i> Knight Δ breit	60—70	10.—	—
Ausgebreitete, weitgestellte Äste			
— <i>imperialis</i> Beissn.	80—100	9.—	—
Schlank aufstrebend, lebhaftgrün	100—125	12.—	—
— <i>Jacksoni</i> Gord.	40—60	6.—	—
Straff pyramidal, hellgrün	60—80	7.—	450.—
	100—125	12.—	—
	150—175	15.—	—
	175—200	20.—	—
— <i>nana</i> Knight. Δ	40—60	6.—	—
Dunkelgrün, breite, dichte Kugel	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
	150—175	18.—	—
— <i>Nedpath Castle</i> Beissn.	150—175	18.—	—
Breit säulenförmig, blaugrün	175—200	20.—	—
<i>brevifolia</i> Nutt. Δ	15—20	4.50	—
Langsam wachsend, ausladend, gelbgrün	20—30	5.50	—
	70—80	20.—	—
	80—100	25.—	—
<i>canadensis</i> Marsh. Δ	40—60	4.50	—
Hellgrün, dichtbenadelt, breiter Wuchs	80—100	7.—	—
<i>cuspidata nana</i> Rehd. (T. <i>cuspidata compacta</i> Bean) Δ .	15—20	4.—	—
Dichter, niedriger Busch			
THUJA — Lebensbaum — Cupressaceae			
<i>gigantea</i> , siehe Th. <i>plicata</i> und Formen			
<i>gigantea aurescens</i> , siehe Th. <i>occidentalis aureo-spicata</i>			
<i>japonica</i> , siehe Th. <i>standishi</i>			
<i>koraiensis</i> Nakai. Korea-Lebensbaum	30—40	5.—	—
Breit, unterseits auffallend blauweiß	40—60	6.—	—
	60—80	8.—	—
	100—125	15.—	—
<i>occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum	40—60	1.80	120.—
Weitverbreitete Heckenpflanze, wüchsig, hart	60—80	2.40	150.—
	80—100	3.—	220.—
	100—125	4.—	280.—
— <i>albo-variegata</i> Beissn.	30—40	2.—	—
Konstant weißbunte Form	40—60	2.50	—
	80—100	4.—	—
	100—125	5.—	—
	125—150	7.—	—
	150—175	9.—	—
— <i>aureo-spicata</i> Beissn. (Th. <i>gigantea aurescens</i>)	40—60	2.50	160.—
Üppige Heckenpflanze, glänzend gelblichgrün	60—80	3.50	220.—
	100—125	5.—	—
	125—150	7.—	—
	200—225	15.—	—
— <i>bodmeri</i> Beissn.	40—60	2.50	—
Monströs übergebogene Zweige	60—80	3.50	—
	100—125	5.—	—
	150—175	8.—	—
	200—225	12.—	—
— <i>buchanani</i> Parsons	40—60	2.50	—
Zierlich, feinzweigig, graugrün	60—80	3.50	—
	80—100	4.—	—
	100—125	5.—	—
	250—275	20.—	—

THUJA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
<i>occidentalis columbia</i> Parsons	100—125	5.—	—
Üppige Säulenform mit weißen Zweigspitzen	125—150	6.—	—
— <i>columna</i> Spaeth. Echt! Keine Sämlinge!	60—80	3.50	220.—
Schlanke, regelmäßige, dichtbezweigte Säulen	80—100	4.50	280.—
	100—125	5.50	360.—
— <i>cristata</i> Carr.	100—125	5.—	—
Mit Hahnenkamm-artigen Zweigspitzen			
— <i>aurea</i> Beissn.	30—40	2.50	—
Hahnenkamm-artig mit goldenen Spitzen	40—60	4.—	—
— <i>douglasi pyramidalis</i> Spaeth	60—80	3.50	—
Langsam wachsende Pyramide, dunkelgrün	150—175	7.—	—
	350—400	40.—	—
— <i>ellwangerlana</i> Beissn.	200—225	15.—	—
Harte, dichtbezweigte Pyramide			
— — <i>Rheingold</i> Vollert Δ	60—80	10.—	—
Kegelförmig, hellgoldgelb			
— <i>fastigiata</i> , siehe <i>Th. occidentalis stricta</i>			
— <i>filliformis</i> Beissn.	40—60	4.—	—
Kegelförmig, Zweige fadenförmig überhängend	60—80	5.—	—
	80—100	6.—	—
	150—175	15.—	—
— <i>froebell</i> Hort Δ (<i>Th. occ. glob. comp.</i> Beissn.)	30—40	4.—	—
Schön eirund, frischgrün, gedrunen			
— <i>globosa</i> Gord. Δ hoch und breit	20—30	2.50	160.—
Regelmäßige Kugel, Zweige fein und dicht „	30—40	4.—	240.—
	70—80	7.50	—
— — <i>compacta</i> , siehe <i>Th. occ. froebeli</i>			
— <i>gracilis</i> Hort.	60—80	5.50	—
Zierlich verästelt, schön pyramidal	100—125	9.—	—
	150—175	15.—	—
	275—300	40.—	—
— <i>hoveyi</i> Gord.	40—60	4.—	—
Gedrunen, eirundlich, hellgrün			
— <i>Little Gem</i> Beissn. Δ hoch und breit	40—50	6.—	—
Ganz gedrunener Zwerg, dunkelgrün „	50—60	8.—	—
— <i>malonyana</i> Hort.	200—225	15.—	—
Ganz schmale grüne Säulenform			
— <i>ohlendorffi</i> Beissn. (<i>Th. occ. spaethi</i> Hort.)	20—30	4.—	—
Monströse und fadenförmige Zweige			
— <i>pendula</i> Gord.	100—125	6.—	—
Stark abwärts hängende Äste und Zweige	175—200	12.—	—
— <i>recurva nana</i> Carr. Δ hoch und breit	20—30	4.—	300.—
Dichte, rundliche, regelmäßige Kegel „	100—125	15.—	—
— <i>recurvata</i> Beissn.	40—60	4.—	—
Gedrunene Pyramide, Spitzen gedreht			
— <i>rosenthalii</i> Ohlend.	30—40	2.—	—
Glänzend dunkelgrüne Säulenform	40—60	3.—	220.—
	60—80	3.50	—
	200—225	15.—	—
— <i>spaethi</i> , siehe <i>Th. occ. ohlendorffi</i>			
— <i>stricta</i> Hort. (<i>Th. occ. fastigiata</i> Hort.)	125—150	6.—	—
Kurzzweigige auffallende Säulenform			
— <i>umbraculifera</i> Beissn. Δ hoch und breit	20—30	2.50	—
Niedrig, dicht, regelmäßige flachrund „	30—40	4.—	—
	60—70	8.—	—
	70—80	10.—	—

THUJA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
<i>occidentalis vervaenaeana</i> Henk. & Hochst.	150—175	8.—	—
Breitpyramidal, feine Bezweigung, gelblichbrunze			
— <i>wagneriana</i> Froebel	40—60	3.50	—
Regelmäßige dichte Pyramide, sehr fein	60—80	4.50	—
	80—100	5.50	—
— <i>wareana</i> Nelson	40—60	3.—	—
Dunkelgrün, gedrunge, wertvoll	200—220	15.—	—
— <i>Waxen</i> Arn. Arb.	125—150	6.—	—
Zierlich, locker, nickend, grünlichgelb			
	300—350	35.—	—
<i>plicata</i> D. Don. (Th. gigantea Nutt.)	200—225	15.—	—
Prächtig glänzendgrün, großwedelig			
— <i>aureo-variegata</i> Beissn.	40—60	3.50	—
Sehr auffallend goldbunte Form	100—125	6.—	—
	125—150	7.—	—
— <i>fastigiata</i> CS.	80—100	5.—	—
Schlank aufwachsende Form	100—125	6.—	—
	150—175	8.—	—
	175—200	10.—	—
<i>standishi</i> Carr. (Th. japonica Maxim.)	100—125	7.—	—
Gelbgrün, leicht überhängende rundliche Bezweigung	150—175	10.—	—

THUJOPSIS — Hibalebensbaum — Cupressaceae

<i>borealis</i> , siehe <i>Chamaecyparis nootkatensis</i>			
<i>dolabrata</i> Honda Makino	40—60	5.—	—
In allen Teilen dichter, kleiner als die Art	60—80	7.—	—
	80—100	9.—	—
— <i>nana</i> Sieb. & Zucc. Δ	20—30	5.—	—
Dicht, feinzweigig, kleinschuppig			
— <i>variegata</i> Fortune	300—350	100.—	—
Einzelne Zweige schön weißbunt			

TORREYA — Stinkeibe — Taxaceae

<i>nucifera</i> Sieb. & Zucc.	200—250	60.—	—
Grobnadelig, zweizeilig, glänzend dunkelgrün			

TSUGA — Hemlockstanne — Pinaceae

<i>canadensis</i> Carr.	40—60	4.—	—
Sehr zierlich dunkelgrün, leicht überhängend	80—100	8.—	—
— <i>albo-spicata</i> Beissn.	40—50	7.—	—
Im Austrieb schön weißbunt			
— <i>compacta</i> (nana) Sénécl. (Ts. canad. minima Hesse)	40—50	7.50	—
Dichtzweigig, gedrunge, niedliche Kugel Δ			
— <i>macrophylla</i> Hort.	100—125	15.—	—
Raschwachsende, üppige, gröbere Form.			
— <i>minima</i> , siehe Ts. canad. compacta			
— <i>parvifolia</i> P. Smith	40—60	7.50	—
Schön zierlich, kleinblättrige Form			
— (<i>sargentii</i>) <i>pendula</i> Beissn.	40—60	7.50	—
Stark hängend, sehr zierend, als Solitär	125—150	20.—	—
	175—200	30.—	—
<i>mertensiana glauca</i> Hort. (Ts. pattoniana glauca Hort.)	20—30	6.—	—
Kurzadelig, blaugrau, langsam wachsend	40—50	8.—	—
	50—60	10.—	—

pattoniana, siehe Ts. *mertensiana* und Formen

WELLINGTONIA, siehe *Sequoia*

Laubhölzer

ZIERSTRÄUCHER-SORTIMENTE

Ziersträucher, in guten Sorten	100 Stück DM	60.—
„ besonders schöne Zusammenstellung	100 „ „	120.—

Allee-, Solitär-, Zier- und Straßenbäume
Buntblättrige und schönblühende Ziersträucher
Heckengehölze für Knicks und Windschutz
Immergrüne und Moorbeetpflanzen

		1 Stck. DM	100 Stk. DM
ABELIA — Abelia — <i>Caprifoliaceae</i>			
grandiflora Rehd. Felsenabelie	m. Tb. 15—20 cm hoch	2.—	—
Halbimmergrün, B. dunkelgrün, Bl. rosaweiß, D			
spatulata Sieb.	m. B. 60—80 cm hoch	2.50	—
Reichverzweigt, B. hellgrün, Bl. weiß mit Gelb, 100, V—VII			
ACANTHOPANAX — Stachelkraftwurz — <i>Araliaceae</i>			
henryi Harms (Eleutherococcus) †	m. B. 100—120 cm hoch	3.50	—
Baumartig, derbstachelig, B. 5zählig, Bl. grünlichweiß, Fr. schwarz, 1—3 m, VIII			
sieboldianus Mak. (A. spinosus, <i>Aralia penthaphylla</i>)			
Schön belaubt, kräftig bestachelt, 1,5—3m, VIII, H	80—100 cm hoch	1.—	—
ACER — Ahorn — <i>Aceraceae</i>	B		
campestre L. Feldahorn	Büsche 80—100 cm hoch	1.—	80.—
B. klein, quirlförmig beästet, 12 m, V, H			
cappadocicum rubrum , siehe A. laetum rubrum			
carpinifolium Steb. & Zucc. *	m. B. 100—125 cm hoch	2.—	—
B. frischgrün, im Herbst braungelb, V, H			
cissifolium K. Koch *	200—250 cm hoch	3.—	—
B. dreiteilig, hellgrün, Bl. gelb, IV	250—300 „ „	3.50	—
dasycarpum , siehe A. saccharinum und Formen			
ginnala Maxim. H. *	100—120 cm hoch	1.40	110.—
B. zierlich, Fr. rot, bis 5m, V			
heldreichi Orph. *	Hochst. 8/10 cm Umfg.	5.—	—
B. tiefgelappt, glänz. dklgrün.	„ 12/14 „ „	7.50	—
laetum rubrum Rupr. (A. cappadocicum rubrum Nast.) *			
Austrieb tiefrot, schmalkronig	125—150 cm hoch	3.—	—
lobeli Ten.	Hochst. 6/8 cm Umfg.	5.—	—
B. 5lappig, tiefgrün, f. enge Straßen	„ 8/10 „ „	6.—	—
negundo aureo-variegatum Booth	60—80 cm hoch	2.—	—
B. dunkelgrün, goldgelb gefleckt			

ACER (Fortsetzung):

				1 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>negundo variegatum</i> Carr.	60—80 cm hoch			2.—	—
B. weißbunt	Stammhöhe 120—140 cm			3.—	—
	„ 140—160 „			4.—	—
<i>palmatum</i> Thbg. (A. polymorphum S. & Z.)					
m. B.	100—125 cm hoch			1.50	—
B. zierlich geschlitzt, Fächerahorn *					
— <i>atripurpureum</i> Nichols.	40—60 „ „			7.—	—
B. konstant schwarzrot	60—80 „ „			9.—	—
— <i>cristatum</i> Schwer. & Hesse	80—100 „ „			15.—	—
B. schneckenförmig, schwachwüchsig					
— <i>hessel</i> Schwer.	80—100 „ „			15.—	—
B. sehr schön dunkelpurpurn					
— <i>minus</i> Nichols. (A. palm. ribesifolium)	80—100 „ „			15.—	—
B. grün, klein, tief geschlitzt, zierlich					
— <i>sinuatum</i> Schwer.	80—100 „ „			7.50	—
B. groß, grün, tief eingeschnitten					
— <i>versicolor</i> Schwer.	60—80 „ „			12.—	—
B. freudig grün, hell gefleckt					
— <i>volubile</i> Schwer.	60—80 „ „			7.—	—
B. hell- bis dunkelgrün, Mittellappen spiralig					
<i>platum</i> Thbg. Mandschurischer Ahorn	150—175 „ „			3.—	—
B. 5—7lappig, Austrieb bräunlich, IV—V					
<i>platanoides</i> L. Spitzahorn *	Hochst. 8/10 cm Umfg.			3.75	300.—
B. spitzgelappt, heimischer	„ 10/12 „ „			5.—	—
Wald- Park- und Alleebaum	„ 12/14 „ „			6.25	—
bis 30 m, IV—V	„ 14/16 „ „			7.50	—
	„ 16/18 „ „			9.—	—
	„ 18/20 „ „			12.50	—
— <i>aureo-marginatum</i> Pax.	„ 10/12 „ „			6.25	—
B. gelbbunt, unregelmäßig					
<i>drummondii</i> Drum.	„ 6/8 „ „			3.75	—
B. graugrün, weißrandig, Austrieb rosa	„ 8/10 „ „			5.—	—
— <i>globosum</i> Nichols. Kugelahorn	200—220 Sth. 10/12 „ „			6.25	—
Dichte Kugelkrone, f. Vogelschutz					
und enge Straßen					
— <i>pictum</i> Hesse	Hochst. 10/12 „ „			6.25	—
B. weiß bepudert und marmoriert					
— <i>reitenbachii</i> Nichols. (A. plat. rubrum Herd.)					
B. schwärzlichrot, Austrieb dklrot	Heister 200—250 cm hoch			3.75	—
	Hochst. 6/8 cm Umfg.			4.50	—
	„ 8/10 „ „			5.—	450.—
	„ 10/12 „ „			6.25	—
— <i>schwedleri</i> K. Koch *	Heister 200—250 cm hoch			3.75	—
B. olivgrün, Austrieb leuchtend	Hochst. 6/8 cm Umfg.			4.50	—
blutrot, prachtvoller Alleebaum	„ 8/10 „ „			5.—	450.—
<i>pseudoplatanus</i> L. Bergahorn	„ 6/8 „ „			3.—	—
B. platanenartig, grün, breitkroniger	„ 8/10 „ „			3.75	350.—
Park- und Alleebaum für feuchten	„ 10/12 „ „			5.—	—
Boden, bis 30 m, V					

ACER (Fortsetzung):

				1 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>pseudoplatanus lutescens</i> Heinh.	Hochst.	8/10 cm	Umfg.	5.—	—
B. leuchtend gelb, Schöner Austrieb					
— <i>nizeti</i> Schwer.	"	10/12	" "	6.25	—
Austrieb rotbraun, B. später dunkelgrün mit gelben Flecken	"	14/16	" "	9.25	—
— <i>purpurcum</i> Loud.	"	12/14	" "	7.50	—
B. unterseits purpurviolett					
<i>rubrum</i> L. Rotahorn *		175—200 cm	hoch	3.—	—
B. meist 5lappig, sattgrün, unten blaugrau, Bl. und Fr. schön rot, bis 35 m, III—IV					
<i>saccharinum lutescens</i> Pax. (A. <i>dasycarpum lutescens</i> Spaeth.)					
Austrieb leucht. gelb, *	Hochst.	8/10 cm	Umfg.	6.25	—
— <i>pyramidale</i> Spaeth		175—200 cm	hoch	3.—	—
Straff-aufrecht wachsend, B. am Rande nach oben gebogen	Hochst.	6/8 cm	Umfg.	4.—	350.—
	"	8/10	" "	5.—	450.—
— <i>wieri</i> (<i>laciniatum</i>) Pax		250—300 cm	hoch	4.—	—
B. zierlich, feingeschlitzt, als Einzelbaum wertvoll	Hochst.	6/8 cm	Umfg.	5.—	—
	"	8/10	" "	6.25	500.—
	"	12/14	" "	9.25	—
	"	14/16	" "	12.50	—
<i>saccharum</i> Marsh. Zuckerhorn *	"	8/10	" "	6.25	—
B. blaugrau mit roten Stielen, 3—5lappig					
<i>sieboldianum</i> Miquel *	m.B.	80—100 cm	hoch	6.—	—
B. ähnlich A. <i>japonicum</i> , Austrieb hellgelb, rosa gerandet	"	100—125	" "	7.50	—
<i>trautvetteri</i> Medwed. †	Hochst.	8/10 cm	Umfg.	6.25	—
B. rot gestielt, tief 5lappig					

AESCULUS — Gemeine Kastanie — Hippocastanaceae

carnea Hayne (Aesc. rubicunda Loisl.) B							
B. nußartig, 5teilig	200	cm	Sth. Hochst.	8/10	cm	Umfg.	7.50 —
rundkronig, Bl. rot	200	" "	"	10/12	" "		9.50 —
	200	" "	"	14/16	" "		15.— —
	200—220	" "	"	20/25	" "		40.— —
— brioti Nichols. B	200	" "	"	8/10	" "		7.50 —
Bl. rot, langtriebg.	200—220	" "	"	20/25	" "		40.— —
— plantierensis , siehe Aesc. plantierensis							
flava , siehe Aesc. lutea							
hippocastanum L. Roßkastanie B			Hochst.	10/12	" "		5.— 400.—
Bekannter Park- u. Straßenbaum			"	12/14	" "		6.25 500.—
mit großen weißen Blütenständen							
— baumanni CS. (Aesc. hipp. plena Lemm.)							
Bl. weiß gefüllt	200—220	cm	Sth. Hochst.	10/12	" "		9.50 —
ohne Früchte	200—220	" "	"	14/16	" "		15.50 —
	200—220	" "	"	20/25	" "		40.— —
— laciniata Leroy				100—125	cm hoch		3.— —
B. tief und unregelmäßig eingeschnitten							
— memmingeri Hort.			Hochst.	10/12	cm Umfg.		9.50 —
B. gelb gestrichelt und bestäubt							
— plena , siehe Aesc. hipp. baumanni							
— pyramidalis S.—L.	200—220	cm	Sth.	"	20/25	" "	30.— —
Wuchs dicht pyramidal							

AESCULUS (Fortsetzung):

			1 Stck DM	100 Stck DM
<i>hippocastanum umbraculifera</i> Rehd.	Hochst. 20/25 cm Umfg.		30.—	—
Mit dicht kugeliger Krone	200—220 cm Sth.			
<i>humilis X lutea</i> Spaeth	150—200 cm hoch		4.—	—
B. blaßgrün, Bl. rot mit Gelb				
<i>lutea</i> Wangh. (A. <i>flava</i> Ait., <i>octandra</i> Marsh.)	125—150 „ „		4.—	—
Bl. gelb, 10—15 cm lange Rispen	200—250 „ „		5.—	—
<i>macrostachya</i> , siehe Aesc. <i>parviflora</i>				
<i>neglecta</i> Ldl.	150—200 „ „		4.—	—
Bl. blaßgelb, rötlich gezeichnet				
<i>octandra</i> , siehe Aesc. <i>lutea</i>				
<i>parviflora</i> Walt. (Aesc. <i>macrostachya</i> Mchx.)	60—80 „ „		3.—	—
Strauchartig, mit langen weißen Bl.-Ständen				
<i>pavia arguta</i> Hort.	Hochst. 12/14 cm Umfg.		12.50	—
Bl. gelb und rötlich, langrispig	„ 14/16 „ „		15.50	—
— <i>atrisanguinea</i> Rehd. (Pavia <i>rubra</i> Poir.)				
Bl. dunkelrot	„ 20/25 „ „		40.—	—
<i>plantierensis</i> André (Aesc. <i>carnea</i> plant. Rehd.)				
B. groß, grob gesägt, Bl. weißlich	Hochst. 12/14 cm Umfg.		12.50	—
bis rot				
<i>rubicunda</i> , siehe Aesc. <i>carnea</i> und Formen				
<i>turbinata</i> Bl.	200—220 cm Sth. Hochst. 16/18 „ „		15.—	—
Bl. weißlichgelb,	200—220 „ „ „ 18/20 „ „		25.—	—
rötlich gefleckt	200—220 „ „ „ 20/25 „ „		30.—	—
<i>versicolor</i> Dipp. (Aesc. <i>withleyi</i> Hort.)	100—125 cm hoch		4.—	—
Bl. teils rötlich, teils gelblich				
ALANTUS — Götterbaum — Simarubaceae B †				
<i>glandulosa</i> Desf. (A. <i>altissima</i> Swingle)	Hochst. 8/10 cm Umfg.		4.—	—
B. groß, gefiedert, Bl. groß, gelb	„ 10/12 „ „		6.25	—
ALNUS — Erle, Eller — Betulaceae B				
<i>glutinosa</i> Gärtn. Schwarzerle	Hochst. 10/12 „ „		3.75	—
Heimisch, für nasse sumpfige Stellen	„ 12/14 „ „		5.—	—
<i>incana</i> Wild. Weißerle	„ 10/12 „ „		3.75	—
Heimisch, auch für trockene Stellen	„ 12/14 „ „		5.—	—
AMELANCHIER — Felsenbirne — Rosaceae † *				
<i>asiatica</i> Endl.	m. B. 50—70 cm hoch		2.—	180.—
Zweige lang hängend, Bl. große, lange, weiße Trauben				
<i>botryapium</i> de Cand.	80—120 „ „		1.—	80.—
Bl. in dichten kleinen weißen Trauben				
<i>cretica</i> de Cand.	60—80 „ „		1.—	—
B. groß, dklgrün, Bl. groß locker, weiß				
<i>laevis pumila</i> Hort Δ	60—80 „ „		1.—	—
Niedrig, buschig, Zweige rotbraun				
<i>utahensis</i> Koehne Δ	m. B. 60—80 „ „		3.—	—
B. klein niedrig bleibend				
<i>vulgaris</i> Moench (A. <i>ovalis</i> Med.)	60—80 „ „		1.—	—
B. unterseits silberweiß, Bl. weiße Trauben				
AMORPHA — Bastardindigo — Leguminosae B				
<i>fruticosa crispa</i> Hort	40—70 cm hoch		1.—	—
B. kraus, gefiedert, Bl. violett				

			1 Stck. DM	100 Stck. DM
AMORPHA (Fortsetzung):				
<i>fruticosa croceo-ianata</i> Mouillef.	70—100 cm hoch		1.—	—
B. gelbbraun zottig behaart, auch Jungtriebe				
AMYGDALUS — Mandel — Rosaceae B				
<i>persica „New purple leaved“</i> Hort. Büsche	150—175 „ „		3.—	—
B. beständig purpurfarbig				
ANDRACHNE — Burgel — Euphorbiaceae				
<i>coichica</i> Fisch. & Mey. Δ	m. B. 30—40 cm hoch		1.50	—
Niedrig, dicht, Bl. grünlich				
ANDROMEDA — Lavendelheide — Ericaceae				
<i>calyculata</i> , siehe Chamaedaphne calyculata und Formen				
<i>catesbaei</i> , siehe Leucothoe catesbaei				
<i>floribunda</i> , siehe Pieris floribunda				
<i>japonica</i> , siehe Pieris japonica und Formen				
<i>lucida</i> , siehe Xolisma lucida				
<i>polifolia</i> L. Δ I	m. Tb.		3.—	—
B. an Rosmarin erinnernd, Bl. blaßrosa				
— <i>angustifolia</i> Hort. Δ I	m. B. 20—30 cm hoch		3.—	—
Typische Wildform, schmalblättrig				
— <i>glauca</i> Hort. Δ I	m. B. 20—30 „ „		3.—	250.—
B. auffallend blau, größer als die Art				
	„ 30—40 „ „		4.—	350.—
<i>speciosa</i> , siehe Zenobia pulverulenta				
ARALIA — Aralie — Araliaceae				
<i>chinensis nuda</i> Nakai	100—150 cm hoch		5.—	—
B. unten blaugrün, Bl. weiß				
	300—350 „ „		8.—	—
<i>elata</i> Seem. (A. chin. mandschurica Rehd.)	100—125 „ „		5.—	—
B. gefiedert, bis 1m lang, Bl. weiße Dolden				
	300—350 „ „		8.—	—
ARCTOSTAPHYLOS — Bärentraube — Ericaceae				
<i>nevadensis</i> Gray Δ I	m. B.		4.—	—
B. klein länglich, Bl. weißlichrot				
<i>uva-ursi</i> Spreng Δ I	„		4.—	—
B. klein, oval, Bl. weißlichrot, wurzelnd				
ARONIA — Zwergvogelbeere — Rosaceae * †				
<i>arbutifolia</i> Elliott	40—60 cm hoch		— .75	60.—
B. glänzendgrün, Bl. weiß bis rosa				
<i>melanocarpa</i> Elliott. (A. nigra Dipp.)	40—60 „ „		— .75	60.—
B. oberseits glänzend sattgrün, Bl. reinweiß				
ARTEMISIA — Beifuß, Wermut — Compositae				
<i>procera</i> Willd. Δ	50—70 „ „		2.—	—
Halbstrauch, B. feinzerteilt, Bl. gelbgrün				
ARUNDINARIA, siehe unter „Stauden-Ziergräser“				
AZALEA — Azalee — Ericaceae				
<i>Hatsugiri</i> Hort., violettrot Δ I	m. B. 20—30 „ „		5.—	—
<i>Hinodegiri</i> Hort., hellkirschrot Δ I	„ 20—30 „ „		5.—	—
<i>Hinomanyo</i> Hort., fleischfarbig rosa Δ I	„ 20—30 „ „		5.—	—
<i>koreana</i> Hort., bläulichlila Δ I	„ 20—30 „ „		5.—	—
malvatica X kaempferi — Hybriden I				
Alice, rötlich-orange				
	„ 20—30 „ „		5.—	—
Fedora, dunkelrosa				
	„ 30—40 „ „		6.—	—
John Cearn, rot				
	„ 20—30 „ „		5.—	—
	„ 30—40 „ „		6.—	—

				1 St. DM	100 St. DM
AZALEA (Fortsetzung):					
<i>malvatica</i> x <i>kaempferi</i> -Hybriden:	m. B.		cm hoch		
Kathleen, dunkelrosa.	"	20—30	" "	5.—	—
Willy, reinrosa	"	30—40	" "	6.—	—
marlesi Hort	"	30—40	" "	6.—	—
Hellila vor dem Laub	"	20—30	" "	4.—	—
mollis Bl. gelbblühend	"	40—50	" "	6.—	—
" rotblühend	"	30—40	" "	3.25	—
obtusata japonica Ldl. gelbbbr. bis rot Δ I	"	30—40	" "	3.25	300.—
odorata Hort., weiß, duftend	"	20—30	" "	5.—	—
pontica L. gelb	"	50—70	" "	15.—	—
schlippenbachi Ktze, B. groß, Bl. blaßrosa	"	30—40	" "	3.25	300.—
viscosa glauca stricta Hort. weiß-rosa	"	20—30	" "	3.—	—
	"	30—40	" "	5.—	—

BENZOIN, siehe *Lindera*

BERBERIS — Berberitze, Sauerdorn — *Berberidaceae*

<i>actinacantha</i> Martiums Δ I	m. B.	60—80	cm hoch	4.—	—
B. dornig gezähnt, Bl. goldgelb, Fr. groß, dklrot					
bretschneideri Rehd. *	m. Tb.	20—30	" "	2.—	—
B. gelbgrün, Bl. gelb, Fr. blau bereift					
candidula CS. Δ I	m. B.	20—30	" "	3.—	250.—
B. glänzend grün, unterseits weiß, Bl. gelb					
calvairei Lev. I	m. B.	30—40	" "	4.—	—
B. groß, grün, Austrieb rötlich					
dictyophylla albicaulis Hort. *	m. Tb.	30—40	" "	3.—	—
Zweige weiß bepudert, sehr zierend	m. B.	60—80	" "	4.—	—
gagnepaini CS. I	"	20—30	" "	3.—	—
B. schmal tiefgrün, Bl. hellgelb,	"	60—80	" "	7.50	—
Fr. purpurn	"	100—125	" "	10.—	—
hookeri Lem. Δ I	m. Tb.	20—30	" "	3.—	—
B. lederig, unten weiß, Bl. groß					
schwefelgelb, Fr. schwärzlich					
— typica Hort. Δ I	m. B.	30—40	" "	3.75	—
B. dunkelgrün, Austrieb rot					
hybrido-gagnepaini Hort. Holl. Δ I	"	20—30	" "	3.—	—
(B. gagnepaini X verruculosa)	"	30—40	" "	4.—	300.—
Schön belaubt, glänzend dunkelgrün	"	40—60	" "	6.—	—
julianae CS. I	"	20—30	" "	3.—	250.—
Stark bestachelt, B. dunkelgrün,	"	30—40	" "	4.—	—
Bl. gelb, sehr reich, Fr. schwarz	"	40—60	" "	6.—	—
koreana Palib. *	"	60—80	" "	3.—	—
B. breit dunkelgrün,					
lologensis „Highdown Variety“ Sandw. I	m. Tb.	20—30	" "	6.—	—
Wertvoller Blüher, orangegelb					
mentorensis Anon. † I	m. B.	30—40	" "	3.—	—
Austrieb rot, B. dklgrün, Bl. blaßgelb					
Fr. groß, dklrot.					
notabilis CS. †	"	30—40	" "	2.—	—
Fr. auffallend groß, dunkelrot	"	60—80	" "	3.—	—
	"	80—100	" "	5.—	—
oblonga CS.	"	80—120	" "	4.—	—
B. graugrün, Bl. langtraubig gelb, Fr. schwarzrot					
polyantha Hemsl. †	m. B.	40—60	" "	3.—	—
B. hellgrün, Bl. tiefgelb, Fr. lachsrot					
serotina Lge. (B. chinensis Poir.)	"	60—80	" "	4.—	—
B. klein, Bl. gelb, Fr. verruculosa					

BERBERIS (Fortsetzung):

				1 St. DM	100 St. DM
stenophylla Lindl. I	m. B.	30—40	cm hoch	4.—	—
B. schmal, dunkelgrün, Bl. lebhaft	„	40—60	„ „	5.—	—
goldgelb, Fr. schwarz	„	80—100	„ „	8.—	—
— irwini Hort. Δ I	„	20—30	„ „	4.—	—
Niedriger, dichter als die Art, B. zackiger					
thunbergi DC. ✱ ✱ für Hecken Sträucher		30—40	„ „	— 60	50.—
Dicht, kleinlaubig, Bl. hellgelb,	„				
Fr. korallenrot					
— atripurpurea Hort. ✱ ✱ f. Hecken „		40—60	„ „	— 75	60.—
Rotblättrig, das ganze Jahr schön					
— maximowiczii Reg. ✱ ✱ Δ „		40—60	„ „	1.—	80.—
Dicht, straff, hellgrün, f. niedr. H.					
— minor Rehd. Δ ✱ ✱ H „		30—40	„ „	1.—	80.—
Schwachwachsend, in allen Teilen kleiner					
verruculosa Hemsl. & Wils. Δ I m. Tb.		15—20	„ „	2.50	—
B. lackgrün, Bl. goldgelb, Fr. bereift m. B.		80—100	„ „	10.—	—

BETULA — Birke — **Betulaceae**

alba L. Weißbirke	Hochst.	6/8	cm Umfg.	3.—	280.—
Rinde weißwend, B. klein	„	8/10	„ „	3.75	—
humilis Schrank. Δ	m. B.	60—80	cm hoch	3.—	—
In allen Teilen kleiner					
pendula , siehe unter „Trauerbäume“					

BRUCKENTHALIA — Ahrenheide — **Ericaceae**

spiculifolia Rchb. I Δ	m. B.			2.50	—
Heidekraut-ähnlich, Bl. rötlich					

BUDDLEIA — Schmetterlingsstrauch — **Loganiaceae**

alternifolia Maxim.		70—100	cm hoch	3.—	—
Bl. lavendelpurpurn entlang der Zweige					
dauidi „Ile de France“ Hort.		60—80	„ „	3.—	—
Bl. tiefpurpurn, langrispig					

BUXUS — Buchsbaum — **Buxaceae**

sempervirens L. (B. arborescens Mill.) H					
Für Hecken und Unterholz Büsche m. B.		70—80	„ „	5.40	400.—
Pyramiden „		30—40	„ „	2.50	200.—
„ „		125—150	„ „	15.—	—
— angustifolia West.		90—100	„ „	10.—	—
B. dunkelgrün, länglich-lanzettlich					

CALLICARPA — Schönfrucht — **Verbenaceae** ✱

americana L.	m. B.	100—120	cm hoch	3.—	—
Filzig, Bl. blaupurpurn, Fr. violett					
giraldiana Hesse		60—80	„ „	2.50	—
B. breit-elliptisch, Bl. rosalila, Fr. violett					
japonica Thbg.	m. B.	40—70	„ „	2.50	—
B. bis 12 cm lang, Bl. blaßlila Fr. violett „		70—100	„ „	3.—	—
koreana Hort. (C. dichotoma Raeusch)	„	40—60	„ „	2.—	—
Bl. rosa, Fr. lila-violett					

CALLUNA — Besenheide, Heidekraut — **Ericaceae**

vulgaris alba plena Hort., weißgefüllt m. B.				— 75	—
— scarlei Hort., weiß, spät	„			— 75	60.—
— alporti Kirchn., dunkelrot, spät	„			— 75	60.—
— aurea Forbes, B. goldgelb, Bl. lilar.	„			— 75	60.—
— County Wicklow Hort., niedrige	„			1.—	—
H. E. Beale					
— cuprea Bean, B. kupferrot	„			1.—	—

CALLUNA (Fortsetzung):

		1 St. DM	100 St. DM
vulgaris C. W. Nix Hort., dunkelr., früh m. B.		— .75	60.—
— foxi Bean, dunkelgrüne Kissen	8/12 cm Dm.	— .75	60.—
Bl. lilarosa	15/20 „ „	1.—	80.—
— Mrs. J. H. Hamilton Hort. rosa gef.	„	1.—	—
— plena H. E. Beale Hort.,	„	— .80	70.—
rosarot, gef. spät			
— prostrata flagelliformis Hesse	„	— .80	—
peitschenförmig, Bl. lilarosa			
— — kuphaldi Hesse, rosapur-	„	— .80	—
purne Kissen			
— tenuis Hort., dunkelpurpurn, früh	„	— .80	70.—

CALYCANTHUS, siehe Meratia

CARAGANA — Erbsenstrauch — Leguminosae

arborescens Lam. H	Sträucher	— .60	50.—
Baumartig, B. gefiedert, Bl. gelb			

CARPINUS — Weiß- oder Hainbuche — Betulaceae

betulus L. H	Buschig 80—100 cm hoch	1.25	100.—
Pyramidal, zu Hecken und Lauben-	„ 100—125 „ „	1.70	140.—
gängen	„ 125—150 „ „	2.—	160.—
— pyramidalis erecta nova Hort Hesse			
Straff aufrecht, frischgrün	Hochst. 20/25 cm Umfg.	30.—	—

CARYA — Hickorynuß — Juglandaceae

cordiformis K. Koch (C. amara Nutt.)	Hochst. 8/10 „ „	8.—	—
Bitternuß, B. bis 40 cm lang			

CASSIA — Sennastrauch — Papilionaceae

marylandica L.	80—100 cm hoch	2.—	—
Halbstrauch, B. schön gefiedert, Bl. gelb			

CASTANEA — Edel-Kastanie — Fagaceae

sativa Mill. (C. vesca Gaertn.)	Hochst. 12/14 cm Umfg.	12.—	—
Eßkastanie, schön belaubt	„ 16/18 „ „	18.—	—

CATALPA — Trompetenbaum — Bignoniaceae

hybrida purpurea Rehd.	125—150 cm hoch	4.—	—
Austrieb dunkelrot, Bl. weiß mit Gelb	200—250 „ „	5.—	—

CELTIS — Zürgel — Ulmaceae

occidentalis L.	60—80 „ „	2.—	—
Äste weißpunktiert, B. bis 15 cm lang	150—200 „ „	3.—	—
Fr. tiefpurpurn			

CERCIDIPHYLLUM — Judasbaumblatt — Trochodendraceae

japonicum Sieb. & Zucc. *	60—80 cm hoch	3.—	—
B. im Austrieb braunrot			

CHAENOMELES — Scheinquitte — Rosaceae B *

Sämtlich wurzelecht!			
japonica Lgl. (Cydonia maulei T. Moore) Δ H	40—50 „ „	— .60	50.—
Dornig, niedrig, Bl. ziegelrot, Fr. rund			
lagenaria Koidz. (Cydonia japonica Pers.)	50—70 „ „	— .75	60.—
Japanische Quitte, dornig, Bl. scharlach.			
— atricoccinea plena Hort., scharlach, gef.	60—80 „ „	2.—	—
— Aurora Hort., lachsrot, einfach.	60—80 „ „	2.—	—
— baltzi Hort., karmesinrot, einf. groß	50—70 „ „	2.—	—
— Columbia Hort., rosafleischf. einf.	60—80 „ „	2.—	—
— eximla Hort., hellrot, einfach	60—80 „ „	1.50	130.—
— gaujardi Hort., purpurrot, einfach	60—80 „ „	2.—	—
— moerlosi Hort., hell- u. dunkelrosa, einf.	60—80 „ „	2.—	180.—

CHAENOMELES (Fortsetzung):

			1 St. DM	100 St. DM
<i>lagenaria nivalis</i> Hort., reinweiß, einfach	60—80	cm hoch	2.—	—
— <i>nivea extus coccinea</i> Hort., weiß-rot, einf.	40—60	„ „	2.—	—
— <i>rubra grandiflora</i> Hort., karmesinrot, einf.	40—60	„ „	2.—	180.—
— <i>sanguinea plena</i> Hort., dunkelrot, gefüllt	60—80	„ „	2.—	—
— <i>versicolor lutescens</i> Hort., gelblichr., einf.	60—80	„ „	1.50	130.—
— <i>wilsoni</i> Rehd. apfelblütig, reichfruchtend	80—100	„ „	2.—	—

CHAMAEDAPHNE — Zwerglorbeer — *Ericaceae* Δ I

<i>calyculata</i> Moench. (<i>Lyonia cal.</i> Rchb.) m. B.	40—50	cm hoch	3.—	—
B. lederartig, Bl. weiß bis hellrot				
— <i>nana</i> Rehd.	30—40	„ „	4.—	—
Niederliegend, weiß, reichblühend	50—60	„ „	6.—	—

CHIMONANTHUS, siehe *Meratia***CLADRASTIS** — Gelbholz — *Leguminosae*

<i>amurensis buergeri</i> Max. (<i>Maackia am.</i> buerg. CS)				
Fiederblatt, Bl. weißlich aufrecht m. B.	150—200	cm hoch	3.—	—

CLETHRA — Scheineller — *Clethraceae*

<i>acuminata</i> Mchx.	m. B.	60—80	„ „	2.50	—
B. dunkelgrün, Bl. weiße Rispen					
<i>alnifolia</i> L. * D	„	60—80	„ „	2.50	—
B. frischgrün, Bl. weiße Rispen					
— <i>tomentosa</i> Mchx.	„	60—80	„ „	2.50	200.—
B. stark filzig, Bl. reinweiß, groß					

COLUTEA — Blasenstrauch — *Leguminosae* \clubsuit B

<i>gracilis</i> Freyn & Sint.	60—80	„ „	1.—	—
B. zierlich, Bl. reingelb				
<i>media</i> Willd.	60—80	„ „	1.—	—
B. unten blaugrün, Bl. rotbraun-orange				
<i>persica buhsei</i> Boiss.	60—80	„ „	1.50	—
Zweige überhängend, Bl. orangerothbraun				

CORNUS — Hartriegel — *Cornaceae* \clubsuit *

<i>alba</i> Wagh. (<i>C. stolonifera</i> Mchx.)	100—120	„ „	— .75	60.—
Holz rotbraun, Bl. weiß, Fr. blauweiß				
— <i>albo-marginata elegans</i> Hort.	60—100	„ „	1.25	100.—
B. schön weißbunt				
— <i>coloradensis</i> Koehne (<i>C. stolonif. color.</i> CS)	60—80	„ „	1.—	—
Wuchs überhängend, Zweige bräunlich				
— <i>flaviramca</i> Spæth. (<i>C. stolonif. flav.</i> Rehd.)	80—100	„ „	1.—	—
Holz gelb, breitwüchsig, wurzelnd				
— <i>gouchaulti</i> Rehd. (<i>C. tatarica gouch.</i> Hort.)	40—60	„ „	1.25	—
B. schön gelbbunt, kräftig wachsend				
— <i>kesselringi</i> Rehd. (<i>C. sibir. kesselr. E. Wolf</i>)	80—100	„ „	1.—	—
Zweige schwarzrot, Herbst- und Winterzierde				
— <i>spæthi</i> Wittm. (<i>C. tatar. spæthi</i> Hort.)	60—80	„ „	1.25	—
Austrieb bronze, B. goldgelb gerandet				
<i>controversa</i> Hemsl. (<i>C. macrophylla</i> Koehne)	200—250	„ „	3.—	—
B. unterseits bläulich, Bl. weiß, flach				
<i>femina</i> Mill. (<i>C. stricta</i> Lam.)	40—60	„ „	1.—	—
Zweige braunrot, Bl. weiß, Fr. hellblau				
<i>kousa</i> Buerg. (<i>Benthamia jap. S. & Z.</i>) m. B.	60—80	„ „	4.—	—
B. unterseits weißgrau, Bl. groß, rahmweiß *				
<i>macrophylla</i> , siehe <i>C. controversa</i>				

CORNUS (Fortsetzung):

			1 St. DM	100 St. DM
mas L. Kornelkirsche H	50—70	cm hoch	1.—	85.—
Bl. gelb vor dem Laub, Fr. rot, eßbar				
officinalis Sieb & Zucc.	60—80	„ „	3.—	—
Bl. gelb, vor dem Laub, Herbstfärbung rot				
paniculata L-Herlt. (C. racemosa Lam.)	100—150	„ „	—75	60.—
Buschig, B. unterseits weiß				
sanguinea L. Hartriegel	150—200	„ „	—75	60.—
Zweige braunrot, Bl. gelbweiß, Fr. schwarzrot,				
stolonifera, siehe C. alba und Formen				
stricta, siehe C. femina				
tatarica sibirica Hort. (C. alba sib. Loud.)	60—80	„ „	1.—	—
Holz mennigrot im Winter, Bl. weißlich				
— albo-variegata Hort.	60—80	„ „	1.25	—
Schön konstant weißbunt				

CORONILLA — Kronwicke — Leguminosae

emerus L. Δ	40—60	„ „	1.50	—
B. gefiedert, Bl. gelb				

CORYLOPSIS — Scheinhasel — Hamamelidaceae

pauciflora Sieb & Zucc. Δ *	m.B. 20—30	„ „	4.—	—
Dicht, Austrieb kupfrig, Bl. primelgelb	30—40	„ „	5.—	—
„ „	50—60	„ „	8.—	—

CORYLUS — Hasel — Betulaceae

avellana atripurpurea Kirchn. Bluthasel	70—100	„ „	2.—	160.—
B. tief schwarzrot, schwachwachsend				

Großfrüchtige Haselnüsse, siehe unter „Obstsortiment“

COTINUS — Perückenstrauch — Anacardiaceae

coggygia Scop. (Rhus cotinus L.) *	50—70	„ „	2.—	160.—
B. grün, rund, Bl. federig, purpurviolett				

COTONEASTER — Zwergmispel — Rosaceae *

acutifolia Ldl. (C. lucida Schlecht.)	30—50	„ „	—75	60.—
B. glänzendgrün, Bl. rötlichweiß, Fr. dunkel				
— sinensis Hort.	30—40	„ „	—75	—

Wuchs breiter als die Art

apiculata Rehd. & Wils. Δ	30—50	„ „	—75	60.—
B. sattgrün, Fr. glänzend scharlach				

applanata, siehe C. dielsiana und Formen

bullata Bois. *	40—60	„ „	—75	60.—
-----------------	-------	-----	-----	------

B. ziemlich groß, Bl. weiß, Fr. lebhaft rot

congesta, siehe C. microphylla glacialis

dammeri CS (C. humifusa Duth.) I m.B.	20—30	cm breit	2.—	—
Niederliegend, dicht, Bl. weiß				

— radicans Hort Δ I	20—30	„ „	3.—	250.—
Niederliegend, wurzelnde Form				

davildiana, siehe C. horizontalis und Formen

dielsiana Pritzl. (C. applanata Veitch.)	50—70	„ hoch	—75	60.—
Wüchsig, B. dklgrün, Bl. weiß, Fr. glänzendrot				

— elegans Rehd. & Wils. m.B.	60—80	„ „	1.25	—
Zweige überhängend, sonst wie die Art	100—120	„ „	1.50	—

divaricata Rehd. & Wils.	40—60	„ „	—75	60.—
B. tiefgrün, Bl. rosa, Fr. rot				

fontanesii, siehe C. racemiflora

foveolata Rehd. & Wils. *	m.B. 80—100	„ „	1.50	—
B. dklgrün, Bl. rötlichweiß, Fr. schwarz				

frigida vicaryi Hort.	60—80	„ „	2.	160.—
B. groß, dünn, frischgrün, Fr. rot	150—200	„ „	2.50	—

hessei, siehe C. praecox hessei

COTONEASTER (Fortsetzung):

				1 St. DM	100 St. DM
<i>horizontalis</i> Decne. (C. davidiana Hort.) m. B.	30—40	cm breit		1.50	125.—
Halbimmergrün, Bl. rosa, Fr. rot Δ „	50—70	„ „		2.—	160.—
— <i>saxatilis</i> Hort. Hesse NEUHEIT! Δ „	20—30	„ „		5.—	—

Diese neue Form des *C. horizontalis* hat die begrüßenswerte Eigenschaft bei ziemlich langsamem Wuchs sich jedem Felsen oder jeder Treppenstufe und Erdbewegung anzuschmiegen, weshalb sie den Namen „*saxatilis*“ erhielt. Die Zweige sind fein fischgrätenartig verzweigt, die Blättchen sind bedeutend kleiner als die der Art und kleine aufrechte Kurztriebe geben den Zweigpartien eine besondere Note. Im ganzen eine neuartige, zierliche Felsenform des altbekannten *Cotoneaster horizontalis*.

— <i>variegata</i> Osborn Δ *	m. B.	20—30	cm breit	3.—	—
Schwachwüchsig, B. schön weißbunt					
<i>humifusa</i> , siehe C. dammeri und Formen					
<i>hupensis</i> Rehd. & Wils. „		60—80	cm hoch	1.—	—
B. lebh. grün, Bl. weiß, Fr. dunkelrot „		100—120	„ „	1.50	—
<i>hybrida</i> Gloire de Versailles Hort. I „		50—70	„ „	4.—	—
B. unterseits stark filzig, Fr. hellrot					
<i>integerrima</i> Med. (C. vulgaris Ldl.)		30—40	„ „	—75	—
Austrieb silbrig, Bl. rötlich, Fr. scharlach					
<i>lactea</i> W. W. Smith I	m. B.	30—40	„ „	3.—	—
Überhängend, Bl. weiß, Fr. karmesinrot „		60—80	„ „	5.—	—
<i>laxiflora</i> Jacq. fil.		30—40	„ „	—75	—
B. dunkelgrün, Fr. schwarz					
<i>lucida</i> , siehe C. acutifolia					
<i>microphylla</i> Wall. Δ I	m. B.	20—30	„ „	2.—	160.—
B. klein, schwarzgrün, Bl. weiß, Fr. karmin					
— <i>cochleata</i> Rehd & Wils. Δ I	m. B.	20—30	„ breit	2.—	160.—
B. stumpfgrün					
— <i>glacialis</i> Hook. (C. congesta Bak.) Δ I „		20—30	„ „	2.—	—
B. klein, stumpfgrün, niederliegend „		30—40	„ „	3.—	—
— <i>thymifolia</i> Koehne Δ I „		20—30	„ „	3.—	—
B. lineal, glänzend dklgrün, zierlich					
<i>moupinensis</i> Franch.		40—60	„ hoch	—75	—
B. grob, dklgrün, Bl. rötlich, Fr. schwarz					
<i>multiflora</i> Bge. (C. reflexa Carr.)		60—80	„ „	1.25	100.—
Überhängend, Bl. milchweiß, Fr. rot					
— <i>calocarpa</i> Rehd. & Wils.	m. B.	60—80	„ „	1.25	—
B. größer als die Art, Fr. karmin „		80—100	„ „	2.—	—
<i>nanchuanica</i> , siehe C. praecox					
<i>praecox</i> Hort. Vilm (C. nanchuan. Rgl.) Δ „		30—40	„ breit	1.50	125.—
Wuchs bogig, B. gewellt, Bl. früh, rosen-		40—50	„ „	2.—	160.—
rot, Fr. groß, mennigrot					
— <i>hessel</i> Hort. Hesse Δ „		30—40	„ „	2.—	160.—
Dichter u. kleiner als die Art					
<i>prostrata</i> Bak. Δ „		30—40	„ „	2.—	—
B. klein, Bl. rosa, Fr. rot					
<i>racemiflora</i> K. Koch (C. fontanesi Spach)		80—100	„ hoch	—75	60.—
B. stumpfgrün, Bl. weiß, Fr. rot					
— <i>soongarica</i> CS		70—100	„ „	—75	60.—
B. größer als die der Art, grünl. behaart					
<i>reflexa</i> , siehe C. multiflora					
<i>rhytidophylla</i> Rehd. & Wils. I	m. B.	30—40	„ „	3.—	—
B. länglich, unters. gelbfilzig, Bl. „		60—80	„ „	4.—	—
weißlich, Fr. orangert „		80—100	„ „	5.—	—
<i>rubens</i> W. W. Smith I Δ „		20—30	„ „	2.—	—
B. stumpf schwarzgrün, Bl. weiß, Fr. rot „		40—60	„ „	3.—	—

COTONEASTER (Fortsetzung):

				1 St. DM	100 St. DM.
<i>rupcstris</i> Hort. Gibbs. Δ	m. B.	30—40	cm hoch	2.—	—
B. im Winter bronze, Fr. leuchtendrot					
<i>salicifolia</i> Franch. I	"	30—40	" "	2.50	—
Überhängend, B. lanzettl., Fr. rot	"	60—80	" "	4.50	—
— <i>floccosa</i> Rehd. & Wils. I	"	30—40	" "	2.50	—
B. unten weißfilzig, Fr. lebh. rot					
— <i>rugosa</i> Rehd & Wils. I	"	40—60	" "	3.—	—
B. breit, dklgrün, Fr. korallenrot	"	60—80	" "	4.50	—
	"	80—100	" "	6.—	—
	"	100—125	" "	7.50	—
<i>simonsi</i> Bak. I	"	30—40	" "	1.—	—
B. lederig, glänzend, Höhe b. z. Krone	"	140—160	" "	3.—	—
B. weiß, Fr. korallenrot					
<i>vulgaris</i> , siehe <i>C. integerrima</i>					

CRATAEGUS — Dorn — Rosaceae

<i>carrierei</i> Vauv. ✚ Für enge Straßen!		100—120	cm hoch	2.50	—
Stark bedornt,		180—200	cm Sth. Hochst.	8/10	cm Umfg.
B. glänzend dklgrün, Bl. weiß, Fr. orange				5.—	—
<i>coccinea</i> L. Scharlachdorn ✚ H	Büsche	80—100	cm hoch	1.—	—
Stark bedornt, Bl. weiß, Fr. rot					
<i>crusgalli inermis</i> Hort	"	100—125	" "	2.50	—
Dornenlose Form des Hahndorns					
— <i>ovalifolia</i> Loud.	"	100—125	" "	2.50	—
B. breiter, Fr. schön rot					
— <i>salicifolia</i> Ait.	"	100—125	" "	2.50	—
B. dünner, lanzettlich					
<i>fastigiata</i> , siehe <i>C. oxyacantha stricta</i>					
<i>fissa fructu luteo</i> Hort ✚	"	100—125	" "	2.50	—
Fr. gelb		180—200	cm Sth. Hochst.	8/10	cm Umfg.
<i>grignonensis</i> Mouillf.	Büsche	100—125	cm hoch	2.50	—
B. derblederig, Bl. weiß, Fr. scharlach					
<i>oxyacantha</i> L. Weißdorn H		30—40	" "	— .60	50.—
Bekannte Heckenpflanze, Bl. weiß einf.					
— <i>alba plena</i> Hort.	Büsche	80—120	" "	2.—	—
Weiß gefüllt	"	150—175	" "	3.—	—
		180—200	cm Sth. Hochst.	8/10	cm Umfg.
— <i>punicea</i> Hort. (flore coccineo)	Büsche	80—100	cm hoch	2.50	—
Einf. leuchtd. dunkelrot, Mitte weiß					
— <i>plena</i> Hort. Rotdorn	"	150—175	" "	3.—	—
Dick gef. rot		180—200	cm Sth. Hochst.	6/8	cm Umfg.
		180—200	" "	8/10	" "
— <i>rosea</i> Hesse	Büsche	100—125	cm hoch	2.50	—
Einf. leucht. rosa, Mitte weiß					
— <i>stricta</i> Hort. (<i>C. fastigiata</i> Hort.)	Pyram.	120—150	" "	3.—	—
Wuchs streng pyramidal, Bl. einf. weiß					
<i>prunifolia</i> Pers.	Büsche	80—100	" "	1.—	—
B. glänzd. grün, Bl. weiß, Fr. rot					
<i>sorbifolia</i> Lge.	"	100—125	" "	1.—	—
B. groß, Bl. rispig, Fr. scharlachrot					

CYDONIA, siehe Chaenomeles und Formen

CYTISUS — Geißklee — Leguminosae

<i>austriacus</i> L. Δ	m. B.	30—40	" "	— .75	—
B. seidig, Bl. gelb in Köpfen					

CYTISUS (Fortsetzung):

			1 St. DM	100 St. DM
hybridus Donard Seedling Hort.	m. B.		2.—	—
Bl. weiß, kirschrot, rot und gelb gem.				
— Dorothy Walpole Hort.	"		1.75	150.—
Bl. hellrot mit Dunkelrot, aufrecht				
multiflorus Sweet.	m. Tb.		1.75	150.—
Ähnlich C. praecox, straffer, Bl. weiß				
praecox Bean Δ	m. B		1.50	120.—
Leicht überhängend, Bl. schwefelgelb				
— albus Smith Δ	"		1.50	120.—
Bl. reinweiß, Wuchs sehr niedrig				
purpureus Scop. Δ	"	30—40 cm hoch	2.—	—
Niedrig, Bl. purpurn				
raissbonensis Schaeff. Zwillingsginster	"	60—80 " "	2.—	—
Aufrecht, Bl. dklgelb mit Orange				
scoparius andreanus compactus Hort. Δ	"		1.75	150.—
Wuchs dicht, Bl. goldgelb mit dklpurpur				
— pendulus Hort. Δ	"		1.75	—
Überhängend, Bl. goldgelb m. dklpurpur				
— fulgens Hort.	"		1.75	—
Ähnlich C. praecox, Bl. rötlichgelb				
— Lord Lambourne Hort	"		1.75	150.—
Überhängend, Bl. scharlach, gelb und rosa				
— strictus Hort.	"		1.75	150.—
Straff aufrecht, Bl. leuchtd. gelb				

DABEOCIA — Glanzheide — Ericaceae

polifolia alba Don. (D. cantabr. alba Dipp.)	"		1.—	—
Maiblumen-Erika, reinweiße Glocken				

DAPHNE — Seidelbast — Thymeleaceae

arbuscula Celak Δ I.	m. Tb.		5.—	—
B. schmal, gerollt, Bl. rosa				
neorum L. Rosmarin-Seidelbast Δ I	"		5.—	—
B. schmal, Bl. hellkarmin, D				
— major Hort. Δ I	"		5.—	—
B. lederig, Bl. karminrot, D				

DAVIDIA — Taubenstrauch — Nyssaceae

involucrata Baill.	m. B.	200—250 cm hoch	5.—	—
B. groß, Bl. mit breiten weißen Hüllen				

DECUMARIA — Sternhortensie — Saxifragaceae

barbara L. Δ	m. B.		2.—	—
Leicht kletternd, Bl. weiß, D				

DESMODIUM — Fesselhülse — Leguminosae

penduliflorum Oudem. (Lespedeza sieboldi Miq.)				
Überhängend, purpurn, lockertraubig	m. B.	60—80 cm hoch	2.—	—

DEUTZIA — Deutzie — Saxifragaceae

coreana Lévl.			1.—	—
B. länglich, Bl. einzeln am vorjähr. Holz				
crenata eburnea Lem.		80—100 " "	— .75	—
Reichbl. einf. elfenbeinf. gelb. Staubf.				
— elegantissima Hort.		70—100 " "	— .75	—
Dicht, hoch, Bl. einf. rosaweiß u. karmin				
— macrothyrsa Hort. Lem.		80—100 " "	— .75	—
Bl. groß, weiße Trauben, reich u. früh				

DEUTZIA (Fortsetzung):

		1 St. DM	100 St. DM
<i>crenata</i> Pride of Rochester Hort. *	80—100 cm hoch	—75	—
Bl. weißgefüllt, Herbstfärbung braun			
— <i>rosea plena</i> Hort.	80—100 „ „	—75	—
Bl. rosa gefüllt			
— <i>suspensa</i> Hort. Lem.	80—100 „ „	—75	—
Bl. einf. weiß, groß, glockenartig			
<i>discolor floribunda</i> Lem.	30—40 „ „	1.—	—
Bl. reinweiß in dichten Rispen			
— <i>grandiflora</i> Lem.	30—40 „ „	1.—	—
Bl. weit geöffnet, einfach weiß			
<i>glomeruliflora</i> Franch.	40—60 „ „	1.—	—
B. rauh, Bl. weiß, klein aber zahlreich			
<i>gracilis</i> Sieb. & Zucc Maiblumenstr. Δ	20—30 „ „	1.—	—
Bl. weiß, dichtbuschig			
— <i>campanulata</i> Lem. * Δ	30—40 „ „	1.—	—
Bl. groß, milchweiß, glockig			
— <i>multiflora</i> Lem. Δ	30—40 „ „	1.—	—
Aufrecht, Bl. weiß, zahlreich			
<i>hybrida watereri</i> Veitch	80—100 „ „	—75	—
Bl. reinweiß, einfach, sehr groß			
— <i>welsi</i> Veitch	80—100 „ „	—75	—
Bl. reinweiß, gefüllt, reichblühend			
<i>schneideriana</i> Rehd.	40—60 „ „	1.50	—
B. scharf gesägt, Bl. weiß, leicht gewellt			
<i>vilmorinae</i> Lem.	40—60 „ „	1.50	—
B. unterseits grauweiß, Bl. groß, weiß			
<i>wilsoni</i> Duthie	60—80 „ „	1.50	—
B. stark behaart, Bl. groß, reinweiß			

DIERVILLEA — Weigelie — Caprifoliaceae

<i>amabilis</i> Carr. Bl. hellrosa	60—80 cm hoch	1.—	—
— <i>alba</i> Hort. Bl. weiß	60—80 „ „	1.—	—
<i>biformis</i> Hort. Bl. groß, hell- u. dklrosa	70—100 „ „	1.—	—
<i>Chamaelëon</i> Hort. Bl. karmin u. hellrosa	70—100 „ „	1.—	—
<i>Edouard André</i> Lem. Bl. dunkelrot	70—100 „ „	1.—	—
<i>Féerie</i> Lem. Bl. reinrosa, groß	60—80 „ „	1.—	—
<i>florida purpurea</i> Hort. Gibbs. Δ *		1.—	—
Buschig, rotlaubig, Bl. dklrosa			
<i>grandiflora vanhouttei</i> Lem.	80—100 „ „	1.—	80.—
Bl. leuchtend rosa, außen weiß			
<i>hybrida Eva Rathke</i> Rathke	50—70 „ „	1.25	—
Bl. groß, leuchtd. karminpurpur			
<i>intermedia desboisi</i> Hort.	70—100 „ „	1.—	—
Bl. groß, rosa m. weißem Saum, früh			
— <i>stelzneri</i> Hort. Bl. karmin u. rosa	70—100 „ „	1.—	—
<i>lowei</i> Rehd. Bl. dunkelpurpurrot	60—80 „ „	1.25	—
<i>Mad. Lemoine</i> Billard	70—100 „ „	1.—	—
Bl. frischrosa m. scharlach u. weiß			
<i>New Port Red</i> Hort.	70—100 „ „	1.25	—
Bl. dunkelrot, wüchsig			
<i>praecox Gracieux</i>	60—80 „ „	1.25	—
Groß, lachsfarbig m. Gelb			
<i>revularis</i> Gatt.	60—80 „ „	1.—	—
Bl. grünlichgelb in Rispen			
<i>rosea</i> Walp. Hellrot, reichblühend	60—80 „ „	1.—	—
<i>scsillifolia</i> Buckl.	40—60 „ „	1.—	—
Bl. schwefelgelb in Rispen			

DIERVILLEA (Fortsetzung):

			1 St. DM	100 St. DM
splendens Kirchn. *	40—60	cm hoch	1.—	—
Austrieb glänzend gelb, Bl. ähnlich D. sessilifolia				
styriaca Klenert	70—100	" "	1.25	—
Wüchsig, Bl. leuchtend amarantröt				
verschaffelti Hort.	60—80	" "	1.—	—
Bl. purpurrosa mit weißem Saum				

DRYAS — Silberwurz. Bergnympe — Rosaceae

octopetala L. Δ I	m. Tb.		1.—	80.—
Polster glänzendgrün, Bl. weiß, Fr. federig				
— vestita Hort. Δ I	m. Tb.		1.50	—
Schmallaubig, weißfilzig				
suendermanni Kellerer Δ I	"		1.—	80.—
Üppig, Bl. weiß, Knospe gelblich				

ECHINOPANAX — Igelkraftwurz — Araliaceae

horridus Dcne & Planch. (Panax horr. Sm.) m. Tb.			5.—	—
Ganze Pflanze dicht stachelig, B. groß, Bl. weiß				

ELAEAGNUS — Ölweide — Elaeagnaceae

edulis Hort. (E. multiflora Thbg. E. longipes Gray)				
B. unten silbrig, Bl. blaßgelb, Fr. essbar	40—60	cm hoch	1.—	—
pungens ebbingei Hort. Holl. I	m. B. 60—80	" "	2.50	—
Besonders harte Form, wüchsig				

EMPETRUM — Rauschbeere — Empetraceae I

atropurpureum Fern. & Wieg. m. B.			2.—	—
Weißfilzig, Fr. schwarzrot				
nigrum L.			1.50	120.—
Niederliegend, B. lineal, Bl. purpurrosa				

ENKIANTHUS — Prachtglocke — Ericaceae

campanulatus albiflorus Mak. m. B.	60—80	cm hoch	2.—	160.—
B. quirlig, Bl. weiße Glocken				
cernuus rubens Mak. "	60—80	" "	2.—	160.—
Bl. tiefrot				
deflexus CS "	100—125	" "	7.50	—
Zweige rot, Bl. breitglockig, gelbrot				

ERICA — Heide — Ericaceae Δ I B

carnea L. (E. herbacea Auct.) m. B.	15—20	cm Dm	—75	50.—
Fleischrote Schneeheide				
"	20—25	" "	1.—	75.—
— alba Zbl., weiß	"	" "	—75	60.—
— Cecilia M. Beale Hort., weiß niedrig	"	" "	1.—	80.—
— James Backhouse Hort., lichtrosa, früh	"	" "	—75	60.—
— praecox rubra Hort., rot, früh	"	" "	—75	60.—
— Snow Queen Hort., weiß, buschig	"	" "	—75	60.—
— Springwood Hort., weiß, langrispig	"	" "	—75	60.—
— vivelli Hort. "	15—20	cm DM	—75	60.—
B. braun, Bl. leuchtend karmin				
"	20—25	" "	1.—	80.—
— Winter Beauty Hort. "	15—20	" "	—75	60.—
Bl. dunkelrosa, ab Weihnachten				
"	20—25	" "	1.—	80.—
cinerea coccinea Bean, Bl. blutrot	"	" "	1.—	—
herbacea, siehe E. carnea und Formen				
mediterranea erecta Hort. "	"	" "	1.—	80.—
Straff aufrecht, dunkelrosa				
— hybrida Silberschmelze Hort. "	"	" "	1.—	80.—
Weiß, breitbuschig				
tetralix alba Ait. Glockenheide "	"	" "	—75	60.—
Bl. weiße Glocken				
— rubra Bedf. Bl. rote Glocken "	"	" "	—75	60.—

ERICA (Fortsetzung):

		1 St. DM	100 St. DM
vagans L. hellrosa	m.B.	— .80	—
— alba Sweet, weiß	"	— .80	—
— purpurea Hort., purpurrot	"	— .80	—

ESCALLONIA — Escallonie — Saxifragaceae

langleyensis Veitch I	m.Tb.	15—20 cm hoch	2.—	—
Dunkelgrün, überhängend, Bl. karminrosa				

EUCOMMIA — Guttaperchastrauch — Eucommiaceae

ulmoides Oliv.	m.Tb.	40—50 cm hoch	5.—	—
B. 7—8 cm lang, Gummi liefernd				

EUPTELEA — Scheinrüster — Trochodendraceae

polyandra S. & Z. *	m.B.	60—80 cm hoch	3.—	—
Austrieb rotbraun, Bl. vor dem Laub, rotfädig				

EVODIA — Rutaceae

ramiflora, siehe Orixia japonica				
rutaearpa Benth (Boymia) B		60—80 cm hoch	3.—	—

Seltene, interessante Neueinführung!

EVONYMUS — Spindelbaum — Celastraceae

alata Reg. Korkästiger Spindelbaum	m.B.	50—70 cm hoch	1.50	120.—
Winterzierde, feuriges Herbstlaub	"	70—90 " "	2.—	160.—
— triflora Hort.	"	60—80 " "	2.—	—
Ohne Korkleisten, B. scharf gesägt				
bungeana Maxim.	"	60—80 " "	2.—	—
Baumartig, im Herbst prachtvoll	"	80—100 " "	3.—	—
	"	125—150 " "	4.—	—
europaea L. Pfaffenhütchen	"	80—100 " "	— .60	50.—

Heimisch, schönfruchtend

— aldenhamensis Hort. Gibbs. " 30—40 " " 1.50 —

Auffallend reich fruchtend

— argenteo-variegata Hort. " 200—250 " " 4.— —

B. dunkelgrün mit weißen Flecken

latifolia Scop. " 30—50 " " 2.— —

B. dunkelgrün, Fr. karminrot

maacki Rupr. " 60—80 " " 2.— —

Hoher Strauch ähnlich E. bungeana

nana koopmanni Beissn. I " 40—60 " " 1.— —

Straff, B. schmal, Fr. mennigrot

oxyphylla Miq. " 60—80 " " 2.— —

B. breit, hellgrün, Fr. dunkelrot

pauciflora Maxim. " 40—60 " " 1.50 —

B. dunkelgrün, Bl. braunrot

phellomana Loes. " 30—40 " " 1.50 —

Stark korkig, Fr. korallenrot

radicans Sieb. Δ I " — .75 —

Für Schatten und Unterholz

— acuta Rehd. Δ I " 40—60 " " 1.50 —

Gute Bodendecke im Schatten

— colorata Rehd. Δ I " 30—40 " breit 1.50 120.—

Unterholz für Schattenlage

— minima Sim.-Louis (E. rad. kewensis Hort.) m.B. 60—80 Halbst. 3.— —

B. sehr klein, zierlich, kriechend

— variegata Hort. Δ I m.B. 15—25 cm hoch — .75 60.—

B. weißbunt, kriechend

— vegeta Rehd. Δ I " 40—60 " " 2.— 160.—

B. hellgrün, rund, klettert

" 60—80 Halbst. 3.— —

EVONYMUS (Fortsetzung):

				1 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>sanguinea</i> ✱	m. B.	40—60	cm hoch	1.50	—
Austrieb rötlich, Fr. rot		100—125	" "	2.50	—
<i>verruccosa</i> Scop.	"	70—10	" "	1.50	120.—
Für Schatten, B. gelbgrün, Fr. gelbrot					
<i>ycdoensis</i> Koehne	"	40—60	" "	1.50	—
B. groß, breit, Bl. gelbrot, Fr. karmin	"	70—100	" "	2.—	—

EXOCHORDA — Perlbusch — Rosaceae

<i>giraldi willsoni</i> Rehd.	"	80—100	" "	4.—	—
Bl. reinweiß, üppig					

FAGUS — Buche — Fagaceae

<i>englantica</i> Seemen	"	150—175	" "	6.—	—
B. eiförmig, unterseits blaugrün					
<i>ferruginea</i> Ait. (F. <i>grandifolia</i> Ehrh.)	"	100—150	" "	5.—	—
Amerikanische Buche					
<i>orientalis</i> Lipsky Orientalische B. ✱	"	200—250	" "	7.50	—
B. größer und fester als Rotbuche					
<i>sylvatica</i> L. Rotbuche	Hochst.	10/12 cm	Umfg.	9.50	750.—
Heimischer bekannter Waldbaum					
— <i>dawycki</i> Hesse Pyramidenbuche	m. B.	150—200	cm hoch	12.—	—
Straff säulenförmiger Wuchs	"	200—250	" "	15.—	—
— <i>heterophylla</i> Loud. (F. s. <i>laciniata</i>)	"	100—125	" "	6.—	—
B. tief geschlitzt, oft ganz schmal					
— <i>horizontalis</i> , siehe unter „Trauerbäume“					
— <i>pendula</i> , siehe unter „Trauerbäume“					
— <i>purpurea macrophylla</i> Hort.	Hochst. m. B.	12/14 cm	Umfg.	20.—	—
Großblättrige Blutbuche, B.	"	16/18	" "	30.—	—
tief schwarzrot (Swat Margret)	"	18/20	" "	40.—	—
— <i>pendula nova</i> , siehe unter „Trauerbäume“					
— <i>roseo-marginata</i> Henry	Hochst. m. B.	12/14	" "	15.—	—
B. rot mit rosa Rand	"	14/16	" "	18.—	—
— <i>quercifolia</i> Schelle	"	80—120	cm hoch	6.—	—
B. eichenähnlich gerandet					

FONTANESIA — Fontanesie — Oleaceae

<i>fortunei</i> Carr.		60—80	" "	—75	60.—
B. glänz. dklgrün, Bl. weiß, lockertraubig					
<i>phillyreoides</i> Labill. (F. <i>angustifolia</i> Dipp.)		60—80	" "	—75	60.—
B. graugrün, Bl. weiß, büschelig					

FORESTIERA — Forestiere — Oleaceae

<i>neo-mexicana</i> Gray	m. B.	30—40	" "	1.50	—
Sparrig, B. stumpf graugrün, Fr. blauschwarz					

FORSYTHIA — Forsythie — Oleaceae

<i>europaea</i> Deg. & Bald., schwefelgelb		80—100	" "	1.—	—
<i>intermedia</i> Zbl., aufrecht, lichtgelb		80—100	" "	1.—	—
— <i>densiflora</i> Koehne, hellgelb, dichte Bl.		80—100	" "	1.—	—
— <i>primulina</i> Rehd., dicht, primelgelb		80—100	" "	1.—	80.—
— <i>spectabilis</i> Spaeth, reich dklgoldgelb		80—100	" "	1.—	80.—
— <i>vitellina</i> Koehne, dottergelb		80—100	" "	1.—	80.—
<i>suspensa</i> Vahl., überhängend, hellgelb, glockig		80—100	" "	1.—	—
— <i>fortunei aurea</i> Hort., auch Laub gelb		80—100	" "	1.—	—
— <i>sieboldi</i> Zbl., hell-m. dklgelb ✱		80—100	" "	1.—	—
<i>viridissima</i> Ldl., satt dunkelgelb ✱		80—100	" "	1.—	—

FOTHERGILLA — Hamamelidaceae ✱

<i>major</i> Lodd. D	m. B.	40—60	" "	3.—	—
B. breitoval, unten blaugrau, Bl. weiß	"	80—100	" "	5.—	—

FOTHERGILLA (Fortsetzung):

		1 Stck. DM	100 Stck. DM
monticola Ashe	m. B. 80—100 cm hoch	5.—	—
Breitwüchsig, unten grün, Bl. weiß			

FRAXINUS — Esche — *Oleaceae*

americana (acuminata) L.	150—175 „ „	2.—	—
B. oben blaugrün, unten weißlich			
excelsior L. Gemeine Esche	Hochst. 6/8 cm Umfg.	3.50	280.—
Starkwachsend, bekannter Alleebaum	„ 8/10 „ „	3.75	300.—
— aurea Willd. Goldesche	150—175 cm hoch	2.—	—
B. goldgelb, Knospen schwarz *			
— globosa Hort.	200—220 cm Sth. Hochst. 10/12 cm Umfg.	7.50	—
Kugelesche	200—220 „ „ „ 16/18 „ „	15.—	—
— hessei Hesse Einblattesche	„ 10/12 „ „	7.50	—
Wuchs straff, schön dunkelgrün			
paxiana Lingelsh.	„ 6/8 „ „	5.—	—
Sehr reichblühend, langsam wachsend			
viridis Mchx. (F. pennsylvanica Marsh.)	„ 8/10 „ „	4.—	—
Breitkronige echte Grünesche *			

GAULTHERIA — Scheinbeere — *Ericaceae*

procumbens L. Δ I \div	m. B.	1.—	80.—
B. rötlichgrün, Bl. hellrot, Fr. rot			
pyroloides cuneata Rehd. & Wils. Δ I \div	„	1.50	—
B. oboval, Fr. weiß			

GENISTA — Ginster — *Leguminosae* (siehe auch *Cytisus*)

horrida DC. Δ	m. Tb.	3.—	—
Stark dornig, Bl. gelb			
pilosa L. Δ	m. B.	2.—	160.—
Niederliegend, wurzelnd, Bl. gelb			
radiata Scop. Strahlenginster Δ	m. Tb.	2.—	—
Graugrün verzweigt, Bl. gelb in Köpfchen			
tinctoria anxantica Fiori	m. B.	1.75	150.—
Ziemlich hoch, Bl. kräftig gelb, reichblühend			
— plena Rehd. Δ	m. Tb.	2.—	160.—
Niedrig, Bl. leuchtend goldgelb, gef.			
— thyrsiflora Hort.	m. B. 50—70 cm hoch	1.75	—
Schöne, gelbe Blütenähren			

GLEDITSCHIA — Gleditschie — *Leguminosae*

texana Sarg.	m. B. 60—80 cm hoch	3.—	—
B. sehr fein, glänzendgrün			
triacanthos L. Christusdorn	Hochst. 8/10 cm Umfg.	6.25	—
Holz stark bedornt, B. großfiedr., grün	„ 10/12 „ „	7.50	600.—

HAMAMELIS — Zaubernuß — *Hamamelidaceae*

japonica S. & Z.	m. B. 40—60 cm hoch	4.—	—
B. Haselnuß-ähnlich, Bl. gelb im			
Winter	„ 60—80 „ „	5.—	—
	„ 100—125 „ „	8.—	—
	„ 175—200 „ „	12.—	—
— rubra Hort. (H. jap. flavo-purpurasc.)	„ 40—60 „ „	4.—	—
Bl. m. rotgestreiften Blütenfahnen			
	„ 60—80 „ „	5.—	—
	„ 100—125 „ „	8.—	—
	„ 150—200 „ „	12.—	—
mollis Oliv.	„ 40—60 „ „	5.—	—
B. wollig filzig, Bl. groß, gelb, D			
	„ 60—80 „ „	6.50	—
	„ 175—200 „ „	15.—	—
— brevipedata Hort.	„ 30—40 „ „	6.—	—
Bl. lebhaft eigelb, dichtknäuelig			

HAMAMELIS (Fortsetzung):

				1 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>vernalis</i> Sarg.	m.B.	60—80	cm hoch	5.—	—
Bl. klein, sternartig					
<i>virginiana</i> L.	"	100—120	" "	5.—	—
B. glänzendgrün, Bl. gelb im Herbst					

HELIANTHEMUM, siehe unter „Stauden“**HELWINGIA** — *Cornaceae*

<i>japonica</i> F. G. Dietr. (<i>H. rusciflora</i> Willd.)	"	30—40	" "	3.—	—
B. klein, tiefgrün, Bl. grünlich Δ					

HIBISCUS — Eibisch — *Malvaceae*

<i>syriacus hybridus ardens</i> Hort. violettrosa gef.	30—40	" "	4.—	—
— — <i>grandiflorus superbus</i> Hort. rosa, einf.	30—40	" "	4.—	—

HIPPOPHAE — Sanddorn — *Elaeagnaceae*

<i>salicifolia</i> D. Don. *	40—60	" "	1.—	—
B. oben dunkelgrün, unten silber				

HOVENIA — Fruchtbaum — *Rhamnaceae*

<i>dulcis</i> Thunb.	m. Tb.			1.50	—
B. groß, sattgrün, Bl. grünlich, Fr. essbar					

HYDRANGEA — Garten-Hortensie — *Saxifragaceae*

<i>arborescens cordata</i> Torr. & Gr. gelbw.	m. B.	40—60	" "	1.—	—
— <i>grandiflora</i> Rehd., weiß	"	30—40	" "	1.—	—
— <i>urticifolia</i> Hort., weißlich	"	60—80	" "	1.50	—
<i>hortensis lindleyana</i> Nichols.	"	40—60	" "	2.—	—
(<i>H. serrata</i> rosalba Wils.) weiß und blau					
— <i>macrosepala</i> Dipp., weiß und blau	"	30—40	" "	1.50	—
— <i>otaksa</i> Hort., purpurrosa Ball.	"	20—30	" "	1.50	120.—
<i>macrophylla domotoi</i> Hort., reinrosa	"	20—30	" "	1.50	—
<i>nivea</i> , siehe <i>H. radiata</i>					
<i>opuloides acuminata</i> Diek, rosa und blau	"	40—60	" "	2.—	—
— <i>japonica belzoni imperialis</i> Hort., blau	"	20—30	" "	1.50	—
— <i>stellata rubra</i> Dipp. rosa u. tiefpurp.	"	30—40	" "	2.—	—
<i>paniculata grandiflora</i> Sieb., weiß, hoch m. 3 Tr.	"		" "	1.—	—
<i>quercifolia</i> Bartr. eichenblättrig,	m. B.	30—40	" "	1.50	—

Bl. rötlich weiß

<i>radiata</i> Walt. (<i>H. nivea</i> Mich.) gelbweiß	40—60	" "	1.50	—
--	-------	-----	------	---

serrata rosalba, siehe *H. hortensis lindleyana*

<i>xanthoneura wilsoni</i> Rehd., weiß	m. Tb.	20—30	" "	2.—	—
--	--------	-------	-----	-----	---

HYMENANTHERA — Hautanthere — *Violaceae*

<i>crassifolia</i> Hook. F. I Δ H	m. Tb.	20—30	cm hoch	3.—	—
-----------------------------------	--------	-------	---------	-----	---

B. myrtenähnlich, Fr. bläulichpurpur

HYPERICUM — Hartheu, Johanniskraut — *Guttiferae*

Siehe auch unter „Stauden“

<i>moserianum</i> André	m. B.			1.50	—
-------------------------	-------	--	--	------	---

B. stumpfoval, Bl. goldgelb in Büscheln

<i>patulum forrestii</i> Chitt.	"	40—60	cm hoch	1.50	—
---------------------------------	---	-------	---------	------	---

Bl. sehr groß, sattgoldgelb

IBERIS, siehe unter „Stauden“**ILEX** — Hülse, Stechpalme — *Aquifoliaceae* *

<i>aquifolium</i> L. H I	m. B.	50—70	cm hoch	7.—	—
--------------------------	-------	-------	---------	-----	---

Heimische Stechpalme

— <i>aureo-marginata</i> Hort. I	"	30—40	" "	5.—	—
----------------------------------	---	-------	-----	-----	---

B. gelb gerandet

— <i>bicolor</i> Hort. I	"	20—30	" "	4.—	—
--------------------------	---	-------	-----	-----	---

B. hübsch gelbbunt

— <i>calamistrata</i> Goep. I	"	30—40	" "	5.—	—
-------------------------------	---	-------	-----	-----	---

B. tütenförmig gedreht

"	"	40—60	" "	6.—	—
---	---	-------	-----	-----	---

ILEX (Fortsetzung):

				1 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>aquifolium foxi</i> Moore I	m. B.	40—60	cm hoch	6.—	—
B. fein gesägt, Fr. orangerot	"	60—80	" "	9.—	—
"	"	80—100	" "	12.—	—
— <i>handsworthensis</i> Moore (L. <i>spinosissima</i> Hesse)					
B. gewellt, sehr stachelig I	"	30—40	" "	5.—	—
— <i>laurifolia</i> Koch I	"	30—40	" "	5.—	—
B. stachellos, lorbeerblättrig	"	40—60	" "	6.—	—
— <i>longifolia pyramidalis</i> Hort. I	"	40—60	" "	6.—	—
B. wenig bestachelt, Fr. sehr reich					
— <i>occidentalis platyphylloides</i> Christ.	"	40—60	" "	6.—	—
B. sehr groß, dunkelgrün					
— <i>scotica</i> Koch (I. <i>aquif. marginata</i> Loud.)	"	30—40	" "	5.—	—
B. mit festem, verdicktem Rand, grün I					
<i>crenata microphylla</i> Maxim. I	"	30—40	" "	2.50	—
B. sehr klein, ähnlich <i>Lonicera nitida</i>					
— <i>aureo-variegata</i> Goldring I	"	20—30	" "	2.50	—
B. klein gelbbunt					
<i>fargesii</i> Franch. I	m. Tb.	20—30	" "	3.—	—
B. lang, schmal, trübgrün	m. B.	40—60	" "	6.—	—
"	"	100—120	" "	12.—	—
<i>glabra</i> Gray (Prinos <i>glaber</i> L.) I	"	30—40	" "	3.—	—
Wertvolles Unterholz, B. dicht, frischgrün					
<i>pedunculosa continentalis</i> Loes. I	m. Tb.	20—30	" "	3.—	—
B. ligusterähnlich, glänzendgrün	m. B.	40—60	" "	6.—	—
"	"	125—150	" "	15.—	—
<i>pernyi</i> Franch. I	"	20—30	" "	3.—	—
B. stark derbspitzig, dick, frischgrün					
— <i>manipurensis</i> Loes. I	"	30—40	" "	5.—	—
B. größer als die Art, Blattgrund rundlich					
— <i>veitchii</i> Rehd. I	"	20—30	" "	3.—	—
B. größer als die Art, 4—5 Rand-Stacheln					
<i>sieboldii</i> Miq. (I. <i>serrata</i> Thunb.)	"	125—150	" "	3.—	—
B. klein, Fr. zahlreich, korallenrot					
<i>spinosissima</i> , siehe I. <i>aquif. handsworthensis</i>					
<i>yunnanensis</i> Franch. I	"	30—40	" "	5.—	—
B. eiförmig, klein, stachellos	"	100—120	" "	12.—	—
INDIGOFERA — Indigostrauch — Leguminosae					
<i>gerardiana</i> Wall; Δ		30—40	" "	2.50	—
Überhängend, Bl. purpurrosa Ähren					
<i>potaninii</i> Craib. Δ		40—60	" "	3.—	—
B. unten graugrün, Bl. lilarosa Rispen					
JASMINUM — Jasmin — Oleaceae					
<i>beesianum</i> Forrest & Diels Δ	m. B.	60—80	" "	2.—	—
Leicht schlingend, Bl. hell-weinrot D					
<i>floridum</i> Bge. I	m. Tb.	20—30	" "	2.—	—
Leicht schlingend, Bl. gelb, endständig					
<i>nudiflorum</i> Lindl. Echtes Jasmin I	"	30—50	" "	1.50	120.—
Kletternd, Bl. sattgelb im Winter, D					
<i>stephanense</i> Hort.	"	20—30	" "	1.50	—
Leicht schlingend, Bl. zartrosa, D					
JUGLANS — Walnuß — Juglandaceae					
<i>cinerea</i> L.-Butternuß	Hochst.	10/12 cm	Umfg.	12.—	—
B. schön gefiedert, Fr. länglich					
<i>cordiformis</i> Maxim. (J. <i>sieboldiana cordiformis</i> Mak.)					
Schlankwüchsig, Fr. ähnlich	Hochst.	12/14 cm	Umfg.	15.—	—
<i>Carya</i>	"	18/20	" "	20.—	—

JUGLANS (Fortsetzung):

				1 St. DM	100 St. DM
nigra L. Schwarze Walnuß	Hochst.	8/10 cm	Umfg.	10.—	—
Großkroniger Baum, imposant	"	14/16	" "	18.—	—
sieboldiana Maxim.	"	8/10	" "	10.—	—
B. bis 1m lang, sehr zierend					

KALMIA — Berglorbeer — Ericaceae I

angustifolia L.	m. B.	40—50	cm hoch	5.—	—
B. frischgrün, Bl. purpurn in Büscheln					
— rubra Lodd.	"	30—40	" "	4.50	—
Bl. dunkelrot	"	40—50	" "	5.—	—
latifolia L. Lorbeerrose	"	20—30	" "	3.—	—
Breitblättrig, Bl. rosa bis weiß	"	30—40	" "	4.—	—
	"	50—60	" "	7.50	—

KOLKWITZIA — Kolkwitzie — Caprifoliaceae

amabilis Graebn.		60—80	" "	1.50	—
------------------	--	-------	-----	------	---

Leicht übergeneigt, Bl. ähnlich Weigelia

LABURNUM — Goldregen — Leguminosae

alpinum Bercht. & Presl.		60—100	" "	1.25	100.—
Bl. in langen, gelben Trauben					
vulgare Bercht. & Presl. (L. anagyroides Med.)		80—120	" "	1.—	80.—
Bl. goldgelbe Trauben, Höhe b. z. Krone		120—140	" "	3.—	—
— alschingeri Rchb. H. b. z. Kr.		140—160 cm hoch	8/10 cm Umfg.	5.—	—
B. unten blaugrau, sehr langtraubig					
watereri Dipp. Höhe b. z. Kr.		140—160	" "	5.—	—
Bl. besonders lange, gelbe Trauben					

LAVANDULA, siehe unter „Stauden“

LEIOPHYLLUM — Sandmyrte — Ericaceae I

buxifolium Ell. Δ	m. B.			4.—	—
-------------------	-------	--	--	-----	---

Niederliegend, Bl. weiß oder rosa

LESPEDeza — Buschklee — Leguminosae

bicolor Turcz.		80—100 cm hoch		2.—	—
----------------	--	----------------	--	-----	---

B. dreiteilig, Bl. violett in langen Trauben

sieboldi, siehe Desmodium penduliflorum

LEUCOTHOE — Traubenheide — Ericaceae

catesbaei Gray (Andromeda cat. Walt.)	m. B.	30—40	cm hoch	2.50	—
---------------------------------------	-------	-------	---------	------	---

Zweige wedelartig, Bl. weiß I Δ *

LIGUSTRINA, siehe Syringa

LIGUSTRUM — Rainweide — Oleaceae B

lodense, siehe L. vulgare lodense					
ovalifolium Hassk. H	5/8 Tr.	40—60	cm hoch	—50	40.—
Breitblättrig, wüchsig					
strongylophyllum Hemsl. I	m. B.	40—60	" "	3.—	—
B. sehr klein, kreisrund, dicklich					
vulgare L. H	5/8 Tr.	70—100	" "	—55	45.—
Kleinblättrig, dichtbuschig	8/12	70—100	" "	—60	50.—
— atrivirens Hort. H I	5/8	60—80	" "	—55	45.—
Besonders hart, straff	8/12	60—80	" "	—65	55.—
— chlorocarpum Loud.		100—120	" "	1.50	—
Fr. gelb, zierend					
— lodense Spaeth. H		20—30	" "	—50	40.—
Niedrig, zu Einfassungen		30—40	" "	—60	50.—

LINDERA — Fieberstrauch — Lauraceae

praecox Bl. (Benzoin pr. S. & Z.) * m. B.		40—60	" "	3.—	—
---	--	-------	-----	-----	---

B. lanzettlich, Bl. gelbgrüne Büschel

sericea Bl. (Benz. umbell. seric. Rehd.) m. Tb.		30—40	" "	3.—	—
---	--	-------	-----	-----	---

B. jung seidigfilzig, Bl. gelb, mit dem Laub

			1 St. DM	100 St. DM
LIRIODENDRON — Tulpenbaum — <i>Magnoliaceae</i>				
<i>tuliflora</i> L. *	m. B.	150—175 cm hoch	5.—	—
B. lebhaft grün, Bl. tulpenartig,	"	175—200 "	6.—	—
gelblich-orange	"	200—250 "	7.50	—
— <i>aureo-marginatum</i> Rehd.	"	70—100 "	8.—	—
B. gelbbunt				
— <i>pyramidale</i> Lev.	"	175—200 "	10.—	—
Geschlossen straff aufrechte Wuchsform				
LONICERA — Heckenkirsche — <i>Caprifoliaceae</i>				
Schlingende Arten siehe unter „Schling- und Kletterpflanzen“				
<i>alberti</i> Reg. Bl. rosalia D		30—40 cm hoch	2.—	—
<i>amoena alba</i> Zbl. Bl. weißgelb		100—150 "	—60	50.—
<i>bella</i> Zbl. Bl. karminrosa *		100—120 "	—60	—
<i>caucasica</i> Pall. Bl. hellila D		80—100 "	—60	—
<i>chrysantha</i> Turcz. Bl. gelb *		80—100 "	—60	—
— <i>turkestanica</i> Rehd. B. breiter		80—100 "	—60	—
<i>coerulea</i> L. Bl. hellgelb		40—60 "	1.—	—
— <i>dependens</i> Reg. Sparrig hängend		40—60 "	1.—	—
<i>floribunda</i> Zbl. Bl. rosa, Fr. gelbrot *		60—80 "	1.—	—
<i>involucrata</i> Banks. Bl. gelbrot *		100—120 "	1.—	—
— <i>serotina</i> Koehne, Bl. orange gelb *		70—80 "	1.—	—
<i>korolkowl</i> Stapf. B. blaugrün, Bl. zartrosa		60—80 "	1.—	—
<i>ledebouri</i> Eschsch., Bl. gelbrot *		40—60 "	1.—	—
<i>maacki</i> Maxim., Bl. groß, weiß		100—120 "	1.—	—
<i>morrowi</i> A. Gray, Bl. weißgelb *		100—120 "	—60	—
<i>nitida</i> Wils., B. sehr zierlich I Δ	m. Tb.	20—30 "	1.25	—
<i>obovata</i> Royle, Bl. hellila D		30—40 "	—60	—
<i>parvifolia</i> Hayne, Bl. rahmweiß		100—125 "	—60	—
<i>pileata</i> Oliv., B. klein, frischgrün I Δ	m. B.	30—40 "	1.50	120.—
— <i>yunnanensis compacta</i> Hort. Δ I	"	30—40 "	1.50	120.—
Besonders hart, Laub zierlich	"	40—60 "	2.—	160.—
<i>prostrata</i> Rehd., Bl. gelblich Δ	"	40—60 "	1.—	—
<i>purpusi</i> Rehd., Bl. rahmweiß, D	"	30—40 "	1.50	—
im Winter vor dem Laub	"	60—80 "	2.—	—
<i>rupicola</i> Hook. f. & Thoms., Bl. hellila D		40—60 "	1.—	—
<i>tatarica</i> L., Bl. rosa B		60—80 "	—60	50.—
— <i>alba</i> Loisel., Bl., weiß B		50—80 "	—60	—
— <i>pulcherrima</i> Rgl., Bl. schön rosarot		80—100 "	—60	—
— <i>rosea grandiflora</i> Hort., Bl. reinrosa		100—120 "	—60	50.—
— <i>ruberrima</i> Hort., Bl. rot		80—100 "	—60	—
<i>xylosteum</i> L. Gemeine Heckenkirsche II		80—120 "	—60	50.—
LYONIA , siehe <i>Chamaedaphne</i>				
MAACKIA , siehe <i>Cladrastis</i>				
MACLUDRANIA — <i>Maclura</i> X <i>Cudrania</i> — <i>Moraceae</i>				
<i>andrei</i> Dode (M. hybrida André)	m. B.	60—80 cm hoch	3.—	—
Dornig, B. groß, glänzendgrün				
MAGNOLIA — Magnolie — <i>Magnoliaceae</i>				
<i>denudata</i> , siehe <i>M. yulan</i>				
<i>hybrida angustifolia</i> Hort.	m. B.	60—80 cm hoch	10.—	—
Bl. weiß mit Purpurrosa	"	100—120 "	15.—	—
— <i>triumphans</i> Hort., Bl. groß, rötlich	"	60—80 "	10.—	—
<i>kobus</i> Thunb.	"	100—120 "	6.—	—
B. klein frischgrün, Hochst.	"	10/12 cm Umfg.	12.—	—
Bl. weiß, vor dem Laub	"	14/16 "	18.—	—

MAGNOLIA (Fortsetzung):

			1 St. DM	100 St. DM
<i>liliflora nigra</i> , siehe <i>M. soulangeana nigra</i>				
<i>salicifolia</i> Maxim.	m. B.	350—400 cm hoch	20.—	—
B. blaugrün, Bl. reinweiß, früheste				
<i>soulangeana</i> Soul., Bl. groß m. Rot	„	80—100 „ „	12.—	—
— <i>alexandriana</i> Hort.	„	80—100 „ „	12.—	—
Bl. weiß, außen rot				
— <i>nigra</i> Nichols. (<i>M. liliflora nigra</i> Rehd.)	„	60—80 „ „	10.—	—
Bl. außen dunkel-, innen hellrot				
<i>norbertiana</i> Hort.	„	60—80 „ „	10.—	—
Bl. weiß mit Hellpurpur, spät	„	80—100 „ „	12.—	—
<i>stellata</i> rosca Veitch.	„	80—100 „ „	15.—	—
Bl. schön rosa getönt, Knospen dunkler				
<i>tripetala</i> L.	„	60—80 „ „	10.—	—
B. sehr groß, Bl. weiß, schmalkelchig				
<i>yulan</i> Desf. (<i>M. denudata</i> Desrouss.)	„	80—100 „ „	12.—	—
B. blendendweiß, lilienartig				

MAHONIA — Fieder-Berberitze — Berberidaceae

<i>aquifolium</i> Nutt. B. †	m. B.	25—30 „ „	1.—	80.—
B. derblederig, Bl. gelb, Fr. blau bereift				
— <i>juglandifolia</i> Jouin	„	30—40 „ „	2.—	—
B. schmaler und dicker				
— <i>vicaryi</i> Hort. Gibbs. Δ	„	30—40 „ „	2.—	—
B. im Austrieb rot, Wuchs breit				

MALUS — Apfel — Rosaceae †

<i>baccata</i> Aldenham Purple Hort. Angl. Büsche	100—150 „ „	3.50	—
B. rötlich, Bl. tiefrot, Fr. purpurrot			
— <i>flavescens</i> Hort., Fr. gelb	„ 80—100 „ „	3.—	—
— <i>hyslop</i> Berkh., Fr. bordeauxrot	„ 100—120 „ „	3.50	—
— <i>nigra</i> Hort., Fr. dunkelrot	„ 80—100 „ „	3.—	—
— <i>Orange</i> Hort., Fr. orangegelb	„ 80—100 „ „	3.—	—
— <i>Ringo</i> Hort., Fr. gelblich	„ 100—120 „ „	3.50	—
<i>eleyi</i> Hesse (<i>M. purpurea eleyi</i> Rehd.)	„ 80—100 „ „	3.50	—
Bl. weinrot, Fr. dunkelpurpurrot			
<i>floribunda</i> Sieb.	„ 100—125 „ „	3.50	—
Bl. zartrosa, Knospen dunkel, H. b. z. Kr.	100—120 „ „	4.50	—
Fr. gelb mit Rot, erbsengroß			
— <i>atrisanguinea</i> Hort. Bl. dklrot Büsche	80—100 „ „	3.—	—
— <i>purpurea</i> Barb. (<i>M. purpurea</i> Rehd.)	„ 80—100 „ „	3.—	—
Fr. dunkelblutrot	Höhe b. z. Kr. 120—140 „ „	4.50	—
<i>Frau Luise Dittmann</i> Hort.	Büsche 80—100 „ „	3.—	—
B. sehr groß, pfirsichrot mit Weiß, früh			
<i>magdeburgensis</i> Schoch	Büsche 100—125 „ „	3.50	—
Bl. lilarosa, halbgef., Fr. groß			
<i>micromalus</i> Mak.	„ 80—100 „ „	3.—	—
Bl. lebhaftrosa, Fr. hellrot, lange haftend			
<i>moerlandsi</i> Hort. Holl.	Büsche 80—100 „ „	3.—	—
Bl. weißlich, reichblühend			
<i>niedzwetzkyana</i> Diek.	„ 80—100 „ „	3.—	—
Bl. dunkelrosa, Fr. sehr groß, dklrot, eßbar			
<i>purpurea</i> , siehe <i>M. floribunda purpurea</i>			
— <i>eleyi</i> , siehe <i>M. eleyi</i>			
— <i>lemoinei</i> Hort., B. rot	Büsche 80—100 „ „	3.—	—
<i>scheideckeri</i> Zbl.	„ 100—120 „ „	3.50	—
Bl. zahlreich, hell- bis dunkelrosa, halbgef., Fr. kirschgroß			

MALUS (Fortsetzung)

			1 St. DM.	100 St. DM.
sieboldi calocarpa Rehd. (M. zumi calocarpa Rehd.)				
Bl. weiß, Fr. dunkel- bis hellrot	Büsche	60—80 cm hoch	3.—	—
zumi Rehd. Bl. weiß, Fr. kugelig, gelbrot	„	100—125 „	3.50	—
MENZIESIA — Menziesie — <i>Ericaceae</i>				
ferruginea Sm. Δ	m. B.	100—125 „	7.50	—
B. behaart, Bl. trüb ziegelrot				
MERATIA — Winterblüte — <i>Calycanthaceae</i>				
praecox Rehd. & Wils. (Calycanthus.)	m. B.	40—60 „	3.50	—
B. am alten Holz, gelblich mit Purpurbraun				
MUEHLENBECKIA — <i>Polygonaceae</i>				
axillaris Walp. (M. nana Hort.) Δ	m. B.		1.—	80.—
Kriechend, B. klein, dklgrün, Bl. gelbe Sternchen				
MYRICA — Wachsmyrte — <i>Myricaceae</i>				
cerifera L. Δ *	m. B.	30—50 „	1.—	—
B. spitzlantzettlich, Fr. m. weißem Wachsüberzug				
MYRICARIA — Deutsche Tamariske, Rispelstrauch — <i>Tamaricaceae</i>				
germanica Desv. (Tamarix germ. L.)		80—100 cm hoch	1.—	—
B. schuppenförmig, Bl. hellrot in Ähren				
NOTHOFAGUS — Scheinbuche — <i>Fagaceae</i>				
antarctica Oerst.	m. B.	100—120 „	3.—	—
B. klein in fächerartigen Zweigen				
ORIXA — <i>Rutaceae</i>				
japonica Thunb. (Evodia ramiflora A. Gr.)	m. B.	80—100 „	2.—	—
B. drüsig punktiert, Bl. grünlich, traubig				
OSMANTHUS — Duftblume — <i>Oleaceae</i>				
aquifolium Benth. & Hook. (O. ilicifolius Mouillef.)				
B. ilexartig, Bt. weiß D	m. B.	40—60 „	4.—	—
		60—80 „	6.—	—
		80—100 „	7.50	—
OXYCOCCOUS , siehe <i>Vaccinium</i>				
PACHYSANDRA , siehe unter „Stauden“				
PACHYSTI(G)MA — Dicknarbe — <i>Celastraceae</i>				
canbyi A. Gr. Δ	m. B.	30—40 „	5.—	—
Flach, wurzelnd, Bl. bräunlichrot				
myrsinites Raf. Δ		20—30 „	2.—	—
B. breitelliptisch, lederig, hellgrün				
PAEONIA , siehe unter „Stauden“				
PANAX , siehe <i>Echinopanax</i>				
PARROTIA — <i>Hamamelidaceae</i> *				
persica C. A. Mey.	m. B.	100—125 „	4.—	—
Baumartig, B. jung rotbraun, Bl. gelbrot vor dem Laub		150—200 „	5.—	—
PAVIA , siehe <i>Aesculus</i>				
PERNETTYA — Torfmyrte — <i>Ericaceae</i>				
mucronata alba Davis, Fr. schneeweiß	m. B.	20—30 „	1.50	—
— purpurea Davis, Fr. violett-purpur		20—30 „	1.50	120.—
— rosea Davis, Fr. rosa		20—30 „	1.50	120.—
PHILADELPHUS — Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch — <i>Saxifragaceae</i>				
billardii Koehne (Ph. insignis Carr.)		100—125 cm hoch	— 75	—
Bl. reinweiß, becherförmig, rispig				

PHILADELPHUS (Fortsetzung):

			1 St. DM.	100 St. DM.
coronarius L., Bl. rahmweiß, traubig D	40—60	cm hoch	—,75	—
— aureus Rehd., Austrieb goldgelb	40—60	„ „	—,75	—
— pumilus West. Δ Dichtbuschig, rundlich	30—40	„ „	—,75	—
falconeri Sarg. Bl. reinweiß, gewellt	100—125	„ „	—,75	—
gordonianus Lindl., Bl. reinweiß, glockig	100—125	„ „	—,75	—
grandiflorus Willd., Bl. groß, weiß, einf. D	100—125	„ „	—,75	—
hirsutus Nutt. Bl. schneeweiß, duftlos	60—80	„ „	—,75	—
insignis, siehe Ph. billardi				
latifolius Schrad. Bl. milchweiß, traubig D	100—125	„ „	—,75	—
lemoinei Albatre Lem.	30—40	„ „	1.—	—
Bl. reinweiß, gefüllt, in dichten Rispen				
— Belle Etoile Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl. sehr groß, einfach, milchweiß, Mitte rosa				
— Conquete Lem.	30—40	„ „	1.—	—
Bl. groß, gefüllt, reichblühend D				
— Dresden Loebn. Δ	40—60	„ „	1.—	—
Bl. schneeweiß, einfach, sehr blühwillig				
— Enchantment Lem.	40—60	„ „	1.—	—
Bl. weiß, gefüllt, dichttraubig				
— erectus grandiflorus Hort., siehe Ph. lem. Montblanc				
— Favourite Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl. reinweiß, einfach, auffallend gelbe Staubfäden				
— fimbriatus Lem. Δ H	40—60	„ „	1.—	90.—
Bl. weiß, einfach, Petalen gedreht, eingeschnitten				
— Girandole Lem.		Sträucher	1.—	90.—
Bl. milchweiß, dicht gefüllt, sehr jung blühend				
— Glacier Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl. klein, milchweiß, gefüllt, spätblühend				
— Manteau d'Hermine Lem.	60—80	„ „	1.—	—
(Ph. lem. ochroleucus Hort.)				
Bl. halbgefüllt, rahmweiß, klein Δ				
— Montblanc Lem. (Ph. lem. erect. grdf. Hort.)	40—60	„ „	1.—	90.—
Bl. weiß, Wuchs straff aufrecht D				
— Norma Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl. reinweiß, einfach bis halbgefüllt, Wuchs straff				
— ochroleucus Hort., siehe Ph. lem. Manteau d'Hermine				
— Virginal Lem. (Ph. virginalis Lem.)	60—80	„ „	1.—	—
Bl. groß, reinweiß, gut gefüllt, reichblühend				
magdalenae Koehne	80—100	„ „	—,75	—
Bl. weiß, glockig, rund, duftlos				
microphyllus Gray Δ D	40—60	„ „	1.—	—
Feinzweigig, kleinlaubig, Bl. klein, weiß				
nivalis Jaques	100—125	„ „	—,75	—
Bl. weiß, breit, traubig, reichblühend D				
pekinensis Rupr.	40—60	„ „	—,75	—
Bl. rahmweiß, dichte Trauben				
— kansuensis Rehd.	40—60	„ „	—,75	—
Laub rauher behaart, sonst wie die Art				
pubescens Loisl.	80—100	„ „	—,75	—
Holz weißlich, Bl. milchweiß, einfach D				
satsumi Yokohama Hort.	100—125	„ „	—,75	—
Bl. milchweiß, dichtlaubig, duftlos				
sericanthus rehderianus Koehne	80—100	„ „	—,75	—
Besonders großlaubig, Bl. weiß, nach Heu duftend				
virginalis, siehe Ph. lem. Virginal				
zeyheri Schrad.	100—125	„ „	—,75	60.—
Holz tiefbraun, Bl. milchweiß, fast quadratisch D				

			1 St. DM.	100 St. DM.
PHILLYREA — Steinlinde — Oleaceae I				
<i>latifolia</i> L.	m. B.	60—80 cm hoch	3.—	—
B. dicklederig, breiteiförmig, dunkelgrün				
<i>myrtifolia</i> Hort	"	40—60 "	2.50	—
Wuchs dicht, B. klein, schmal, dklgrün "				
	"	60—80 "	3.—	—
PHYLLODOCE — Moosheide — Ericaceae I				
<i>taxifolia</i> Salisb. (Ph. <i>coerulea</i> Bab.)	Δ m. B.		2.50	—
Heideähnlich, Bl. bläulichpurpur, krugförmig				
PHYSOCARPUS — Blasenspiere — Rosaceae B				
<i>intermedius parvifolius</i> Rehd.	II	60—100 "	—60	50.—
Dicht, B. klein, Bl. rosa				
<i>opulifolius inebrians</i> Zbl.	"	80—100 "	—60	—
B. herzförmig rundoval, Bl. leicht rosa				
— <i>luteus</i> Zbl.	"	40—60 "	—60	—
B. im Austrieb goldgelb, später gelbgrün				
PICRASMA — Bitterholz — Simarubaceae				
<i>allantoides</i> Planch. (P. <i>quassoides</i> Benn.)	"	80—100 "	2.—	—
Junge Triebe purpurrot filzig, B. sehr groß, gelbgrün				
PIERIS — Ericaceae I				
<i>floribunda</i> Benth. & Hook. (<i>Andromeda</i>)	m. B.	40—50 "	4.—	—
B. lederartig, Bl. weiß in aufrechten Rispen				
<i>japonica</i> D. Don. (<i>Androm. jap. Thunb.</i>)	m. B.	40—50 "	4.—	—
B. quirlig, Bl. weiß, nickende Rispen				
"	"	60—70 "	6.—	—
— <i>nana compacta</i> Hort. (P. j. <i>pygmaea</i>)	Δ	20—30 hoch u. breit	4.—	—
Zwergausgabe der Art, sehr dicht				
"	"	30—40 "	5.—	—
"	"	60—70 "	8.—	—
PLAGIOSPERMUM , siehe <i>Prinsepia</i>				
PLATANUS — Platane — Platanaceae				
<i>acerifolia pyramidalis</i> CS.	Hochst.	8/10 cm Umfg.	5.—	—
Altbekannter Straßenbaum,				
"	"	12/14 "	7.50	600.—
Rinde abblätternd, B. hellgrün				
"	"	14/16 "	9.25	750.—
"	"	16/18 "	12.50	—
POLYGALA — Kreuzblume — Polygalaceae				
<i>chamaebuxus</i> L. Buchsbaumkreuzblume	I Δ	m. Tb.	1.50	—
B. ähnlich Buchs, Bl. gelbweiß, fast immerblühend				
POPULUS — Pappel — Salicaceae				
<i>alba nivea</i> Ait. Silberpappel	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.—	—
B. jung graufilzig, unten schnee-				
"	"	8/10 "	3.75	—
weiß, für feuchte Lagen				
"	"	10/12 "	5.—	—
— <i>pyramidalis</i> Bge. (P. <i>alba</i> boll.)	Pyram.	120—150 cm hoch	2.50	—
Pyramiden Silberpappel				
"	"	200—250 "	4.—	—
<i>angulata cordata robusta</i> Sim., Louis	Hochst.	6/8 cm Umfg.	2.50	220.—
Robusta-Pappel, bekannte, leistungs-				
"	"	8/10 "	3.—	250.—
starke Pappel, schnellwüchsig				
"	"	10/12 "	3.75	—
<i>balsamifera candicans</i> Gray (P. <i>candicans</i>)	"	8/10 "	3.—	—
Ontario-P. Breitkronig, B. groß, unten graugrün				
— <i>missouriensis</i> , siehe P. <i>deltoides missouriensis</i>				
<i>bcrolinensis</i> Dipp.	Hochst.	6/8 "	2.50	—
Hybrid-P., pyramidal, B. spitzeiförmig,				
"	"	8/10 "	3.—	—
wellig, dunkelgrün				
"	"	16/18 "	7.50	—
<i>canadensis</i> Moench.	"	6/8 "	2.50	220.—
Schnellwüchsige Hybrid-P., B. drei-				
"	"	8/10 "	3.—	250.—
eckig, bläulichgrün				
"	"	10/12 "	3.75	—
— <i>betulifolia</i> Hort.	"	8/10 "	3.—	—
B. kleiner als die der Art				
"	"	12/14 "	5.—	—

POPULUS (Fortsetzung):

			1 St. DM.	100 St. DM.
candicans, siehe <i>P. balsamifera candicans</i>				
deitoides missouriensis Henry	Hochst.	8/10 cm Umfg.	3.75	—
(<i>P. balsamifera missouriensis</i> Rehd.)	"	10/12 " "	5.—	—
Auffallend starkwüchsige <i>P.</i> ,	"	12/14 " "	6.25	—
<i>B. breiteiförmig</i>	"	25/30 " "	15.—	—
generosa Henry		300—350 cm hoch	2.—	—
Schnellwachsende Hybrid- <i>P.</i> ,	"	8/10 cm Umfg.	3.—	—
<i>B. herzförmig, groß</i>				
korcana Rehd.		125—150 cm hoch	1.50	—
Pyramidal, <i>B. groß, unten</i>	Pyramiden	350—400 " "	3.—	—
fast weiß, länglichoval				
lasiocarpa Oliv.		50—70 " "	5.—	—
<i>B. schr groß, herzförmig, graugrün</i>				
nigra L. Schwarzpappel	Helster	250—300 " "	2.—	160.—
Bekannte <i>P. für feuchte Böden</i>	Hochst.	10/12 cm Umfg.	4.—	—
	"	12/14 " "	5.—	—
— fastigiata Hort. (<i>P. nigra italica</i> Dur.)				
Weitverbreitete Pyramiden- <i>P.</i>	Pyramiden	200—250 cm hoch	2.50	220.—
przewalski Maxim. (<i>P. suaveolens przewalski</i> CS.)				
<i>B. unterseits weiß, wohlriechende P.</i>		200—250 " "	2.50	—
robusta, siehe <i>P. angulata cordata robusta</i>				
simoni Carr. Chinesische <i>P.</i>	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.—	—
Schnellwüchsig, <i>B. eieleptisch, kurzgestielt</i>				
— fastigiata CS.		125—150 cm hoch	2.—	—
Pyramidenform der chines. <i>P.</i> , treibt		150—175 " "	2.50	—
früh, <i>B. haften lange</i>				
szechuanica tibetica CS.		150—180 " "	2.—	—
<i>B. groß, rotgestielt</i>		250—300 " "	2.50	—
trichocarpa Torr & Gray	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.—	—
<i>B. länglich, glänzendgrün, unten</i>	"	16/18 " "	9.—	—
weißlich, sicher gegen Wildverbiß				

POTENTILLA — Fünffingerstrauch — Rosaceae

fruticosa L. H		60—80 cm hoch	—60	—
Aufrecht, dicht, Bl. lebhaftgelb				
— albescens Hort. Gibbs.		40—60 " "	1.—	—
<i>B. dunkelgrün, Bl. weiß, kontrastreich</i>				
— „Friesengold“ Hesse. NEUHEIT! m. B.		40—50 " "	3.—	—

Nach langjährigen Beobachtungen haben sich die besonderen Elgenschaften dieser Neuheit als gut konstant erwiesen.

„FRIESENOLD“ fällt durch buschig-kugeligen Wuchs, durch große Reichblütigkeit und lebhaft elgelbe Blüten im Sortiment der Potentillen alljährlich stark auf.

Die Neuheit stellt daher einen unverkennbaren Fortschritt dar.

— mandschurica Maxim. Δ	m. B.	30—40 cm breit	2.—	—
Wuchs überhängend, treibt sehr früh,				
<i>B. graugrün, Bl. reinweiß</i>				
— micrandra CS.		40—50 cm hoch	1.—	—
Breitwüchsig, kanariengelb				
— parvifolia Wolf.		30—40 " "	—75	60.—
Kleinlaubig, Bl. schwefelgelb				
— purdomi Rehd.		40—60 " "	1.—	80.—
<i>B. graublau, Bl. blaßgelb</i>				
— sulphurea Hort.		50—70 " "	1.—	—
<i>B. graublau, Bl. schwefelgelb</i>				

POTENTILLA (Fortsetzung):

			1 Stck. DM.	100 St DM.
<i>fruticosa</i> veitchi Bean. (P. veitchi Wils.)	50—60	cm hoch	1.—	—
B. graugrün, Bl. schneeweiß				
PRINOS , siehe <i>Ilex glabra</i>				
PRINSEPIA — (<i>Plagiospermum</i>) — Rosaceae				
<i>uniflora</i> Batal.	m. B.	20—30	cm hoch	2.—
Bedornt, B. schmal, Bl. weiß, Fr. schwarz				
PRUNUS — Kirsche, Pflaume — Rosaceae				
<i>acida</i> plena Kirchn.	Höhe b. z. Kr.	140—160	„ „	5.—
Form der Sauerkirsche, Bl. weiß, dichtgefüllt				
<i>avium</i> plena CS.	Höhe b. z. Kr.	140—160	„ „	5.—
Form der Vogelkirsche, 180—200 Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg.				
Bl. reinweiß, dichtgefüllt				
<i>humilis</i> Bge.		60—80	cm hoch	3.—
Strauchartig, Bl. weiß oder blaßrot				
<i>japonica alba plena</i> Lem. (Pr. glandul. alba)		40—60	„ „	2.—
Bl. weiß gefüllt				
— <i>Nakai</i> Rehd., B. unters. behaart, Bl. weiß		40—60	„ „	3.—
— <i>rosea plena</i> Hort. (Pr. glandul. sinensis)		40—60	„ „	2.—
Bl. rosa gefüllt				
<i>laurocerasus rotundifolia</i> Nichols. I	m. B.	60—80	„ „	6.—
Kirschlorbeer, B. besonders rundlich				
— <i>schipkaensis compacta</i> Klenert I		30—40	„ „	3.—
Breitwüchsig, hart, blühwillig				
— — <i>macrophylla</i> Hort. I		40—60	„ „	3.75
Besonders großblättrige Form				
— — <i>rufescens</i> Klenert I		30—40	„ „	3.—
Austrieb bräunlichrot, B. lanzettförmig				
— — <i>zabelliana</i> Spaeth. I		40—60	„ „	3.75
B. schmal, weidenartig, frischgrün				
— <i>serbica</i> Pancic I		30—40	„ „	3.—
Niedrig, B. breit, dunkelgrün				
— <i>lusitanica pyramidalis</i> L. I		60—80	„ „	6.—
B. lorbeerartig, Wuchs dichtpyramid.				
— auch als Kübelpflanze verwertbar		100—120	„ „	12.—
<i>mahaleb</i> L. Weichselkirsche		50—80	„ „	—60
Bl. weiß, duftend, Fr. eiförmig, sehr herb				
<i>orthosepala</i> Koehne		60—80	„ „	2.—
Zweige rotbraun, B. schmal, graugrün, Bl. weiß				
<i>padus</i> L. Traubenkirsche		80—100	„ „	—75
Bl. weiß in langen, lockeren Hängetrauben				
<i>pissardi nigra</i> Hesse II		100—125	„ „	3.—
B. glänzend schwarzpurpurn, Bl. lilarosa				
<i>pumila</i> L. Sandkirsche Δ *		100—120	„ „	1.—
B. graugrün, Bl. weiß, Fr. schwarzpurpurn				
— <i>depressa</i> Bean. Δ Für Böschungen!		80—100	„ breit	2.—
Niederliegend, Bl. weiß				
<i>serotina</i> Ehrh. Deutscher Lorbeer		80—100	„ hoch	—60
Bl. weiß in Trauben, Fr. erbsengroß, schwarzpurpurn				
<i>serrulata</i> Hisakura Koehne	Höhe b. z. Kr.	140—160	„ „	5.—
Zierkirsche, Bl. 180—200 cm Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg.				
dunkelrosa, dichtgefüllt, Austrieb bronze				
<i>simoni</i> Carr.		80—100	cm hoch	3.—
B. pfirsichähnlich, Bl. weiß				

PRUNUS (Fortsetzung):

			1 St. DM.	100 St. DM.
<i>subhirtella</i> Miq.	Höhe b. z. Kr.	140—160 cm	5.—	—
Leicht hängend, Bl. weiß bis rosa				
— <i>plena</i> Hort. Dahlem	Höhe b. z. Kr.	140—160 „	5.—	—
Frühblühend, Bl. weiß mit Rosalila, gefüllt				
<i>tomentosa endotricha</i> Koehne		60—80 „ hoch	3.—	—
B. dichtfilzig, Bl. weiß, Fr. fuchsrot				
<i>virginiana</i> , L. †		100—120 „ „	—60	50.—
Bl. weiß, spät, in abstehenden Trauben		150—200 „ „	—75	—
Fr. glänzendrot				

PTEROCARYA — Flügelnuß — Juglandaceae †

<i>fraxinifolia</i> Spach.	125—150 „ „	2.50	—
B. eschenartig, Fr. in bis 45 cm	Hochst. 8/10 cm Umfg.	5.—	—
langen Fruchtständen			
— <i>dumosa</i> Lav.	60—80 cm hoch	2.50	—
Strauchig, Holz gelbbraun			

PTEROSTYRAX — Flügelstorax — Styracaceae

<i>corymbosa</i> S. & Z.	100—125 „ „	3.—	—
B. oval, Bl. gelblichweiß, breitrispig			

PYRACANTHA — Feuerdorn — Rosaceae

<i>coccinea</i> Roem. I †	m. Tb. 20—30 „ „	2.—	150.—
Bedornt, Fr. leuchtendrot	m. B. 30—40 „ „	2.25	180.—
— <i>Kasan</i> Kort. I †	m. Tb. 20—30 „ „	2.25	—
Besonders reichfruchtend, mennigrot			
<i>gibbsii compacta</i> Hort. I † Δ	m. B. 20—30 „ „	2.25	—
Dicht, B. gröber, Fr. lebhaftrot			

QUERCUS — Eiche — Fagaceae

<i>ambigua</i> Mchx. (Q. borealis Mchx.) *	m. B. 175—200 „ „	10.—	—
Schnellwüchsige Roteiche			
<i>austriaca sempervirens</i> Hort. (Q. pseudo-turneri CS.)			
Buschig, B. dklgrün, im Winter haft.	m. B. 125—150 „ „	12.—	—
<i>borealis maxima</i> , siehe Q. rubra			
<i>cerris</i> L. Zerr-Eiche *	Hochst. 8/10 cm Umfg.	8.—	—
Oft strauchig, B. länglich-elliptisch,	„ 14/16 „ „	15.—	—
tiefgrün			
<i>coccinea</i> Muenchh. Scharlacheiche *	„ 8/10 „ „	15.—	—
Für trockene Böden, B. tiefgelappt			
<i>hartwissiana</i> Stev.	m. B. 175—200 cm hoch	10.—	—
B. kurzklappig, ähnlich Q. macranthera			
<i>imbricaria</i> Michx. Schindeleiche	Hochst. 8/10 cm Umfg.	12.—	—
B. lederartig, länglich, für feuchte Lagen			
<i>libani angustifolia</i> Dipp. I	m. B. 175—200 cm hoch	10.—	—
Feinzweigig, B. lanzettlich, scharf gesägt			
<i>macranthera</i> Fisch & Mey	„ 175—200 „ „	10.—	—
Zweige wollig, B. groß, dunkelgrün,	„ 200—250 „ „	12.—	—
unterseits weich behaart			
<i>monticola caroliniana</i> Hort. Musk.	„ 150—175 „ „	8.—	—
B. derb lederig, wenig eingebuchtet	„ 175—200 „ „	10.—	—
<i>palustris</i> L. Sumpfeiche *	Hochst. 8/10 cm Umfg.	7.50	650.—
B. klein, tief fiederspaltig, für	„ 10/12 „ „	10.—	—
frische, feuchte Stellen	„ 12/14 „ „	12.50	—
	„ 20/25 „ „	30.—	—
	„ 25/30 „ „	35.—	—
<i>pedunculata</i> Ehrh. (Q. robur L.)	„ 8/10 „ „	7.50	650.—
Stiel- oder Sommereiche,	„ 10/12 „ „	10.—	—
Beliebter Alleebaum für tiefe,	„ 18/20 „ „	18.—	—
feuchte Böden	„ 20/25 „ „	25.—	—

QUERCUS (Fortsetzung):

			1 St. DM.	100 St. DM.
<i>pedunculata crispa</i> Hort.	m. B.	175—200 cm hoch	10.—	—
B. wellig gelappt				
— <i>fastigiata</i> Loud. Pyramideneiche	„	200—250 „ „	18.—	—
B. sehr lange haftend				
— <i>grandifolia cucuilata</i> Hort.	„	250—300 „ „	20.—	—
B. aufgeblasen, wellig gelappt				
— <i>macuiata</i> Hort.	„	175—200 „ „	10.—	—
B. gelbweiß gefleckt				
— <i>nigricans</i> Hort.	„	200—250 „ „	18.—	—
Austrieb dunkelbraunrot, Wuchs kräftig				
— <i>pectinata</i> Kirchn.	„	150—175 „ „	10.—	—
B. tief kammartig eingeschnitten	„	200—250 „ „	15.—	—
— <i>scolopendrifolia</i> Kirchn.	„	200—250 „ „	15.—	—
B. lang ausgezogen, unregelmäßig gelappt				
<i>petraea</i> , siehe <i>Q. sessiliflora</i> und Formen				
<i>phellos latifolia</i> Hort. *	m. B.	150—175 „ „	8.—	—
Breitblättrige Form der Weideneiche				
<i>pontica</i> K. Koch	„	125—150 „ „	18.—	—
Strauchartig, B. lang, scharf gezähnt	„	175—200 „ „	25.—	—
<i>rubra</i> Duroi (<i>Q. borealis maxima</i> Sarg.)	Hochst.	6/8 cm Umfg.	4.—	350.—
Roteiche, B. groß, spitzgelappt *	„	8/10 „ „	5.—	450.—
	„	10/12 „ „	6.25	—
— <i>schrefeldi</i> Dipp.	m. B.	150—175 cm hoch	10.—	—
B. sehr groß, grobbuchtig				
<i>schochiana</i> Dieck.	„	150—175 „ „	10.—	—
Hybride zwischen <i>Q. palustris</i> u. <i>phellos</i>				
<i>sessiliflora</i> Salisb. (<i>Q. petraea</i> Liebl.)	m. B.	16/18 cm Umfg.	18.—	—
Traubeneiche, Stamm durchgehend	„	16/18 „ „	18.—	—
sonst ähnlich der Stieleiche				
— <i>columna</i> Hort. Hesse Pyramiden	m. B.	175—200 cm hoch	15.—	—
Säulenform, B. fast ganzrandig	„	250—300 „ „	20.—	—
— <i>pungens</i> Freyn	„	200—250 „ „	15.—	—
Besonders üppig, B. graugrün, sehr reich fruchtend				
RHAMNUS — Faulbaum, Wegdorn — <i>Rhamnaceae</i> B				
<i>cathartica</i> L. Gemeiner Wegdorn, Kreuzdorn	60—80	cm hoch	—60	50.—
B. oval, dunkelgrün, Bl. gelbgrün, Fr. schwarz				
<i>frangula</i> L. Faulbaum, Pulverholz *	60—80	„ „	—60	50.—
Rinde weiß punktiert, Fr. rot bis violett-schwarz				
— <i>asplenifolia</i> Dipp.	m. B.	30—50 „ „	2.50	—
B. feingeschlitzt	„	50—70 „ „	3.50	—
RHODODENDRON — Alpenrose — <i>Ericaceae</i> I Siehe auch <i>Azalea</i> !				
<i>arboreum</i> - u. <i>catawbiense</i> -Hybriden	m. B.	30—40 cm hoch	5.—	400.—
	„	40—50 „ „	6.75	540.—
Teilweise mit Knospen	„	50—60 „ „	8.—	640.—
	„	60—70 „ „	9.50	—
	„	70—80 „ „	11.—	—
mit Knospen	„	80—100 „ „	18.—	—
	„	100—120 „ „	25.—	2000.—
	„	125—150 „ „	30.—	—
	„	175—200 „ „	40.—	—
<i>argyropavillum</i> Franch., weiß m. Rosa	„	30—40 „ „	5.—	—
<i>brachycarpum</i> D. Don., cremew. m. Rosa	„	20—30 „ „	4.—	—
<i>calophytum</i> Franch., hell-lilarosa	„	30—40 „ „	5.—	—

RHODODENDRON (Fortsetzung):

				1 St. DM.	100 St. DM.
campanulatum D. Don., weiß o. helirosa m. B.	30—40	cm hoch		5.—	—
	40—50	" "		7.—	—
campylocarpum Hook. f., blaßgelb,	80—100	" "		18.—	—
rötl. punkt.	100—125	" "		25.—	—
canadense, siehe Rhodora canadensis					
carolinianum Rehd., blaß rosapurpurn	50—60	" "		6.—	—
caucasicum Pall., gelblichweiß	40—50	" "		6.—	—
dahuricum L., rosalila, früh Δ	50—70	" "		8.—	—
decorum Franch., weiß bis rosa	50—60	" "		8.—	—
degronianum Carr. (Rh. metternichi pentamerum Maxim.)					
Bl. schön rosa m. B.	20—30	" "		5.—	—
discolor Franch., blaßrosa, weißl. werd.	40—50	" "		7.—	—
ferrugineum L. Alpenrose, rosenrot Δ	15—20	" "		4.—	—
	40—50	" "		10.—	—
— album Sweet, weiß, Δ	15—20	" "		4.—	—
fortunci Lindl., hellrosa D	40—50	" "		7.—	—
	80—100	" "		18.—	—
galatinum Balf. f., hellrosa m. dkl. Fleck.	20—30	" "		4.—	—
glaucopeplum Balf. f. & Torr., lebhaft rosa	20—30	" "		4.—	—
hippophaeoides Balf. f. & W. W. Sm., Δ	30—40	" "		6.—	—
blaulila	40—60	" "		8.—	—
hirsutum L., rosenrot Δ	15—20	" "		4.—	—
	20—30	" "		5.—	—
	40—50	" "		8.—	—
houlstoni Hemsl. & Wils., rot	40—50	" "		7.—	—
	100—125	" "		25.—	—
	150—175	" "		30.—	—
imbricatum Hort., satt rötlichviolett,	30—40	" "		6.—	—
B. dachziegelartig dicht	50—60	" "		8.—	—
	60—70	" "		10.—	—
impeditum Balf. f. & W. W. Sm. purpbl. Δ	20—30	" "		4.—	—
insigne Hemsl. & Wils.,	30—40	" "		6.—	—
hell oder dunkler rot					
luscombei W. Wats., rosarot bis kirschrot	30—40	" "		6.—	—
	40—50	" "		7.—	—
	60—70	" "		10.—	—
	80—100	" "		18.—	—
	100—125	" "		20.—	—
	125—150	" "		30.—	—
makinoi Tagg., lichtrosa, B. lang, schmal	20—30	" "		4.—	—
metternichi pentamerum, siehe Rh. degronianum					
micranthum Turcz., milchweiß	40—50	" "		7.—	—
minus Mchx. (Rh. punctat. Andr.) rosa Δ	40—50	" "		7.—	—
	50—60	" "		8.—	—
obtusum Planch.,	30—40	" "		5.—	—
lachsrosa bis malvenfarbig Δ					
— japonicum Wils., hochrot Δ *	20—30	" "		5.—	—
ochraceum Rehd. & Wils., kirschrot	20—30	" "		5.—	—
orbiculare Decn., rosarot Δ	20—30	" "		4.—	—
oreodoxa Franch., blaßrosa, sehr früh	50—60	" "		8.—	—
oreotrephes W. W. Sm., malvenfarbig rot	40—50	" "		7.—	—
ovatum Maxim., weiß	40—50	" "		7.—	—

RHODODENDRON (Fortsetzung):

			1 St. DM	100 St. DM
<i>praecox</i> Carr., tief karminrosa, früh Δ m. B.	40—50	cm hoch	6.—	—
<i>punctatum</i> , siehe Rh. minus				
<i>rigidum</i> Franch., hellrosa	125—150	„ „	30.—	—
<i>rubiginosum</i> Franch., malvenfarbig	150	cm hoch u. breit	30.—	—
<i>russatum</i> Balf. f. & Forrest, tief purpurblau	30—40	cm hoch	6.—	—
<i>smirnowi</i> Traut., purpurrosa	20—30	„ „	4.—	—
	30—40	„ „	5.—	—
	40—50	„ „	7.—	—
<i>talienae</i> Franch., hellgelb	40—50	„ „	7.—	—
<i>williamsianum</i> Rehd. & Wils., hellrosa Δ	15—20	„ „	3.—	—
<i>wilsonae</i> Hemsl. & E. H. Wils., rosa Δ	30—40	„ „	4.—	—
<i>yanthinum</i> Bur. & Franch., purpurn	40—50	„ „	7.—	—

RHODORA — Sumpfrosee — *Ericaceae*

<i>canadensis</i> L. (Rhododend. canad. Zbl.) m. B.	40—50	„ „	5.—	—
B. graugr., Bl. violettrosa, zerschl. Δ *	70—80	„ „	10.—	—

RHODOTYPUS — Scheinkerrie — *Rosaceae*

<i>kerrioides</i> S. & Z. (Rh. scandens Mak.) *	60—80	„ „	—75	—
B. dunkelgrün, Bl. schneeweiß, Fr. schwarz				

RHUS — Sumach — *Anacardiaceae*

<i>cotinus</i> , siehe <i>Cotinus coggygria</i>				
<i>elegans superba</i> Demck. *	60—80	„ „	2.—	—
Zweige jung rosa, dichtbuschig	300—350	„ „	5.—	—
<i>typhina</i> L. Hirschkolbensumach, Essigb. *	100—125	„ „	2.—	—
B. groß, gefiedert, Fr. karmesinrot	300—350	„ „	5.—	—

RIBES — Stachelbeere, Johannisbeere — *Saxifragaceae*

<i>alpinum</i> L. H	5/8 Triebe	40—60	cm hoch	—60	50.—
Dichter, straffer Wuchs					
— „Weber“ H	3/5	40—60	„ „	—45	40.—
B. besonders lange haftend					
<i>laurifolium</i> Jancz. I	m. Tb.	15—20	„ „	2.50	—
B. derb, dunkelgrün, Bl. hellgelb, Fr. schwarz					
<i>sanguineum</i> Pursh. Blutjohannisbeere		80—100	„ „	1.—	—
Bl. blutrot in Trauben					
— <i>atrirubrum</i> Loud.		80—100	„ „	1.—	80.—
Bl. tief dunkelrot in Trauben					
— <i>carneum</i> Dipp.		80—120	„ „	1.—	80.—
Bl. fleischfarben, langtraubig					
— <i>grandiflorum</i> Hort.		100—125	„ „	1.—	—
Bl. sehr groß, blutrot, dichtlaubig					

ROBINIA — Schotendorn — *Leguminosae*

<i>pseudacacia</i> L. Falsche Akazie	Hochst	8/10	cm Umfg.	4.—	—
Höher Baum, bestachelt, Bl. weiße Tr.	„	10/12	„ „	5.—	—

ROSA, siehe Wildrosen unter „Parkrosen“**ROSMARINUS** — Rosmarin — *Labiatae*

<i>pseudoacacia</i> L. Falsche Akazie	Hochst.	8/10	cm Umfg.	4.—	—
B. aromatisch, Bl. violettblau,					

RUBUS — Brombeere, Himbeere — *Rosaceae*

<i>bambusarum</i> Focke I	m. Tb.	30—40	cm hoch	2.50	—
Klettert, B. dreiteilig, unten weißfilzig, Fr. schwarz					

RUBUS (Fortsetzung):

		1 St. DM	100 St. DM
<i>deliciosus</i> Torr.	80—120 cm hoch	2.—	
Rottriebzig, Bl. reinweiß, wildrosenartig			
<i>girdaldianus</i> Focke	100—120 „ „	1.50	—
Triebe weiß, B. schön federig, Fr. schwarz			
<i>henryi</i> Hemsl I	m. B. 60—80 „ „	2.50	—
Klettert, hakig bestachelt, B. unregelmäßig			
— <i>bambusarum</i> , siehe R. <i>bambusarum</i>			
<i>iasiostylus</i> Focke	150—200 „ „	1.50	—
Weiß bereift, Fr. groß, graurot			
SALIX — Weide — Salicaceae B			
<i>alba casteriana</i> Hort. Angl.	Sträucher	—60	50.—
Coopers rote Weide aus England, Silberweide			
— <i>sericea</i> Gaud. (S. <i>alba regalis</i> Hort.)	„ „	—60	50.—
Dicht silbrige Belaubung			
— <i>vitellina aurea</i> Hort. Dotterweide	„ „	—60	50.—
Holz gelbrot. Gute Bindeweide			
— <i>britzensis</i> Spæth.	„ „	—60	50.—
Holz leuchtend rotgélb, Winterzierde			
<i>aurita</i> L. Graue Werftweide	„ „	1.50	—
Strauchartig bleibend, für sumpfige Stellen			
<i>caesia</i> nana Vill. Hechtblaue Alpenweide Δ	40—60 cm breit	1.—	80.—
Zweige gelbbraun, Bl. bläulichgrün			
<i>caprea</i> mas L. Salweide, 1jähr. Veredlg.,	100—125 cm hoch	2.—	160.—
Prachtvoller Kätzchenträger			
— <i>X purpurea</i> Hort. Kätzchenweide	Sträucher	1.—	—80
Sehr üppig, reichblühend			
<i>chrysostela</i> Dode Gold-Säulen-Weide	„ „	—60	50.—
Pyramidal, Zweige gelb			
<i>cinerea</i> L. Aschweide	„ „	—60	50.—
Holz graugrün, Bl. dick, ähnlich S. <i>caprea</i>			
<i>coccinea</i> Hort. Feuerweide	„ „	—60	—
B. leicht wellig, unterseits blaugrau			
<i>cotinifolia</i> Sm.	„ „	—60	50.—
Form der Negerweide, B. kreisrund			
<i>daphnoides</i> , siehe <i>pulchra</i>			
— <i>pomeranica</i> mas Hort.	„ „	—75	60.—
Form der Reifweide, B. schmal, gute Kätzchenweide			
— <i>praecox</i> Hort. Hesse	„ „	—75	—
Frühe Kätzchenweide, reichblühend			
<i>fragilis sphaerica</i> Kuph. Kugelweide	„ „	—75	60.—
Baltische Form, Wuchs dicht kugelig			
<i>grahami</i> Borr. Δ	m. B. 20—30 cm hoch	1.50	—
Holz dunkel, B. breitoval, glänzend			
<i>hankensoni</i> Dode Kätzchenweide	Sträucher	—60	50.—
B. sehr lang geschwänzt, unten blaugrau			
<i>irrorata</i> Anders. Kätzchenweide	„ „	—75	60.—
Stark bereift, Kätzchen hellbraun			
<i>laurifolia</i> , siehe S. <i>pentandra</i>			
<i>lucida</i> Muehlenb. Kätzchenweide	„ „	—60	50.—
Zweige gelbbraun, Kätzchen goldgelb			
<i>macrolepis</i> Larxch. Kätzchenweide	„ „	—75	60.—
Starkwüchsig, B. glänzend, Kätzchen groß, grau			
<i>medemi</i> Boiss. Orientalische Salweide	„ „	—75	60.—
Trieb filzig, Kätzchen dick, silbrig, früh			
<i>muscina</i> Dode, Persische W., Kätzchenweide	„ „	—75	60.—
Dichte Kätzchen, mittelgroß, silbergrau			
<i>mysinifolia</i> Salisb.	„ „	—75	—
Zweige gelblich oder rotbraun, B. unten blaugrün			

SALIX (Fortsetzung):

		1 St. DM	100 St. DM
<i>pentandra</i> L. (<i>S. laurifolia</i> Wsm.) Lorbeerweide	Sträucher	—,75	—
B. stark glänzend, Kätzchen goldgelb			
<i>pontederana</i> Willd.		—,75	60.—
B. seidig, Nebenblätter groß, Kätzchen schmal, rötlich	"		
<i>pulchra</i> W. & K. (<i>S. daphnoides</i> Vill.) Blutweide	"	—,75	60.—
Wuchs üppig, Holz glänzend rot			
— <i>ruberrima</i> Hort. Kätzchenweide	"	—,75	60.—
Holz sehr glänzend rot, Kätzchen groß, schön gerötet			
<i>purpurea nana</i> Hort. Δ * 30—50 cm hoch und breit		—,75	60.—
Strauch niedrig, dünntriebig, rotbraun			
<i>repens</i> (typica) L. Kriechweide Δ 30—50 cm hoch		—,75	—
Niedriger Strauch, B. blaugrün			
— <i>nitida</i> Wender (<i>S. rep. sericea</i> Gaud.) 40—60 " "		—,75	—
Form mit seidig-silbrig behaartem Laub			
<i>salviaefolia</i> Link. (<i>S. seringana</i> Gaud.)	Sträucher	—,75	—
B. filzig, violettblau schimmernd			
<i>schraderiana</i> Willd.	"	—,60	—
Buschig, Zweige olivgrün			
<i>simulatrix</i> B. White Kriechweide Δ m. B. 20—30 cm hoch		1.50	—
Wuchs kriechend, kleinlaubig			
<i>smithiana</i> Willd.	Sträucher	—,60	50.—
Langtriebige Kätzchenweide, K. silbrig			
SALSOLA , siehe <i>Suaeda</i>			
SAMBUCUS — Holunder — <i>Caprifoliaceae</i>			
<i>canadensis</i> L. * 80—100 cm hoch		—,60	—
Bl. in weißen, flachen Scheindolden, Fr. schwarz			
<i>ebulus</i> L. Zwergholunder Δ	Staupe	—,60	50.—
Kriechend, Bl. rötlichweiß D			
<i>nigra aurea</i> Sweet		—,75	—
B. goldgelb, mit roten Stielen			
— <i>latifecta</i> Hesse 60—80 cm hoch		—,75	—
Starkwüchsig, grobgeschlitzt, glänzend dunkelgrün			
— <i>nana tricolor</i> Hesse Δ 20—30 " "		1.—	—
Wuchs zwergig, B. weiß bestäubt			
SARCOCocca — Schleimbeere — <i>Buxaceae</i>			
<i>hookeriana humilis</i> Rehd. & Wils. m. B. 20—30 " "		2.—	150.—
B. hellgrün, Bl. weißlich, stark nach Honig duftend			
SAROTHAMNUS , siehe <i>Cytisus scoparius</i> und Formen			
SASA , siehe <i>Arundinaria</i> unter „Stauden- Ziergräser“			
SENECIO — Kreuzkraut — <i>Compositae</i>			
<i>greyi</i> Hook. I Δ m. Tb. 15—20 " "		2.—	—
Weißfilzig, Bl. satt orange gelb			
SHEPHERDIA — Büffelbeere — <i>Elaeagnaceae</i>			
<i>argentea</i> Nutt. m. B. 80—100 " "		2.50	—
Sparrig, dornig, B. silberig, Bl. gelblich			
<i>canadensis</i> Nutt. 70—100 " "		2.50	—
Triebe rotbraun, B. dunkelgrün, Bl. gelblich			
SIBIRAEA — Blauspiere — <i>Rosaceae</i>			
<i>laevigata</i> Maxim. m. B. 40—50 " "		2.—	—
B. bläulichgrün, ganzrandig, Bl. weiß in Rispen			
SKIMMIA — Skimmie — <i>Rutaceae</i>			
<i>foremani rogersi</i> Rehd. m. Tb. 20—30 " "		3.—	—
B. tiefgrün, lanzettlich m. B. 40—60 " "		4.—	—
<i>japonica vcitchi</i> Rehd. " 40—50 " "		4.—	—
B. groß, sattgrün, Rand gelb			
<i>recvesiana rubella</i> Rehd. 30—40 " "		3.—	—
Männliche Form, schön rote Bl.-Knospen			

			1 St. DM	100 St. DM
SOPHORA — Schnurbaum — Leguminosae				
<i>japonica</i> L. Japanische Sophore	100—120 cm hoch		1.50	—
B. stumpfgrün, lederig, Bl. gelbweiße Rispen				
SORBARONIA — Sorbus X Aronia — Rosaceae B				
<i>dippeli compacta</i> Hort.	180—200 cm Sth. Höchst 8/10 cm Umfg.		5.—	—
Wuchs dicht, kreisrund, schwachwüchsig				
SORBUS — Vogelbeere, Mehlbeere — Rosaceae B				
<i>aria chrysophylla</i> Hesse	Hochst. 8/10	„ „	5.—	—
B. leuchtend goldgelb, weißwollig	12/14	„ „	7.50	—
— <i>lutescens</i> Hartw.	10/12	„ „	6.25	—
Wuchs pyramidal, Austrieb gelb	12/14	„ „	7.50	—
— <i>magnifica</i> Hesse	10/12	„ „	6.25	—
B. groß, schwarzgrün, unten weiß,	12/14	„ „	7.50	—
lange haftend				
— <i>vestita</i> Hort.	12/14	„ „	7.50	—
Triebe schneeweiß filzig, Fr. rötlich				
<i>aucuparia</i> L. Gemeine Eberesche	Heister 200—250 cm hoch		2.—	150.—
B. gefiedert, Bl. weiß,	Hochst. 6/8 cm Umfg.		3.—	250.—
Fr. scharlachrot. Bewährter	8/10	„ „	4.—	300.—
Straßen- und Alleebaum	10/12	„ „	5.—	400.—
— <i>dirkensi aurca</i> Hort	180—200 cm Sth. „ 6/8	„ „	4.—	—
Austrieb goldig, B. weißhaarig, gelbgrün				
— <i>moravica</i> Zengerl.	180—200 „ „ „ 7/8	„ „	4.—	—
(S. auc. edulis Diek.)	180—200 „ „ „ 8/10	„ „	5.—	—
Essbare Eberesche	180—200 „ „ „ 10/12	„ „	6.50	—
Auch für schlechte Böden	150—180 „ „ „ Mittelst. 8/10	„ „	4.50	—
<i>intermedia</i> Pers. (S. scandica Fries.)	Hochst. 8/10	„ „	5.—	—
B. ungefiedert. Guter Straßenbaum	10/12	„ „	6.25	—
<i>lanata</i> K. Koch	180—200 cm Sth. „ 8/10	„ „	5.—	—
B. scharfgesägt, grauwoilig				
<i>sambucifolia</i> Roem.	250—300 cm hoch		2.50	—
Dickzweigig, Bl. und Fr. größer als	Hochst. 6/8 cm Umfg.		4.—	—
S. aucuparia	8/10	„ „	5.—	—
<i>scandica</i> , siehe S. <i>intermedia</i>				
<i>serotina</i> Koehne	180—200 cm Sth. „ 6/8	„ „	4.—	—
Wuchs kräftig, Fr. korallenrot *				
<i>torminalis</i> Crantz. Elzbeere	„ 6/8	„ „	4.—	—
B. gelappt, Bl. weiße Dolden, Fr. lederbraun	„ 10/12	„ „	6.25	—
SPARTIUM — Besenpfrimen — Leguminosae				
<i>juncum</i> L.	m. Tb		1.50	—
Binsenartig, rundholzige, Bl. goldgelb, ähnlich Besenginster				
SPIRAEA — Spierstrauch — Rosaceae				
<i>albiflora</i> Miqu. (Sp. <i>callosa alba</i> Hort.) H			—75	60.—
Bl. weiß, flach, für niedrige Hecken				
<i>arcuata</i> Hook. f.			—75	60.—
Wuchs bogig, Bl. weiß, flache Dolden				
<i>arguta</i> Zbl. H	50—70 cm hoch		1.—	80.—
B. zierlich, hellgrün, Bl. schneeweiß, früh				
<i>bullata</i> Maxim. (Sp. <i>crispifolia</i> Hort.) H Δ	20—40 „ „		—75	60.—
Wuchs niedrig, dicht, rauhbliättrig, kraus				
Bl. karmin, zu Einfassungen				
<i>bumalda</i> Burvenich	40—50 „ „		—75	—
Niedrig, Bl. karminrosa				
— <i>Anthony Waterer</i> Hort.	30—40 „ „		—75	60.—
Wuchs dicht, B. teils weißbunt, Bl. dunkelkarmin				

SPIRAEA (Fortsetzung):

				1 St. DM	100 St. DM
<i>bumalda crispa</i> Hesse	30—40	cm hoch	—	.75	60.—
Dicht, B. teils weiß- und rosabunt, kraus, Bl. karmin					
— <i>freobeli</i> Rehd.	60—80	" "	—	.75	—
Austrieb braunrot, Bl. dunkelpurpurn					
— <i>glabra</i> Zbl.	80—100	" "	—	.75	—
B. hellgrün, Bl. rosa					
<i>callosa alba</i> , siehe <i>Sp. albiflora</i>					
<i>cana</i> Waldst. & Kit. Δ	30—40	" "	—	.75	—
B. grau, Bl. weiß					
<i>cana X thunbergi</i> Hort.	30—40	" "	—	.75	—
B. schmal, Bl. reinweiß					
<i>chamaedryfolia</i> L.	40—60	" "	—	.60	—
Überhängend, Bl. weiß					
<i>cinerea</i> Zbl.	40—60	" "	—	.75	—
Zweige zimtbraunfilzig, Bl. reinweiß					
<i>crispifolia</i> , siehe <i>Sp. bullata</i>					
<i>decumbens</i> W. Koch Δ	m. B. 20—30	" "	1.50	—	—
B. klein, frischgrün, Bl. weiß, doldig					
<i>douglasi</i> Hook.	60—80	" "	—	.60	—
B. unten weißfilzig, Bl. purpurrosa Rispen					
<i>grossulariaefolia vera</i> Hort. Δ	m. B. 20—30	" "	1.—	—	—
B. an <i>Ribes</i> erinnernd, Bl. schneeweiß					
<i>japonica macrophylla</i> Zbl. *			—	.60	—
Austrieb rot, Bl. karminrot					
<i>macrothyrsa</i> Dipp. (<i>Sp. menziesi</i> macr. Zbl.)	100—120	" "	—	.60	—
Bl. hellrot in dichten Blütenständen					
<i>media mollis</i> CS. (<i>Sp. mollis</i> Koch.)	30—40	" "	—	.75	—
B. grauwoilig, Bl. reinweiß, kleine Dolden					
<i>menziesi billiardi</i> Bill.	100—120	" "	—	.60	—
Bl. rosa, schmale Blütenrispen					
— <i>macrothyrsa</i> , siehe <i>Sp. macrothyrsa</i>					
— <i>triumphans</i> Hort.	80—100	" "	—	.60	—
B. im Aufblühen lebhaft purpurrosa					
<i>mollis</i> , siehe <i>Sp. media mollis</i>					
<i>notha superlatifolia</i>	100—120	" "	—	.60	—
Bl. weiß in eiförmigen Rispen					
<i>prunifolia plena</i> CS.	80—100	" "	1.50	120.—	—
Bl. groß, weißgefüllt, auch für Treiberei					
<i>pumilionum</i> Zbl. Δ	m. Tb.		1.50	—	—
Niedrig, B. dunkel, Bl. weiß, reichblühend					
<i>sanssouciana</i> K. Koch.	60—80	" "	—	.75	—
Zweige feinfilzig, B. länglich, Bl. rosa Rispen					
<i>sargentiana</i> Rehd.	30—40	" "	1.—	—	—
Trieb flaumhaarig, Bl. gelblichweiß, dichte Dolden					
<i>syringæiflora</i> Lem. Δ	40—60	" "	—	.75	—
Niedrig, B. länglich, Bl. rosa Rispen					
<i>thunbergi</i> Sieb.	40—50	" "	1.—	—	—
Dicht, B. lanzettlich, Bl. reinweiß vor dem Laub					
<i>vanhouttei</i> Briot H *	70—100	" "	—	.75	60.—
Dichtzweigig, Bl. schneeweiß					
<i>velutell</i> Hemsl.	60—80	" "	1.50	—	—
Überhängend, Bl. weiß in dichten Dolden					

STACHYURUS — Schweifähre — Stachyuraceae

<i>praecox gracilis</i> Hort.	100—120	" "	2.—	—
Zweige rotbraun, Bl. gelb, glockig, traubig, vor dem Laub				

		1 St. DM	100 St. DM
STEPHANANDRA — Kranzspiere — <i>Rosaceae</i> Δ *			
<i>incisa</i> Zbl. (St. flexuosa S & Z)	40—60 cm hoch	— .75	60.—
Feintriebzig, überhängend, Bl. weiß			
<i>tanakae</i> Franch & Sav.	60—80 „ „	— .75	—
Wuchs kräftig, Bl. weiß in größeren Trauben			
STRANVAESIA — <i>Rosaceae</i> I B. *			
<i> davidiana</i> Dcne.	m. B. 40—60. „ „	3.—	—
Dicht buschig, B. lanzettlich, Bl. weiß, Fr. korallenrot			
— <i>undulata</i> Rehd & Wils. Δ	m. B. 20—30 „ „	3.—	—
Niedrig bleibend, B. gewellt, Bl. weiß, Fr. korallenrot			
SUAEDA — Kelchmelde — <i>Chenopodiaceae</i>			
<i>fruticosa</i> Forsk. (Salsola fr. L.) I	m. Tb. 40—50 „ „	1.50	—
Salzstrauch, B. fleischig, blaugraugrün, Bl. grünlich			
SYMPHORICARPUS — Schneebeere — <i>Caprifoliaceae</i>			
<i>albus</i> Blake. (S. racemosus Michx.) B *		— .60	50.—
B. rundlich, Bl. glockig, rötlichweiß, Fr. weiß, Unterholz			
— <i>laevigatus</i> Blake. B *		— .75	—
Fr. besonders reich, weiß, in schweren Trauben			
<i>chenaulti</i> Rehd. B H		— .75	—
B. klein, hellgrün, Bl. u. Fr. wenig auffallend			
<i>giraldi</i> Hesse II		— .75	—
Wuchs kräftig, B. flaumig behaart, Austrieb rot			
<i>orbiculatus</i> Moench. (S. parviflorus Desf.) II		60.—	50.—
Buschig, B. lebhaft grün, Bl. weiß-rötlich, Fr. klein dkirot			
— <i>variegatus</i> CS		— .75	—
B. goldgelb gerandet und geadert			
<i>parviflorus</i> , siehe S. orbiculatus			
<i>racemosus</i> , siehe S. albus			
SYMPLOCOS — Rechenblume, Saphirbeere — <i>Symplocaceae</i>			
<i>paniculata</i> Wall. (S. crataegoides)	m. B. 100—125 cm hoch	2.—	—
B. stumpfgrün, runzlich, Bl. weiß, myrtenähnlich,			
Fr. saphirblau *			
SYRINGA — Flieder — <i>Oleaceae</i>			
<i>amurensis</i> Rupr. (Ligustrina am. Reg.)	m. B. 80—100 cm hoch	1.50	—
B. glänzend frischgrün, unten bläulich,			
Bl. milchweiß in großen Sträußen			
<i>chinesis</i> Willd. (S. rothomagensis de Launey)	40—60 „ „	2.—	160.—
Locker, Bl. hellviolett in lockeren Rispen D			
<i>emodi</i> Wall.	80—100 „ „	1.50	—
Dicht, B. groß, Bl. lilaweiß			
	200—250 „ „	2.50	—
<i>julianae</i> CS.	m. B. 40—60 „ „	1.50	—
Breitbuschig, B. spitz, Bl. lilaweinrot D			
<i>meyeri</i> CS.	40—60 „ „	1.50	—
Dicht, Bl. tief lilapurpurn, schlankröhrig			
<i>microphylla</i> Diels.	m. B. 50—70 „ „	1.50	—
Locker, B. klein, Bl. helllila			
<i>pallbiniana</i> Nakai	50—80 „ „	1.50	—
Dünnzweigig, B. breit, Bl. helllila bis weiß D			
<i>pekinensis</i> Rupr. (Ligustrina pek. Rgl.)	m. B. 60—80 „ „	1.50	—
Leicht überhängend, B. schmal, Bl. weiß, klein			
<i>persica</i> L. Persischer Flieder	m. B. 30—40 „ „	2.—	—
Sparrig, B. fein, Bl. rosa, zierlich			
— <i>alba</i> West.	30—40 „ „	2.—	—
Bl. weiß, sonst wie die Art			

			1 St. DM	100 St. DM
SYRINGA (Fortsetzung):				
<i>pinnatifolia</i> Hemsl.	m. B.	40—60 cm hoch	1.50	—
B. gefiedert, tiefgrün, Bl. weißlichrosa				
<i>rothomagensis</i> , siehe <i>S. chinensis</i>				
<i>swegiflexa</i> Hesse		125—150 „ „	2.—	—
B. groß, Bl. zartrosa, Knospen dunkelweinrot, sehr große Blütenstände				
<i>vulgaris</i> — Hybriden D	Büsche	mir 3/5 Trieben	2.50	—
Freilandsträucher in bewährten einfach und gefüllt blühenden Namensorten				
TAMARIX — Tamariske — <i>Tamaricaceae</i>				
<i>africana</i> , siehe <i>T. tetrandra</i>				
<i>germanica</i> , siehe <i>Myricaria germanica</i>				
<i>hispida aestivalls</i> Hort. (<i>T. pentandra</i> Pall.)	60—80	cm hoch	1.—	—
Zweige purpurrot, B. bläulichgrün, Bl. lebhaft rosa				
<i>tetrandra</i> Pall. (<i>T. africana</i> Hort.)	60—80	„ „	— .75	—
Raschwüchsig, überhängend, B. schuppig, lebhaftgrün, Bl. hellrosa				
TEUCRIUM , siehe unter „Stauden“				
TILIA — Linde — <i>Tiliaceae</i> B D				
<i>americana nova</i> Hort. (<i>T. megalodonta</i> Hort. Holl.)				
Pyramidal, B. groß, lange haftend.	Hochst.	8/10 cm Umgf.	6.25	500.—
Widerstandsfähig gegen Ungeziefer	„	10/12 „ „	7.50	600.—
Schon als junger Baum sehr blühwillig.	„	12/14 „ „	9.25	750.—
Von Bienen stark befliegen	„	14/16 „ „	12.50	1000.—
	„	16/18 „ „	15.50	1250.—
	„	18/20 „ „	18.—	1500.—
	„	20/25 „ „	22.50	1800.—
	„	25/30 „ „	25.—	—
<i>argentea</i> , siehe <i>T. tomentosa</i> und Formen				
<i>argentea petiolaris</i> , siehe <i>T. petiolaris</i>				
<i>cordata</i> Mill. (<i>T. parvifolia</i> Ehrh.) H	125—150	cm hoch	2.—	150.—
Stein- oder Winterlinde	150—200	„ „	2.50	—
B. klein, als Laubenlinden	Hochst.	8/10 cm Umgf.	6.25	500.—
beliebt	„	10/12 „ „	7.50	600.—
	„	12/14 „ „	9.25	750.—
	„	16/18 „ „	15.50	—
	„	25/30 „ „	25.—	—
<i>euchlora</i> K. Koch. Krimlinde	„	14/16 „ „	12.50	1000.—
Rundkronig, B. lange haftend,	„	16/18 „ „	15.50	1250.—
Bl. sehr zahlreich	„	20/25 „ „	22.50	1800.—
<i>grandifolia</i> , siehe <i>T. platyphyllos</i>				
<i>intermedia</i> DC. (<i>T. vulgaris</i> Hayne, <i>T. hollandica</i> Hort.)				
Echte holländische Linde,	Hochst.	8/10 cm hoch	6.25	—
Wuchs breitpyramidal	„	10/12 „ „	7.50	—
	„	12/14 „ „	9.25	—
	„	14/16 „ „	12.50	—
	„	16/18 „ „	15.50	—
<i>megalodonta</i> , siehe <i>T. americana nova</i>				
<i>parvifolia</i> , siehe <i>T. cordata</i>				
<i>petiolaris</i> Hook. f. (<i>T. argentea petiolaris</i> Hort.)				
Zweige überhängend, B. oben	Hochst.	14/16 „ „	12.50	—
dunkelgrün, unten weißfälgig				

					1 Stck. DM	100 Stck. DM
TILIA (Fortsetzung):						
platyphyllos Scop. (T. grandifolia Ehrh.)						
Sommerlinde, Austrieb	Hochst.	8/10	cm	Umfg.	5.—	400.—
gelblichgrün, Krone breiteiförmig,	"	10/12	"	"	6.25	500.—
für feuchte Lagen	"	12/14	"	"	7.50	—
	"	14/16	"	"	9.25	—
	"	16/18	"	"	12.50	—
— aurea Kirchn.		200—250	cm	hoch	3.—	—
Goldzweigig auch im Winter						
— corallina (Hartw. & Rucmpl.) (T. plat. rubra Rehd.)						
Junge Zweige schön gerötet	Hochst.	10/12	cm	Umfg.	7.50	—
	"	12/14	"	"	9.25	—
	"	16/18	"	"	15.50	—
tomentosa Moench. (T. argentea DC.)	"	10/12	cm	Umfg.	7.50	—
Echte Silberlinde,	"	12/14	"	"	9.25	750.—
dicht breitpyramidal	"	14/16	"	"	12.50	1000.—
B. unterseits weißfilzig	"	18/20	"	"	18.—	—
	"	20/25	"	"	22.50	—
— erecta Hort. (T. argentea erecta Hort.)	"	10/12	"	"	7.50	—
Aufrechwachsende Form der	"	12/14	"	"	9.25	750.—
Silberlinde	"	14/16	"	"	12.50	1000.—
	"	16/18	"	"	15.50	1250.—
	"	20/25	"	"	22.50	—
vulgaris , siehe T. intermedia						
ULMUS — Ulme, Rüster — Ulmaceae						
foliacea wredei Rehd. (U. campestris dampieri wredei Hort.)						
Säulen-Goldulme	Hochst.	10/12	cm	Umfg.	6.25	—
B. lebhaft goldgelb						
hollandica Mill. (U. latifolia Hort.)	"	8/10	"	"	5.—	—
Bekannter holländischer Straßenbaum						
— dumonti Rehd. Belgische Ulme	"	8/10	"	"	5.—	—
Stark pyramidale Krone	"	10/12	"	"	6.25	—
	"	12/14	"	"	7.50	—
VACCINIUM — Ericaceae						
corymbosum L. ✱	m. B.	60—80	cm	hoch	3.—	—
B. hellgrün, Bl. weiß bis rosa, Fr. blauschwarz						
— hybr. Blau-Weiß „Goldtraube“	m. B.	50—70	"	"	4.—	—
Garten-Heidelbeere, für stark	"	80—100	"	"	5.—	—
moorigen Boden ✱						
macrocarpum Ait. Moosbeere Δ ✱ I B	"				1.—	—
Niederliegend, Fr. weißlich bis scharlachrot						
myrtillos L. Heidelbeere Δ ✱	m. B.				1.50	—
B. klein, hellgrün, Bl. weiß, Fr. blau bereift						
vitis-idaea L. Preiselbeere ✱ Δ I	m. B.				1.—	—
B. klein dunkelgrün, Bl. weiß bis rosa, Fr. rötlich-fleischfarben						
VERONICA (Hebe) — Ehrenpreis — Scrophulariaceae Δ I						
armstrongi K. Kirk, B. goldbraun, Bl. weiß	m. Tb.				1.—	—
balfouriana Hook. f., B. rotbraun, Bl. blau	"				1.—	—
buchanani Hort., B. blaugrau	"				1.—	80.—
carnosula Hook. f., B. grob, dick, bläulich, Bl. weiß	"				1.—	—
cupressoides Hook. f., B. zypressenartig, Bl. hellblau	"				1.—	—
glauco-coerulea Hort., B. blaugrau, Bl. wasserblau	"				1.—	—
pinguifolia Hook. f., B. dick, blaugrün, Bl. weiß	"				1.—	—
wilcoxi Hort., B. rund, grün	"				1.—	—

			1 St. DM	100 St. DM
VIBURNUM — Schneeball — Caprifoliaceae				
americanum Mill.	100—125 cm hoch		1.—	—
Ähnlich <i>V. opulus</i> , Austrieb rot, Bl. weiß				
Fr. dunkelrot				
betulaefolium Batal	m. B. 100—120	„ „	2.—	—
B. dunkelgrün, Bl. weiß in Scheindolden,				
Fr. rot				
buddleiifolium C. H. Wright.	m. B. 50—80	„ „	3.—	250.—
B. lanzettlich, Bl. weiß				
burkwoodi Burk. & Skipw. I	„ 40—60	„ „	3.—	250.—
<i>V. utile</i> X <i>carlesi</i> , B. zwischen beiden				
Arten stehend, Bl. ähnlich <i>V. carlesi</i>				
carlesi Hemsl. D	„ 30—40	„ „	3.—	—
Schwachwüchsig, für Halbschatten,				
B. graugrün, B. weiß in breiter Dolde				
cassnoides L.	40—60	„ „	2.—	—
B. dicklich, dunkelgrün, Bl. weiß, Fr. weiß,				
rosa und schwarz bei Vollreife				
davidi Franch. I	m. B. 20—30	„ „	3.—	—
Dünntriebig, B. lederig, groß,				
Bl. weiß in breiten Büscheln				
dentatum L.	60—80	„ „	1.—	—
B. hellgrün, Bl. weiß, Fr. schwarzblau				
foetidum rectangulum Rehd. I	m. B. 30—40	„ „	3.—	—
B. länglich, Bl. weißlich, Fr. rot				
henryi Hemsl. I	„ 30—40	„ „	2.—	—
B. lanzettförmig, Mittelrippe gelb,				
Bl. weiß, Fr. korallenrot bis schwarz				
hessei , <i>V. wrighti hessei</i>				
hupehense Rehd.	„ 40—60	„ „	2.—	—
Zweige dunkelpurpurn, B. kreisförmig				
oval, Bl. weiß, Fr. dunkelrot				
ichangense Rehd.	m. B. 40—60	„ „	2.—	—
Schlankzweigig, B. dünn, Bl. gelbweiß				
lantana L.	60—80	„ „	—75	60.—
Dichtbuschig, B. groß, graugrün, runzlich				
Bl. weiß, Fr. korallenrot bis schwarzrot				
lentago L. *	80—100	„ „	1.—	80.—
B. glänzend gelbgrün, Bl. rahmweiß,				
Fr. blauschwarz				
lobophyllum Graebn.	m. B. 50—80	„ „	2.—	—
B. breit, eiförmig, gelbgrün,				
Bl. weiß, Fr. hellrot				
macrocephalum sterile Dipp.	„ 30—40	„ „	5.—	—
B. groß, Bl. gelblichweiß, große Bälle				
molle Michx.	„ 40—60	„ „	3.—	—
B. breitherzförmig, Bl. cremeweiß,				
Fr. blauschwarz				
opulus L. Gemeiner Schneeball	50—70	„ „	—75	60.—
B. drei- bis fünfflappig, Bl.				
gelblichweiß, Fr. korallenrot				
— edule Hort.	60—80	„ „	1.—	—
Fr. essbar, groß, scharlachrot				
— nanum Jaqu. Δ	m. B. 20—30	„ „	1.—	—
Wuchs niedrig				
— sterile DC. (<i>V. op. roseum</i> L.)	40—60	„ „	1.25	—
Bekannter Schneeball, Bl. in ballartigen				
weiß bis rosa Blütenständen				

VIBURNUM (Fortsetzung):

			1 St. DM.	100 St. DM.
plicatum siehe <i>V. tomentosum</i>				
prunifolium L. *	50—80	cm hoch	2.—	—
B. breitelliptisch, dunkelgrün				
pubescens Pursh. (<i>V. venosum</i> Brit.)	60—80	" "	1.—	—
B. unterseits weichbehaart, Bl. weiß, Fr. schwarzpurpurn				
— canbyi Blake (<i>V. venosum canbyi</i> Rehd.)	80—100	" "	1.—	—
B. groß, frischgrün, Bl. weiß, groß				
— longifolium Blake	60—80	" "	1.—	—
B. länglich-lanzettlich ausgezogen				
rytidophyllum Hemsl. I	m. B. 40—60	" "	3.50	280.—
B. breitlanzettlich, groß, runzlich,	" 60—80	" "	5.—	—
Bl. gelblichweiß, Fr. rotbraun bis	" 100—125	" "	8.—	—
schwarzglänzend Solitär	" 175—200	" "	30.—	—
theiferum Rehd.	" 40—60	" "	2.—	—
Zweige hellgraubraun, Bl. weiß ohne Randblüten, Fr. rot				
tomentosum Thunb. (<i>V. plicatum</i> Miqu.)	80—100	" "	1.—	—
B. eiförmig, filzig, Bl. mit wenigen Randblüten, Fr. korallenrot bis blauschwarz				
— sterile grandiflorum Hort.	m. B. 50—70	" "	4.—	—
gelbgrün, Riesen-Schneebälle, früh				
utile Hemsl. I	" 40—60	" "	4.50	—
Wuchs locker, B. lackglänzend dunkelgrün, Bl. weiß, Fr. blauschwarz				
venosum canbyi , siehe <i>V. pubescens canbyi</i>				
wilsoni Rehd.	m. B. 40—60	" "	2.50	—
B. behaart, Trugdolde gelblich-filzig				
wrighti hessei Rehd. (<i>V. hessei</i> Koehne)	m. B. 30—50	" "	2.50	—
B. groß, fast ganzrandig, Bl. reinweiß, Fr. korallenrot				
WEIGELA , siehe <i>Diervillea</i>				
XOLISMA — <i>Ericaceae</i>				
lucida Rehd. (<i>Andromeda lucida</i> Lam.) I	" 40—60	" "	4.—	—
Zweige scharfkantig, B. breit, Bl. weiß bis rosa				
YUCCA , siehe unter „Stauden“				
ZANTHOXYLUM (<i>Xanthoxylum</i>) — <i>Gelbholz</i> — <i>Rutaceae</i>				
giraldi Hort. Hesse	m. B. 200—250	cm hoch	3.—	—
Triebe stark, bestachelt, B. engfiedrig, dunkelgrün, unten grausilbrig glänzend				
ZANTHORRHIZA (<i>Xanthorrhiza</i>) — <i>Ranunculaceae</i>				
apilfolia L.-Hérit. *	" 60—80	cm hoch	1.50	—
Ausläufer bildend, B. gefiedert, Bl. rotbraun				
ZENOBIA (<i>Andromeda</i>) — <i>Ericaceae</i>				
pulverulenta Pollard (<i>Andromeda speciosa pulverulenta</i> Michx.)				
B. blauweiß bereift, Bl. weiße	m. B. 40—60	cm hoch	4.—	—
Glocken in überhängenden Rispen				

Bitte geben Sie dieses Verzeichnis weiter, falls Sie keine Verwertung dafür haben und geben Sie mir Anschriften von Interessenten, an die ich gerne ein Verzeichnis sende.

Für Ihre freundliche Mühe herzlichen Dank!

Junge Heckenpflanzen

Heckenpflanzen-Fertigware siehe unter „Laubhölzer“ u. „Nadelhölzer“ bei den einzelnen Gattungen.

						100 Stck. DM	1000 Stck. DM
BERBERIS, Berberitze							
thunbergi		ca. 20—40 cm hoch	2jähr. v. S.			15.—	140.—
— atripurpurea		ca. 40—60 „ „	3 „ „			13.50	120.—
vulgaris atripurpurea		ca. 20—40 „ „	2 „ „			9.—	80.—
— atripurpurea		ca. 30—60 „ „	3 „ „			12.—	100.—
CHAENOMELES, Scheinquitte							
japonica (Cyd. maulei)		ca. 30—60 „ „	2 „ „			12.50	110.—
lagenaria (Cyd. jap.)		ca. 30—60 „ „	1 „ Säml.			6.—	45.—
CORNUS, Kornelkirsche							
mas		ca. 50—80 „ „	4 „ „			50.—	—
LIGUSTRUM, Rainweide							
lodense		ca. 15—25 „ „	1 „ bew. St.			9.—	75.—
vulgare ab 2 Tr.		ca. 30—60 „ „	2 „ „			12.—	100.—
„ ab 2 Tr.		ca. 50—80 „ „	2 „ „			15.—	140.—
„ 4/6 Tr.		ca. 50—80 „ „	3 „ v. St.			25.—	220.—
— atrivirens		ca. 20—40 „ „	1 „ bew. St.			11.50	100.—
— „ ab 2 Tr.		ca. 30—60 „ „	2 „ „			18.—	160.—
LONICERA, Heckenkirsche							
xylosteum		ca. 60—100 „ „	3 „ v. S.			20.—	180.—
RIBES, Stachelbeere							
alpinum		ca. 30—60 „ „	v. Abl.			25.—	220.—
— „Weber“		ca. 30—60 „ „	„			25.—	220.—
ROSA, Rose							
rubiginosa		ca. 40—60 „ „	2 „ v. S.			10.—	90.—
rugosa		ca. 30—50 „ „	2 „ „			20.—	180.—
— alba		ca. 30—50 „ „	2 „ „			20.—	180.—
SYMPHORICARPUS, Schneebeere							
albus (racemosus)		ca. 50—80 „ „	3 „ „			18.—	150.—
		ca. 60—100 „ „	4 „ Säml.			15.—	120.—

Freunde von RHODODENDRON und IMMERGRÜNEN
gehören in die

RHODODENDRON — GESELLSCHAFT

Sie erhalten dort Auskunft und Beratung in allen Fragen dieses Spezialgebiet betreffend.

Die Gesellschaft unterhält den sehenswerten Rhododendronpark in Bremen und gibt interessante Jahrbücher und Mitteilungen an die Mitglieder heraus.

Beitrittserklärungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen:

Rhododendron-Gesellschaft, (23) BREMEN-HORN, Marcus-Allee 60

Trauerbäume

Alle hierunter angebotenen Hängeformen der verschiedenen Laubhölzer sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen.

Die Verpackung geschieht unter Anwendung größter Sorgfalt von alteingearbeitetem Personal. Für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, haften jedoch nicht.

Hängesformen der Nadelhölzer siehe unter „Koniferen-Nadelhölzer“ bei den einzelnen Gattungen.

1 St. 100 St.
DM. DM.

BETULA — Birke

pendula youngi CS. Δ 200 cm Sth. Hochst. 6/8 cm Umfg.
B. zierlich, Zweige mähen- 1jährige Kronen m. B. 8.— —
artig, für Hausgarten, Alpinum und Friedhof

FAGUS — Buche

sylvatica horizontalis Hort. monac. Δ
Äste waagrecht abstehend, 180 cm Sth. Hochst. 14/16 cm Umfg.
schwachwachsend, fürs Alpinum m. B. 40.— —
— *pendula* Loud. Grüne Hängebuche m. B. 200 cm hoch 20.— —
Zweige lang herabhängend „ 250 „ „ 30.— —
Park-Solitär m. B. 100—120 cm Sth. Halbst. 8/10 cm Umfg. 25.— —
„ 100—120 „ „ „ 10/12 „ „ 30.— —
— *purpurea pendula nova* Hort. m. B. 60—80 cm hoch 7.50 —
Hänge- oder Trauer-Blutbuche „ 80—100 „ „ 10.— —
Rotblättrig, m. B. 40—60 cm Sth. Halbst. 8/10 cm Umfg. 15.— —
dicht belaubt „ 80—100 „ „ „ 8/10 „ „ 25.— —
„ 140 „ „ „ 14/16 „ „ 40.— —

MALUS — Apfel

pumila pendula Elise Rathke Hort
Hänge-Apfel 180—200 cm Sth. Hochst. 6/8 cm Umfg. 5.— —
Bl. apfelblütenfarbig, Fr. gelbrot, dick, eßbar

PRUNUS — Pflaume, Kirsche

serrulata Shidare Sakura Koehne Halbst. 140—160 cm Sth. 5.— —
Hängekirsche 200—220 cm Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg. 6.25 —
Langzweigig, Bl. rosa, dichtgefüllt

SALIX — Weide

alba vitellina pendula nova Hort. . Hochst. 6/8 cm Umfg. 4.— —
Hänge-Trauer-Dotterweide
Zweige gelb, lang herabhängend, für Teichränder
elegantissima K. Koch Sträucher 1.— —
Breitkronig werdend, Zweige gelblich-bräunlich,
lang herabhängend

SORBUS — Eberesche

aucuparia pendula 180—200 cm Sth. Hochst. 6/8 cm Umfg. 5.— —
Hänge-Eberesche 180—200 „ „ „ 8/10 „ „ 6.25 —
Bl. weiß, in großen Dolden
Fr. rot, sehr zierend ✧

ULMUS — Ulme

glabra horizont. Hort. 200—220 „ „ „ 14/16 „ „ 12.50 —
Hänge-Ulme
Äste waagrecht abstehend, später überhängend

Schlingpflanzen

Sämtliche hierunter angebotenen Schling- und Kletterpflanzen sind einzeln regelrecht an Stäben gezogen.

		1 St. DM.	100 St. DM.
ACTINIDIA — Strahlengriffel — Dilleniaceae			
Kolomikta Maxim	Kolomiktawein m. B. 80—100 cm hoch	2.50	—
	B. breiteilänglich, auffallend silberweiß, und rosa gefärbt an der Spitze, Bl. weiß		
purpurea Rehd.	m. Tb. 20—30 „ „	2.50	—
	B. mattgrün, breitgezähnt, Bl. einzeln, weiß, Fr. purpurn, süß		
thunbergi giraldi Hort.	m. B. 80—100 „ „	2.50	—
	B. eilänglich, dunkelgrün, unterseits weißlich bereift, dick, Stiele violett und weiß bereift		
AMPELOPSIS — Jungfernwine — Vitaceae Siehe auch Parthenocissus			
aconitifolia Bge.	(A. dissecta Carr.) 100—150 cm hoch	1.—	80.—
	B. schön tief geschnitten, fünfteilig, Fr. erst bläulich, später orange		
odoratissima Hort.	Duftrebe D 100—150 „ „	1.50	—
	B. dünn, breitherzförmig, Bl. süß duftend, Fr. blau bereift		
APIOS, siehe unter „Stauden“			
ATRAGENE, siehe Clematis alpina unter „Stauden“			
CALYSTEGIA, siehe unter „Stauden“			
CELASTRUS — Baummörder — Celastraceae			
articulata Thunb.	(C. orbiculata Thbg.) 80—100 cm hoch	1.50	—
	B. eiförmig, frischgrün, Bl. achselständig, Fr. gelb und scharlachrot		
flagellaris Rupr.	m. B. 50—70 „ „	3.—	—
	Hakig-dornig, Fr. grüngelb, dick		
orbiculata, siehe C. articulata			
rosthorniana Loes.	80—100 „ „	3.—	—
	B. schmal, dick, gelbgrün, Bl. grünlich, Fr. orange gelb		
CLEMATIS — Waldrebe — Ranunculaceae			
alpina, siehe unter „Stauden“			
vitalba L.	80—100 cm hoch	1.50	—
	B. gefiedert, Bl. weiß, breit, in langen Rispen		
HEDERA — Efeu — Araliaceae			
colchica dentata Hibb.	m. B. 60—80 „ „	2.50	—
	B. groß, herzförmig mit klein. Zähnen „ 150—175 „ „	3.—	—
helix L.	30—40 „ „	1.25	—
	Bekannter Efeu, B. dunkelgrün, klein		
— conglomerata Nichols. Δ	10—20 „ „	2.—	—
	Zwergform, Triebe gestaucht, B. dicht und kraus		
— digitata Hort.	m. B. 60—80 „ „	2.—	—
	B. klein, fingerig gelappt „ 100—125 „ „	2.50	—
— hibernica Kirchn.	Schottische Efeu „ 40—60 „ „	2.—	—
	Großblättrige Form, sehr schön „ 100—125 „ „	2.50	200.—
JASMINUM, siehe unter „Laubhölzer“			
LATHYRUS, siehe unter „Stauden“			

			1 St. DM	100 St. DM
LONICERA — Geißblatt — Caprifoliaceae				
dioeca, siehe L. glauca				
<i>flexuosa aureo-reticulata</i> Dipp	40—60	„ „	1.50	—
B. klein, goldgelb genetzt	80—100	„ „	2.—	—
<i>glauca</i> Hill. (L. dioeca L.)	80—100	„ „	2.—	—
B. blauweiß, oft schalenförmig verwachsen,				
Bl. grünlichgelb, mit Rot				
<i>henryi</i> Hemsl. I	60—80	„ „	2.—	—
B. bronziert grün, länglichlanzettlich,				
Bl. gelbrot, Fr. bläulich bereift				
<i>trichopoda</i> Franch.	m. B. 100—120	„ „	2.—	—
Bl. langröhrig, grünl. gelb bis weißlich				
PARTHENOCISSUS — Wilder Wein — Vitaceae *				
<i>quinquefolia</i> Planch (Ampelopsis)	100—150	„ „	1.—	—
B. fünfteilig, sehr wüchsig				
— <i>engelmanni</i> Rehd. Selbstklimmer	100—150	„ „	1.50	120.—
B. fünfteilig, aber Ranken mit Haftseiben				
<i>tricuspidata gigantea</i> Hort. Selbstklimmer	60—80	„ „	1.—	80.—
B. groß, glänzend sattgrün				
— <i>Gloire de Boskoop</i> Hort. Selbstklimmer	60—80	„ „	1.—	80.—
B. besonders groß				
— <i>veitchi</i> Rehd. Selbstklimmer	60—80	„ „	1.—	80.—
B. kleinblättrig, Bl. gelbgrün, Fr. blauschwarz				
POLYGONUM — Knöterich — Polygonaceae				
<i>auberti</i> L. Rankknöterich	150—200	„ „	2.—	—
Sehr starkwüchsig, Bl. weiß in dichten Sträußen				
ROSA , siehe unter „Kletterrosen“				
RUBUS , siehe unter „Laubhölzer“				
SOLANUM , siehe unter „Stauden“				

GEHÖLZFREUNDE

gehören in die

„**DEUTSCHE DENDROLOGISCHE GESELLSCHAFT e. V.**“

Den Mitgliedern wird folgendes geboten:

Beratung in allen Gehölzangelegenheiten.

Teilnahme an der Jahrestagung mit mustergültig vorbereiteten

Studienfahrten in dendrologisch interessante Gebiete.

Wertvolle Jahresmitteilungen.

Anmeldungen sind zu richten an:

Deutsche Dendrologische Gesellschaft

(16) DARMSTADT, Botanischer Garten

Stauden

Winterharte, perennierende Freilandpflanzen

Man beachte, daß Stauden nicht zum ermäßigten Frachtsatz befördert werden wie die Gehölze, daß vielmehr zwischen Fracht- oder Eilgutbeförderung zu wählen ist. Sofern mir vom Besteller keine Vorschriften gemacht werden, handle ich jeweils nach eigenem, bestem Ermessen.

Alle von mir angebotenen Stauden entstammen meinen eigenen Kulturen und werden in besonders sorgfältig kultivierten, kräftigen Pflanzen entsprechend dem einzelnen Gattungs-, Art- und Sorten-Charakter geliefert.

Ab 50 Stück einer Art und Sorte berechne ich den Hundertstückpreis, sofern er angegeben ist. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück je Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der angegebene Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um —.10 DM.

STAUDEN — SORTIMENTE

meiner freien Wahl

Schnitt- u. Rabattenstauden, gewöhnliche Sorten	100 St.	DM 45.—
Schnitt- u. Rabattenstauden, bessere Auswahl	100 St.	DM 60.—
Mauer- u. Steingartenstauden, reiche Auswahl	100 St.	DM 45.—

	1 St. DM	100 St. DM
ACAENA — Stachelnüsschen — Rosacee		
buchanani, Δ	—	32.—
B. blaugrün, Bl. weiß, Fr. rosa, 10, VII	—	—
ACANTHOLIMON — Stachelnüsschen — Plumbaginacee		
glumaceum, Wiesenstachel, ∞ Δ I	m. Tb.	1.—
Bl. hellrot, 10, VII—VIII	—	—
ulicinum, ∞ Δ I	—	—
B. hellgrün, 10, VII—VIII	—	—
ACHILLEA — Schafgarbe, Edelgarbe — Komposite		
canescens, Δ	—	—
B. silberweiß, Bl. weiß, 40, VI	—	—
eupatorium Parkers Varietät, Goldene Tellergarbe, X	—	—
Bl. gelb, flach, 100, VII—IX	—	—
millefolium kelwayi, X	—	32.—
Bl. dunkel-kirschrot, 50, Ende VI—IX	—	—
ptarmica plena, ∞ X	—	—
Bl. weiß, kugelig, 50, VII—VIII	—	—
tomentosa aurea (A. aurea), Δ	—	—
B. zottigwollig, Bl. goldgelb, bis 30, VI—VII	—	—
ACONITUM — Eisenhut — Ranunculacee		
napellus sparki, X	—	—
Bl. blau, dunkelste, 120—150, VII—IX	—	—
ACTAEA — Christophskraut — Ranunculacee		
rubra fructo albo, ✱	—	—
Fr. weiß, 80—100, VII—IX	—	—
spicata alba, ✱	—	—
Fr. weiß, Stiele verdickt, rot, 100, VII—IX	—	—
ADENOPHORA — Becherglocke — Campanulacee		
polymorpha, B	—	—
B. grün, schmal, Bl. hellblau, 80, VI—VII	—	—

	1 St. DM	100 St. DM
ADONIS — Adonisröschen — <i>Ranunculaceae</i>		
<i>amurensis plena</i> , ■	2.—	—
B. frischgrün, geschlitzt, zieht ein, Bl. hellgelb, 25, IV—V		
AETHIONEMA — Steinkresse — <i>Cruciferae</i>		
<i>pulchellum</i> , Δ	m. Tb. —.80	—
Niederliegend, Bl. rosenrot, 10, VI		
AGROSTEMMA — Kornrade, Kronlichtnelke — <i>Caryophyllaceae</i>		
<i>coronaria atripurpurea</i> , ∞ ×	m. Tb. —.40	—
B. silbergrau, Bl. tief blutrot, 60—90, VI—VIII		
AJUGA — Günsel — <i>Labiatae</i>		
<i>reptans atripurpurea</i> , Purpurgünsel, Δ ■	—.40	32.—
B. purpurn, Bl. bläulich, 15, V—VI		
— <i>variegata</i> , Δ ■	—.50	—
B. weißbunt, Wuchs flach, 10, V—VI		
ALCHEMILLA — Frauenmantel — <i>Rosaceae</i>		
<i>alpina</i> , Δ	—.40	—
B. silbergrau, Bl. gelb, 10—20, VI—VIII		
ALLIUM — Zierlauch — <i>Liliaceae</i>		
<i>cernuum</i> , Δ	—.40	—
Bl. nickend, hellrosa, 30—60, VII		
<i>cyaneum</i> , Δ	—.40	—
B. grasartig, Bl. korblumenblau, 15—25, VI—VIII		
<i>farreri</i> , Δ	—.40	—
Bl. purpurn, 30, VI—VII		
<i>flavum</i> , Δ	—.40	—
B. grau, schmal, Bl. gelb, 40, VII		
<i>karataviense</i> , Δ Knolle	I.—	—
B. groß, graublau, Bl. große Köpfe, rosa, 40, VI—VII		
<i>moly</i> , Δ Zum Verwildern!	—.80	64.—
B. grau, schmal, Bl. gelb, 25, VII		
<i>montanum</i> , Δ ∞	—.40	—
Dichte, hellgrüne Polster, Bl. lilarosa, 15, VI—VIII		
<i>odorum</i> , Δ D	—.50	—
B. grasartig, Bl. weiß, 70, VI—VII		
<i>pulchellum</i> , Δ	—.50	—
Bl. lilarot, 30—40, VIII		
ALTHAEA — Stockrose, Malve — <i>Malvaceae</i>		
<i>ficifolia</i> -Hybriden	—.80	—
B. handteilig, groß, Bl. gelbe, weiße u. rötliche Töne, bis 200, VII—X		
ALYSSUM — Steinkraut — <i>Cruciferae</i>		
<i>rostratum</i> (A. <i>argenteum</i>), Δ	m. Tb. —.50	—
Holzig, Bl. gelb, 30—40, VII—VIII		
<i>saxatile</i> (A. <i>arduini</i>), Goldtuft, Δ B	—.50	40.—
B. graufilzig, Bl. goldgelb, bis 40, IV—VI		
— <i>citrinum</i> , Δ B	—.60	48.—
Bl. schwefelgelb, 30, IV—VI		
— <i>compactum</i> , Δ B	—.60	48.—
Niedrig, Bl. gelb, 20—25, IV—VI		
— <i>plenum</i> , Δ	—.80	—
Bl. gelb gefüllt, 30, V—VI		
AMSONIA — Amsonie — <i>Apocynaceae</i>		
<i>latifolia</i> (A. <i>tabernaemontana</i>)	—.80	—
Bl. blaßblau, 60—120, V—VII		

	1 St. DM	100 St. DM
ANCHUSA — Ochsenzunge — <i>Boraginacee</i>		
<i>myosotidiflora</i> (Brunnera) Kaukasus-Vergißmeinnicht ■	— .50	—
B. groß, tiefgrün, Bl. lichtblau, 30—50 IV—V		
ANDROSACE — Mannsschld — <i>Primulacee</i>		
<i>sarmentosa</i> , Δ	m. Tb. — .50	40.—
B. rosettig, jung wollseidig, Bl. hellrot, 10—15, V—VI		
ANEMONE — Windblume — <i>Ranunculacee</i>		
<i>albana</i> , Δ	— .70	—
B. pulsatilla-artig, Bl. lila, klein, 15, V		
<i>halleri</i> (A. pulsatilla halleri) Δ	— .70	—
B. seidig filzig, Bl. lila, langkelchig, 30, IV		
<i>nemorosa coerulea robinsoni</i> , Δ ■	— .60	—
Bl. leichtlila, groß, 15, IV—V		
<i>pulsatilla alba</i> , Δ	— .80	—
Bl. weiß, 15, VI		
— <i>rubra</i> (A. montana rubra),	— .50	40.—
Bl. dunkelblutrot, klein, schalenförmig, 30, V		
<i>vitalifolia tomentosa</i> , ×	— .50	40.—
B. weinartig, Bl. lilarosa, ähnlich A. japonica, 30		
ANEMONOPSIS — Scheinanemone — <i>Ranunculacee</i>		
<i>macrophylla</i> (A. japonica),	2.—	—
Bl. blaßlila, wachsartig, lockere Trauben, 60—90, VII—VIII		
ANTENNARIA — Fühlhorn — <i>Komposite</i>		
<i>diolca tomentosa</i> , Silberteppich, Δ	— .40	30.—
Rasenartig, Bl. weiß oder rosa, nickende Köpfchen, 5—10, VII—VIII		
ANTIRRHINUM — Löwenmaul — <i>Scrophulariacee</i>		
<i>asarina</i> (Asarrhina loebeli), ∞ Δ	m. Tb. — .80	—
Niederliegend, B. filzig, Bl. gelbweiß, 25, VII—IX		
APIOS — Erdbirne — <i>Papilionacee</i>		
<i>tuberosa</i> (Glycine apios),	— .60	—
Wuchernder Schlinger, Bl. braunrot, 200—300, IX		
AQUILEGIA — Akelei — <i>Ranunculacee</i>		
<i>alpina</i> , Δ	1.—	—
Bl. lebhaft samtigblau, 20, V—VI		
ARABIS — Gänsekresse — <i>Crucifere</i>		
<i>albida</i> (A. caucasica), Δ B I	m. Tb. — .50	—
Bl. weiß, einfach, 15—25, V		
— <i>pleniflora</i> , Levkojen-Arabis, Δ × I D	— .60	—
Bl. weiß, gefüllt, 25, V		
<i>alpina Rosabella</i> , Δ × I B	— .60	—
Bl. rosa, einfach, groß, 15—20, IV—V		
— <i>rosea</i> , Δ I B	— .50	40.—
Bl. rosa, niedrig, 10—15, IV		
ARENARIA — Miere, Sandkraut — <i>Caryophyllacee</i>		
<i>tetraquetra</i> , Polstersandkraut, ∞ Δ	m. Tb. — .80	—
B. kreuzweise paarig, Bl. weiß, bis 10, VII—VIII		
ARMERIA — Grasnelke — <i>Plumbaginacee</i>		
<i>caespitosa</i> (A. juniperifolia) ∞ Δ	— .50	40.—
Dichtpolsterig, B. schmal, Bl. rosa, 5, V—VII		
<i>formosa</i> Bees Ruby, Δ	— .80	—
B. grob, Bl. karminrot, großköpfig, straff, 30, VII		
<i>maritima</i> (Statice armeria), Δ	— .30	24.—
Bl. lilarot, 15, V—VIII		

	1 St. DM	100 St. DM
ARNICA — Wohlverleih — Komposite		
amplexicaulis, Δ	— .60	—
Bl. orangegeb, 30—50, VI—VIII		
ARTEMISIA — Beifuß — Komposite		
gnaphaloides (A. purshiana), $\infty \Delta$	— .60	—
B. silbergrau filzig, Bl. weiß, 80, VII—VIII		
lactiflora, Silberraute, $\times D$	— .60	—
Bl. milchweiß in stark verzweigten Rispen, 150, IX—X		
salina, ∞	— .60	—
B. silberig, Bl. weiß, 50, VIII—IX		
stelleriana	m. Tb. — .60	—
B. silbergrau, 50—80, VII—VIII		
ARUNCUS , siehe Spiraea aruncus		
ASARRHINA , siehe Antirrhinum asarina		
ASARUM — Haselwurz — Aristolochiacee		
europaeum, I ■	— .50	40.—
B. nierenförmig, glänzend schwarzgrün, Bl. geschwänzt, 10—20, IV—VI		
ASPARAGUS — Zierspargel — Liliacee		
tenuifolius, $\Delta \times \blacksquare \div$	1.—	—
B. sehr fein, niedrig, großfrüchtig, 30—50, VII		
verticillatus, $\Delta \times \blacksquare$	1.—	—
Halbstrauchig, windend, 100, V—VI		
ASPERULA — Waldmeister — Rubiacee		
nitida, ΔI	m. Tb — .60	—
Zwergig, Bl. weißlichrosa, 3—5, VII—VIII		
odorata, Maikraut, ■ D	— .30	24.—
Wuchernd, Bl. weiß, 20, V—VI		
ASTER — Sternblume, Aster — Komposite B		
acris (Galatella punctata), \times	— .60	—
Bl. lavendelblau, 60—80, VIII—IX		
— nanus, Δ	— .60	—
Wuchs niedrig, Bl. lavendelblau, 30—50, VIII—IX		
amellus, in folgenden Sorten: $\Delta \times$		
— Emma Bedau, ultramarinviolett, sehr dunkel, 40, VII—IX	— .80	—
— Heinrich Selbert, leuchtend dunkelrosa, 60, IX	— .80	—
— Hermann Löns, klarblau, groß, 50—60, IX—X	— .80	—
— ibericus, tief violettblau, 40—50, IX—X	— .80	—
— Jacqueline Genebrier, weinrot, 40—50, IX—X	1.—	—
— rubellus, lebhaft lilarosa, 40—50, VIII—IX	— .80	—
— W. Robinson, dunkelrosa, 40, IX—X	— .80	—
dumosus hybridus, in folgenden Sorten: Δ zu Fassungen		
— — Blue Baby, dunkelblau, 20—30, IX—X	— .60	48.—
— — Blue Bouquet, violettblau, 30—40, X	— .60	48.—
— — Countess of Dudley, frischrosa, 40, VIII—X	— .60	48.—
— — Diana, reinrosa, gefüllt, 25, IX—X	— .60	—
— — Lady Henry Maddocks, hellrosa, 40—60, VIII—X	— .60	48.—
— — Little Pink Lady, leuchtendrosa, 40—50, IX—X	— .70	56.—
— — Majori, rosallila, 30—40, VIII—X	— .60	48.—
— — Niobe, reinweiß, einfach, 20, IX	— .60	48.—
— — Peter Pan, zartrosa, einfach, 25, IX	— .60	—
— — Silberkissen, zartlila, 20—30, IX	1.—	—
— — Snowsprite, schneeweiß, halbgefüllt, 30—50, VIII—X	— .70	56.—
— — Sternkugel, lilarosa, 30, IX—X	— .60	—
— — Viktor, hell-lavendelblau, 20, IX—X	— .60	48.—

ASTER (Fortsetzung):

	1 St. DM	100 St. DM
ericoides, in folgenden Sorten: ×		
— Erlkönig, hellrosa, kleinblumig, 80—100, X	—60	—
— Schneectanne, schneeweiß, kleinblumig, 100—120, IX—X	—60	48.—
hybridus luteus, Δ ×	—70	—
Bl. zierlich, gelbe Sternchen, 40—50, VII—VIII		
linosyris, Goldschopf (<i>Linosyris vulgaris</i>) × B	—60	48.—
Bl. gelbe, auffallende Köpfchen, 50, VII—X		
novae-angliae, Herbstastern in folgenden Sorten: × B		
— albus, weiß, 120—150, IX—X	—60	48.—
— Barr's Pink, tiefrosa, einfach, groß, 150, IX—X	—60	48.—
— Dr. Eckener, dunkelkarminrosa, 120—150, X—XI	—60	48.—
— W. Bowman, violettblau, 120, IX—X	—60	—
novi-belgi, Herbstastern in folgenden Sorten: × B IX—X		
— Beechwood Challenger, sehr leuchtendrot, 50—70	—60	48.—
— Beechwood Glow Improved, tief purpurrot, Mitte gelb, 50—70	—80	64.—
— Beechwood Rival, purpurrot, 60	—80	64.—
— Blue Eyes, blau mit Auge, 70—100	—60	48.—
— Blütenschirm, zart blaßlila, 100	—60	48.—
— Dick Ballard, rosa, gefüllt, 70	—60	48.—
— Mount Everest, reinweiß, groß, 100—120	—80	64.—
— Olga Keith, dunkelrosa, gefüllt, 60—80	—80	64.—
— Red Rover, rot, 80—100	—60	48.—
— Royal Blue, tief purpurblau, 100, VIII—IX	—60	48.—
— Sunset, rosa, 100	—60	48.—
subcoeruleus, hellviolett, 40, V—VI Δ ×	—50	—
— Wartburgstern, leuchtend lavendelblau, 40—60, V—VI	—50	—

ASTILBE — Prachtspiere — Saxifragaceae

arendsi, in folgenden Sorten: ×		
— Bergkristall, schneeweiß, locker, 80—100, VII	—60	—
— Else Schluck, leuchtend karminrot, dicht, 70—80, VII	—80	64.—
— Fanal, dunkel granatrot, 40—60, VII	—80	64.—
— Frieda Klapp, karmin, langrispig, 80, VIII	—60	—
— Gertrud Brix, dunkel karminpurpur, 70, VII	—80	64.—
— Granat, leuchtend dunkelkarmin, 100, VII—VIII	—80	—
— Irene Rottseper, lachsrosa, buschig, 50—60, VII—VIII	—80	—
— Lilli Goos, dunkellachskarmin, locker, 80, VII	—80	—
— Rubin, dunkelkarmin, 100, VII	—60	48.—
— Weiße Gloria, rahmweiß, 40—60, VII	—80	—
chinensis pumila, niedrig, Bl. lila, bis 30, VII—IX Δ	—50	40.—
crispa, Zwergastilbe, B. kraus, Bl. rosaweiß, 10—15, VII—VIII Δ	1.—	—
davidi, Bl. leuchtendrot, straff, bis 180, VII—VIII ×	—60	48.—
grandis, hoch, Bl. milchweiß, locker, 150—200, VI—VIII ×	—80	—
hybrida, in folgenden Sorten: ×		
— Gloria purpurea, B. dunkel, Bl. karmin, 50—60, VII	—60	48.—
— Holsatia, karminviolett, 60, VII	—80	—
— Salland, leuchtend karminpurpur, 120, VII—VIII	—60	—
japonica hybrida, in folgenden Sorten: Für Töpfe und Treiberei!		
— — Bremen, dunkellachskarmin, 50, VII	—80	64.—
— — Deutschland, blendendweiß, 50, VII	—80	64.—
— — Europa, dicht, rein hellrosa, 40—50, VII	—80	—
— — Köln, dunkellachskarmin, dick, 50, VII	—80	64.—
simplicifolia alba, Δ	—80	—
B. ungeteilt, Bl. weiß, 15—20, VIII—IX		
taqueti superba, Δ ×	—50	40.—
B. derb, Bl. kräftig lila, bis 100, VII—VIII		
thunbergi elegans rosea, ×	—60	48.—
Ueberhängend, Bl. dunkelrosa, 120, VII—VIII		
— moerheimi, üppig, Bl. weiß, 120, VII ×	—60	48.—

	1 St. DM	100 St. DM
ASTRAGALUS — Bärenschote — Papilionaceae		
alopecuroides , Fuchsschwanz-artiger Tragant	1.—	—
B. fiederig, groß, Bl. gelb, wollig, 80—100, VI		
ATRAGENE , siehe Clematis alpina		
AUBRIETIA — Blaukissen — Crucifere		
deltoidea, in folgenden Sorten: Δ I B		
— Feuerkönig, rot, 5—10, V m. Tb.	—80	64.—
— gracca Veilchentepich, violett, 5 V	—80	—
— grandiflora, lichtblau, 5—10, V	—60	—
— Mammut-tauricola, blau, groß, dicht, 10, V	—80	—
hybrida, in folgenden Sorten: Δ I B		
— Blue Emperor, marineblau, 15—25, V	—80	64.—
— Gloriosa, zartrosa, groß, 10—15, V	—80	64.—
— Ina den Ouden, dunkelviolett, 10—15, V	—80	—
— Lavendel, lavendelblau, 10—15, IV—V	—60	48.—
— Purpurteppich, kräftig violett, 10—15, V	1.50	—
leichtlini Crimson, leuchtend karminrosa, 10—15, V Δ I	—80	—
tauricola, niedrig, dunkelblauviolett, 5—10, IV—V Δ I	—60	48.—
AZORELLA — Sumpfbalsam — Umbellifere		
trifurcata, Δ I	—50	40.—
Polster, dicht, hellgrün, glänzend, Bl. grüngelb, 10, V		
BERGENIA — (Megasia, Saxifraga) — Riesensteinbrech		
ciliata, Δ I B \times	1.—	—
B. behaart, Bl. rötlich-weiß, 30, III—V		
cordifolia, Δ I B	—70	—
B. breit herzförmig, Bl. hellrosenrot, bis 40, IV—V		
— purpurea, Δ I B	—80	—
B. schwächer gesägt, Bl. dunkelrot-violett, bis 40, IV—V		
delavayi, Δ B \times	—70	56.—
B. glatt, grün, Bl. weinrot, 40, V		
pacificca, Δ I B	—70	56.—
B. klein, Bl. rosa, 20, IV		
speciosa, Δ I B	—70	56.—
B. rundlich, Bl. rosa, bis 50, II—III		
BETONICA — Battunge — Labiate		
grandiflora superba (Stachys), Scheinziest, Δ B \times	—50	—
Bl. rotviolett, dichte Ähren, 30—40, VII—VIII		
BRUNNERA , siehe Anchusa myosotidiflora		
BUPHTHALMUM — Ochsenauge — Komposite		
salicifolium, Goldmargerite \times	—60	48.—
Bl. goldgelb, doldentraubig, 3—5 cm Dm, 20—50, VI—IX		
speciosissimum (Telekia) \times	—70	—
Bl. goldgelb, einköpfig, 60—80, VII—VIII		
CALIMERIS — Falschaster — Komposite		
integrifolia, Bl. weiß, 60—80, VII—IX \times	—50	—
CALYSTEGIA — Staudenwinde — Convolvulaceae		
pubescens plena (Convolvulus jap. pl.) 1 St. = 10 Keime	—50	40.—
Klettert, Bl. rosa gefüllt, 100—200, VI—IX		

	1 St. DM	100 St. DM
CAMASSIA — Quamaschlilie — Liliacee		
leichtlini alba, ×	—80	—
B. grob, Bl. weiß, groß, 100, VI—VII		
— cocruica, Bl. purpurn, 100, VI—VII ×	—60	—
CAMPANULA — Glockenblume — Campanulacee		
glomcrata acaulis, Kissen-Glockenblume Δ	—60	—
B. rosettig, Bl. dunkelviolet, 5—10, VI—VIII		
— superba, Knäuelglockenblume, Δ ×	—60	—
Straffstielig, Bl. tief dunkelviolet, 40, VI—VII		
istrlaca, Δ m. Tb.	—70	—
Bl. klarblau, Petalen spitz, 15, VII		
latifolia, Waldglockenblume × ■	—60	—
Bl. hellviolet, 75—100, VI—VII		
persicifolia alba (C. pers. backhousei) ×	—60	—
Pfirsichblättrig, Bl. weiß, edle Glocken, 75, VI—VII		
— grandiflora ×	—60	48.—
Bl. leuchtendblau, große, edle Glocken, 60—80, VII		
portenschlagiana (C. muralis), Teppichglockenblume m. Tb.	—60	48.—
Polsterig, Bl. blau, 10—20, V-Frost Δ		
poscharskyana, Δ	—60	48.—
Langtriebig, Bl. blau, 20—25, VI—X		
pulcherrima, × ■ Zum Verwildern!	—50	—
Bl. leuchtend violettblau, große Blütenstände, 75, VII—VIII		
pusilla, Zwerg-Glockenblume m. Tb.	—60	48.—
Niedrig, Bl. hellblau, reichblühend, 10—15, VII—IX		
— alba, reinweiße Form, blühwillig, 10—15, VII—VIII Δ „	—70	—
CARLINA — Silberdistel — Komposite		
acanthifolia, Bl. groß, gelblichweiß, 10, VI—VIII Δ	1.—	—
acaulis, Wetterdistel, ∞ Δ	1.—	—
Flach, Köpfe silberweiß, bis 20, VII—IX		
CERASTIUM — Hornkraut — Caryophyllacee		
arvense compactum, I B Δ	—50	40.—
Rasig, Bl. weiß, 5, V—VI		
biebersteini, I B Δ	—40	32.—
B. weißwollig, Bl. 20, VI—VII		
candidissimum, I B Δ	—50	40.—
Niedrig, polsterig, B. silberweiß, Bl. weiß, 15, VI		
CHIASTOPHYLLUM — (Cotyledon) — Crassulacee		
oppositifolium (Cotyledon simplicifolia) Goldtröpfchen m. Tb.	1.—	—
B. sedumartig, Bl. gelb, überhängend, 20, VI—VII Δ		
CHRYSANTHEMUM — Margerite, Winteraster — Komposite ×		
arcticum, Nordlands-Margerite Δ	—80	64.—
Polster, Bl. reinweiß, 15—25, IX—XI		
erubescens (Chrysoboltonia ruberrima) ×	—60	48.—
Reichblühend, Bl. rosarot, 50—70, VIII—X		
indicum plenum, in folgenden Sorten: ×		
— — Altgold, goldbrunze, Pompon, 50, IX—X	—80	64.—
— — Anastasia, karminrosa, Pompon, 60, IX	—80	64.—
— — Azaleamum, rosa reichblühend, 45, VIII—IX	1.—	—
— — Belle Mauve, silberlila, groß, 70—100, X—XI	—80	—
— — Blanche Poltevine, weiß, groß, spät, 40, X—XI m. Tb.	1.—	—
— — Bronze Early Buttercup, gold, groß, 60—80, IX—X „	1.—	—
— — Champ d'Or, glänzend leuchtendgelb, edel, 70, IX—X	1.—	—
— — Crimson Diana, braun mit Gold, 60, X	—80	—
— — Cydonia, kupfrig bronze, 80, X—XI	—80	64.—

CHRYSANTHEMUM (Fortsetzung):

indicum plenum:

	1 St. DM	100 St. DM
— Frau W. Klapdor, reinweiß, Pompon, 50, VIII—IX	— .80	—
— Golden Glory, dottergelb, 70—80, IX—X	— .80	—
— Idi (Braune Normandie), goldbrunze, 75, IX	— .80	—
— La Garonne, leuchtend terrakottarot, 80, X	— .80	—
— Mad. Lyobard, weiß, straff, groß, 60, X—XI	1.—	—
— Marg. Kießling, goldbraun, Pompon, 30—40, VIII—IX	— .80	—
— Normandie, rosa, edel, 80, IX—X	— .80	—
— Pride of Cheston, purpurrot, 70—80, X	— .80	—
— Peter Pan, orangegelb, 70—80, X	— .80	—
— Phönix, gelbbunze, orange gestreift, 80—100, VIII—IX	— .80	—
— Purpur, purpurrot, spät, 80—100, X—XI	— .80	—
— Ruby King, samtig rotbraun, spät, 80, X	— .80	—
— Septembergelb, reingelb, groß, 80, X	— .80	—
— Septemberweiß, reinweiß, groß, 80, X—XI	— .80	—
— Zwergsonne, goldgelb, Pompon, 50, IX	— .80	—

koreanum, in folgenden Sorten: x

— Apollo, bronziert, einfach, Mitte altgold, 60—80, IX—X	— .80	64.—
— Ceres, hellkupfriggelb, 80—100, X	— .80	—
— Hebe, karminrosa, einfach, 80, X	— .80	—
— Innocence, rosa, später weiß, 45, IX—X	— .80	—
— King Mides, hellgelb, gefüllt, groß, 60, IX—X	1.—	—
— Luise Schling, tiefrot, gefüllt, 50—70, IX—X	1.—	—
— rubellum Clara Curtiss, kirschrosa, einf., 60—80 IX x	1.20	96.—

CHRYSOBOLTONIA, siehe Chrysanthemum erubescens**CIMICIFUGA** — Silberkerze — Ranunculaceae x

— ramosa, hochwüchsig, Bl. lockere Rispe, weiß, 120, X	1.—	—
— simplex, B. doppeltgefied. Bl. weiß, stumpf, bogig, 100, IX—X	— .80	—
— Armleuchter, reichverzweigt, weiß, 100, X	1.—	—
— serotina, spätblühend, weiß, 100, X—XI	— .80	—
— White Pearl, verzweigt, weiß, locker, 100 X	1.—	—

CLEMATIS — Waldrebe — Ranunculaceae

— alpina, (Atragene alpina) Alpenwaldrebe Δ ✱ m. Tb.	1.—	—
— Bl. blau, schöne Glocken, Fr. zierend, bis 200, V—VI		
— recta, nicht rankend, Bl. weiß, 60—100, VI—VII, ∞ x	— .80	—
— mandschurica, Bl. weiß, lockerer, 60—100, VII—VIII, ∞ x	— .80	—

COLCHICUM — Zeitlose — Liliaceae

— byzantinum, Herbstzeitlose, Δ	1.—	—
— Bl. lilapurpurn, 15—25, IX		

CONVALLARIA — Maiblume — Liliaceae. ■

— majalls, x D	10 Keime	— .60	—
— Bekannte, weiße Maiblume, 20, V			
— grandiflora, x D	10 Keime	— .70	—
— Großglockige Form, schön belaubt, 25, V			
— polygonatum (Polygonatum officinale), Salomonssiegel		1.—	—
— Uebergebogen, Bl. achselständig, grünlichweiß, 60, VI			

COREOPSIS — Mädchenauge — Komposite

— grandiflora „Badengold“ x		1.—	—
— Bl. reingoldgelb, drahtart gestielt, groß, hart, 80, VI—X			
— tripteris, x D		— .60	48.—
— Bl. hellgelb, 150—200, IX—X			
— verticillata (C. tenuifolia) x B		60.—	48.—
— B. sehr fein zerteilt, Bl. gelb, 60, VII—IX			
— grandiflora, großblumig, sonst wie die Art x B		— .70	56.—

		1 St. DM.	100 St. DM.
CORNUS — Hartriegel — Cornacee			
canadensis, Δ ✱ ■	m. Tb.	1.50	—
Bodendeckend, Bl. weiß, Fr. korallenrot, 10, VI			
suecica, Δ ✱ ■		1.50	—
Bodendeckend, Bl. klein, purpurn, Fr. glänzendrot, 5—10, VII—VIII			
CORONILLA — Kronwicke — Papilionacee			
montana (C. coronata) $\infty \Delta$	m. Tb.	2.—	—
Bl. gelblich, 30, V—VIII			
CORTUSA — Glöckel — Primulacee			
matthioli, Bl. rosapurpurn, 20—30, V—VI Δ		—50	—
pubens (C. matthioli pubens) Δ		—50	—
B. weichbehaart, tiefgelappt, Bl. rötlich, 20, V—VI			
CORYDALIS — Taubenkropf, Erdrauch — Fumariacee			
cava (C. bulbosa) B		—60	—
Knollig, Bl. schön purpurn, 15, IV			
COTULA — Fiederpolster — Composite			
squalida (Leptinella) Δ		—40	30.—
Rasige Polster, braungrün, Bl. gelb, 5, VII—IX			
COTYLEDON , siehe Chiastophyllum			
CYCLAMEN — Erdscheibe, Alpenveilchen — Primulacee			
ibericum album, Δ ■	m. Tb.	1.50	—
B. schön gezeichnet, Bl. weiß, vor dem Laub, 5, XII—XIII			
neapolitanum (C. hederacifolium) Δ ■	m. Tb.	1.50	—
Kriechend, Bl. rosa, vor dem Laub, 10, VII—VIII			
— album, weißblühend, sonst wie die Art, 10, VII—VIII „		1.50	—
DELPHINIUM — Rittersporn — Ranunculacee \times B			
atropurpureum, leuchtend purpurviolett, 60—70, VI		—80	—
cultorum (D. hybridum), in folgenden Sorten: VI—VII			
— Arnold Böcklin, tief enzianblau, einf., 130—150		—80	64.—
— Anne Bakker, mauve, groß, 100—120		1.50	—
— Belladonna Capri, himmelblau, einf., 120		—80	—
— — Lamartine, tief dunkelblau, einf., 100		—80	—
— Berghimmel, himmelblau, Mitte weiß, 150—200		1.—	80.—
— Blue Beauty, marineblau, straff, 120—150		1.50	120.—
— Enzianturm, rein tief enzianblau, Auge weiß, 120—150		1.25	—
— Fön, rötlich dunkelblau, Auge schwarz, 150—200		1.25	—
— Gletscherwasser, eisblau, stark verzweigt, 150		1.—	—
— Havelland, kornblumenblau mit Amethyst, Auge weiß, 150		1.—	80.—
— Kirchenfenster, dunkelblau, rotviolett, Auge weiß, 150		1.25	100.—
— Lady May, rein malvenfarbig, groß, einf., 100—120		1.25	—
— Leuchtturm, hellgrünblau, Auge moosgrün, 150		1.25	—
— Nachthorn, pflaumenblau, früh, 150—200		1.—	80.—
— Purpurritter, dklenzian, purpurviolett gef., Auge weiß, 150		1.—	—
— Stichelblume, leuchtend azurblau, einf., 80—100		1.25	100.—
— Tropennaecht, tief enzianblau mit Rot, Auge weiß, 120		1.25	—
— van Veens Triumph, zart lilarosa, sehr groß, 160		1.25	—
ruysl „Rosa Ueberraschung“ (Pink Sensation) \times		1.25	—
Bl. reinrosa, lange blühend, 100—150, ab VI			
tatsienense, lebhaft blau, 50, VI—VIII, $\Delta \times$	m. Tb.	—80	64.—
DIANTHUS — Nelke — Caryophyllacee			
caesius (D. glaucus) Pfingstnelke I Δ		—60	48.—
B. laugrün, Bl. rosa, 5—15, V—VII			

DIANTHUS (Fortsetzung):

	1 St. DM.	100 St. DM.
caesius Blaureif, B. silberig, Bl. rosa, 15—25, V—VII Δ m. Tb.	—80	64.—
— splendens, Δ	—80	—
B. dunkelgrün, Bl. feurig purpurrosa, 10—15, VI—VII		
deltoides splendens, Δ	—80	64.—
B. schwarzgrün, Bl. dunkelkarmin, 20—25, VI—VII		
plumarius Duchess of Fife, Form der Federnelke \times	—70	56.—
B. graugrün, Bl. apfelblütenfarbig, 30, V—VI		
— Peach Blossom, B. graugrün, Bl. zartrosa, 30, V—VI \times	—70	56.—

DICTAMNUS — Diptam — Rutacee

fraxinella, Brennender Busch \times	—70	56.—
Aromatisch, Bl. rot, pyramidale Traube, 50—75, V—VII		

DIELYTRA — (Dicentra) — Zweisporn — Fumariacee B

formosa, Zwergdoppelsporn Δ	—60	—
Niedrig, Bl. blaßrosa, überhängend, 30, VI—VIII		
spectabilis, Tränendes Herz Für Treiberei! \times	—30	64.—
B. einziehend, Bl. lebhaft rosa Herzen, 50—100, V—VII		

DIGITALIS — Fingerhut — Scrophulariacee

grandiflora (D. ambigua)	—50	40.—
Bl. hellgelb, weitglockig, 80—100, VI—IX		
lutea, Bl. zitronengelb, 60—80, VI—VII	—50	—

DIOSCOREA — Yamwurz — Dioscoreacee

quinqueloba	—60	—
Windend, B. herzförmig, Bl. grün, unscheinbar, 100, VI—VII		
villosa Δ	—80	—
B. spitz, herzförmig, Bl. grünlich, 80, VI—VII		

DODECATHEON — Götterblume — Primulacee

jeffreyi, Bl. purpurrot mit Gelb Δ	m. Tb.	1.—
---	--------	-----

DONDIA, siehe Haecquetia**DORONICUM — Gemswurz — Komposite \times B**

caucasicum, B. frischgrün, Bl. goldgelb, 25—30, IV—V	—80	—
columnae (D. cordifolium) gelbe Frühlingsmargerite	—80	—
Anspruchlos, Bl. gelb, 40—50, V—VI		
hybridum Mad. Mason, üppig, Bl. sattgelb, 40—60, V—VI	—80	—

DRABA — Hungerblümchen — Crucifere Δ I

armata, Bl. gelb, 10, VI	m. Tb.	—80
loiseleurii, Bl. gelb, 5—10, VII—VIII	"	—80

DRYAS, siehe unter „Laubhölzer“**ECHINOPS — Kugeldistel — Komposite**

humilis, $\infty \times$ Trockenblume	—60	—
Bl. dunkelblau, kugelrund, 80, VII—IX		
ritro, $\infty \times$ Trockenblume	—60	—
Bl. hellblau, 100, VI—VII		

EPIMEDIUM — Elfenblume — Berberidacee Δ

alpinum, rot mit Gelb, 20—30, IV—V	—60	—
— rubrum, reinrot, 20—30, IV—V	—60	—
discolor, rotgelb, gut über dem Laub, 20—30, IV—V I	—60	—
lilacinum, helllila, frei über dem Laub, 15—25, IV—V	—60	148.—
macranthum, großspornig, weißlichlila, 20—30, IV—V	—80	64.—
muschianum, weißlich, üppig, 40, V—VI	—60	48.—
niveum, reinweiß, niedrig, frei über dem Laub, 15—20, V—VI	—70	—
pinnatum, spornlos, lebhaft gelb, 20—30, V—VI I	—1.	—

	1 St. DM	100 St. DM
EPIMEDIUM (Fortsetzung):		
<i>rubrum</i> , rot, grobblaugig, 20—40, IV—V	—70	56.—
<i>sulfureum</i> , schwefelgelb, Laub lederig, 20—30, V I	—80	—
<i>versicolor</i> , rosalila, 20—30, V—VI	—60	48.—
<i>youngianum</i> , weißlich lila, 30—40, VI	1.—	—
ERANTHIS — Winterling — <i>Ranunculaceae</i>		
<i>cilicla</i> Δ Zieht ein! Topf mit Knöllchen	1.—	—
B. fein zerteilt, Bl. dunkelgelb, 8—10, II—III		
<i>hiemalis</i> Δ Zieht ein! Topf mit Knöllchen	1.—	—
B. federig, Bl. einzeln, gelb, 8—10, II—III		
ERIGERON — Feinstrahl — <i>Komposite</i>		
<i>hybridum</i> Quakeress \times	—60	—
Bl. matt-rosalila, feinpetalig, 50—80, VI—X		
<i>macranthum superbum</i> , \times	—60	48.—
Wuchs straff, Bl. tiefblau, feinstrahlig, 40—60, VI—VIII		
ERYNGIUM — Edeldistel — <i>Umbellifere</i>		
<i>giganteum</i> (E. <i>asperrimum</i>) $\infty \times$ Trockenblume	—50	40.—
Bl. silberig, walzige Köpfe, 50—75, VI—VIII		
ERYTHRONIUM — Schoßwurz — <i>Liliaceae</i>		
<i>dens canis</i> , Hundszahn Δ ■ Zieht ein!	—80	—
Knollig, B. gefleckt, Bl. lilapurpurn, 10—15, III—IV		
EUPHORBIA — Wolfsmilch — <i>Euphorbiaceae</i>		
<i>myrsinites</i> , $\infty \Delta$ I Zum Verwildern!	—60	—
B. blaugrau, schindelartig, Bl. gelblich, 20—40, V—VI		
<i>polychroma</i> (E. <i>epithymoides</i>) $\infty \Delta$	—60	—
Dichtbuschig, Bl. und Brakteen gelb, 50, IV—VI		
FUNKIA — (Hosta) — Trichterlilie — <i>Liliaceae</i>		
<i>fortunei</i> , B. breit, graugrün, Bl. weißlichlila	—70	56.—
— <i>robusta</i> , B. breit, blaugrau, besonders üppig	—70	56.—
— <i>variegata</i> , B. hell-, dunkel- und graugrün, Bl. weiß	—70	—
<i>lancifolia albo-marginata</i> , B. weiß gerandet, Bl. dunkellila	—50	40.—
— <i>angustifolia</i> , B. schmal, grün, Bl. dunkellila, spät	—60	—
— <i>tardiflora</i> , B. grün, Bl. dunkellila, sehr spät	—50	40.—
— <i>undulata medio-picta</i> , B. gewellt, weißbunt, für Treiberei	—80	—
— — <i>variegata</i> , B. weißbunt, üppig	—70	56.—
<i>ovata</i> , B. olivgrün, breit, Bl. dunkellila	—60	48.—
— <i>albo-marginata</i> , B. weiß- und gelbbunt	—70	—
— <i>aurea</i> , B. im Austrieb gelb, später grün werdend	—60	48.—
— <i>aureo-maculata</i> , B. grün- und gelbbunt	—60	48.—
<i>sieboldiana gigantea</i> , B. groß, spitz, lebhaftgrün	—70	56.—
GAILLARDIA — Kokardenblume — <i>Komposite</i> \times		
<i>grandiflora maxima</i> , Hybriden m. Tb.	—50	40.—
Bl. gelb und rot, 60—80, VI—IX		
<i>hybrida</i> Burgunder, Bl. einfarbig rot, groß, 40, VI—VIII „	—60	48.—
GALATELLA , siehe <i>Aster acris</i>		
GENTIANA — Enzian — <i>Gentianaceae</i> Δ		
<i>acaulis</i> (G. <i>gentianella</i>), Alpen-Enzian	1.50	—
B. rosettig, grün, Bl. tiefblaue große Kelche, 10, IV—VI		
<i>asclepiadea</i> , Schwalbenwurz	1.—	—
Bl. blau in den Blattwinkeln, 30—70, VI—IX		
<i>gracilipes</i>	1.—	80.—
B. schmal, Bl. hellblau in Quirlen, 40—50, VI—VIII		
<i>septemfida cordifolia</i>	—80	64.—
B. dunkel, Bl. kornblumenblau, 20—30, VII—VIII		

	1 St. DM	100 St. DM
GENTIANA (Fortsetzung):		
sino-ornata Δ	m. Tb.	1.20 —
Niederliegend, Bl. königsblau, 10—20, IX—X		
GERANIUM — Storchschnabel — Geraniaceae		
argentum, B. silberig, Bl. rosa, 20—25, VII Δ		— .80 —
cincrum, B. aschgrau, Bl. rotviolett, 15—20 VII Δ		1.— —
grandiflorum, Bl. violettblau, groß, üppig, 30, V—VII Δ		— .60 —
platypetalum, Bl. hellblau mit Purpur, groß, 60, VI—VIII		— .60 48—
sanguineum, niedrig, Bl. dunkelkarmin, 15—20, V—VIII Δ		— .60 —
— album, Bl. weiß, sonst wie die Art Δ		— .60 48.—
GEUM — Nelkenwurz, Erdwurz — Rosaceae Δ		
coccineum, Bl. backsteinrot, 40—50, ab V		— .60 48.—
montanum, B. rosettig, Bl. goldg. Fr. zierend, 20—30, VI—VII Δ		— .60 —
rossi, B. feingefiedert, Bl. schwefelgelb, 15—20, V		— .80 —
GILLENIA — Baumannswurzel — Rosaceae		
trifoliata, Dreiblattspeere		— .80 64.—
B. bräunlich, Bl. weiß, locker, 100—120, VI—VII		
GLOBULARIA — Kugelblume — Globulariaceae		
cordifolia, B. polsterig, holzig, Bl. blau, 20—30, V—VI Δ I		— .60 48.—
GNAPHALIUM , siehe Leontopodium		
GLYCINE apios, siehe Apios tuberosa		
GUNNERA — Peru-Rhabarber — Halorrhagidaceae		
manicata	extra stark	.5.— —
B. sehr groß, rauh, Bl. in dichten Kolben, 150—300, VII		
GYPSOPHILA — Gipskraut — Caryophyllaceae		
hybrida plena Rosenschleier Δ		— .80 64.—
B. weiß-rosa, gefüllt, 25—35, VII—IX		
paniculata, Schleierkraut. Für Trockenblumen! \times		— .60 48.—
B. grau, fein, Bl. weißer Schleier, 100, VII—IX		
repens rosea, B. fein, Bl. rosa, 15—30, VI—VIII Δ B		— .60 48.—
HACQUETIA — Schaftdolde — Umbelliferae		
epipactis (Dondia epipactis) \blacksquare		1.— —
B. handförmig, Bl. gelbgrün, 10—20, III—IV		
HARPALIMUM — Sonnenrose — Komposite		
rigidum Danici Dewar (Helianthus scaberrimus) \times 10 Kelme		— .60 —
Wüchsig, Bl. dunkel goldgelb, 150, VII—X, Wuchert!		
HELENIUM — Sonnenbraut — Komposite \times		
autumnale Augustsonne, Bl. reingelb, 80, VIII—IX		1.— —
— aurantiacum, Bl. goldgelb, groß, 60, VII—IX		— .60 48.—
— Crimon Beauty, Bl. auffallend kupfrig, 40—50, VII—IX		— .60 —
— Garten-sonne, Bl. goldg., Mitte samtbraun, 120—150, VIII—X		— .60 48.—
— Goldlachs, Bl. dunkelbraun mit Bronze, 80—100, VII—IX		1.— —
— Peregrina, Bl. tiefbraunrot, 80—120, VIII—X		— .80 —
— Riverton Gem, Goldl.-Helenium, goldlackr., 120—150, VIII—IX		— .60 48.—
— Rubinkugel, Bl. tiefbraunrot, dicht, 60—80, VIII—IX		1.— —
bigelowi superbum, Bl. goldg., Mitte schwarz, 40—60, VII—IX		— .70 56.—
grandicephalum Wesergold, Bl. zitronengelb, Mitte braunrot,		— .70 56.—
60—80, VII—X		
hybridum Moerheim Beauty, Bl. feurigrotbr., 60—80, VI—VIII		— .80 —
HELIANTHEMUM — Sonnenröschen — Cistaceae Δ B		
chamaecistus	m. Tb.	— .60 —
B. grün, Bl. gelb, einfach, 10—15, V—VI		

HELIANTHEMUM (Fortsetzung):

	1 St. DM	100 St. DM
hybridum amabile Blutströpfchen m. Tb.	— .60	48.—
Bl. rot, groß, einfach, 30, V—VI		
— — plenum (H. Rubin) „	— .60	48.—
B. dunkelgrün, Bl. scharlachrot, gefüllt, 20—30, V—IX		
— — sulfureum plenum (H. Gelbe Perle) „	— .60	48.—
Bl. lebhaft gelb, dicht gefüllt, 15—20, VI—VII		
— Golden Queen „	— .60	48.—
Bl. goldgelb, einfach, groß, 30—40, VI—VIII		
— Watergate Orange „	— .60	—
B. silberig, Bl. orange, einfach, 20—30, VI—VII		
mutabile album plenum „	— .60	—
Bl. weiß, gefüllt, 15, V—VI		

HELIANTHUS — Sonnenblume — Komposite

salicifolius (H. orgyalis)	— .80	—
B. schmal, zierlich, Bl. goldgelb, verzweigt, 200, X		
scaberrimus, siehe Harpalium rigidum Daniel Dewar		

HELIOPSIS — Sonnenaue — Komposite

scabra patula ×	— .80	64.—
B. lanzettlich, straff, Bl. reingelb, gefüllt, 100—120, VII—IX		

HELLEBORUS — Nieswurz — Ranunculaceae B ■

hybridus, gemischt ×	— .80	—
Bl. weiß bis blutrot, langstielig, 30—50, II—III		
niger grandiflorus, Christrose, Schneerose, I ×	1.25	—
Bl. reinweiß, groß, Staubfäden gelb, 15—30, XII—III		

HELONIOPSIS — (Sugerokia) — Liliaceae

japonica I Δ ■	1.50	—
B. rosettig, lanzettlich, Bl. rosa, 15—20, IV		

HEMEROCALLIS — Taglilie — Liliaceae

fulva, Bl. braunrot, groß, breit, 100—120, VII—VIII	— .60	—
— plena, Bl. ziegelorangerot, gefüllt, 75—90, VIII—IX	— .60	48.—
— variegata, B. weißbunt, Bl. braunrot, 120, VII—VIII	— .80	—
hybrida Apricot, Bl. aprikosenfarbig, 50—70, V—VII	— .60	48.—
— Aureola, Bl. hellgoldgelb, früh, 60—80, V—VII	— .60	48.—
— Dr. Regel (H. middendorffii)	— .60	—
B. zierlich, Bl. tieforange gelb, 70, V—VI und Herbst		
— luteola, Bl. rein zitronengelb, 70, VII	— .60	—
— Margaret Perry, Bl. leucht. orange bis scharlach, 90, VI—VIII	— .80	—
— Queen of May, Bl. orange gelb, 90, V—VI	— .60	48.—
— Sovereign, Bl. hell orange gelb, robust, 90, V—VI	— .60	48.—

HEPATICA — Leberblümchen — Ranunculaceae

triloba coerulea Δ ■	— .80	—
B. dreiteilig, dunkelgrün, Bl. blau, 10—15, III—IV		

HEUCHERA — Granatrispe, Purpurglöckchen — Saxifragaceae B ×

hybrida Pluie de Feu, Bl. rot, großglockig, 40—50, V	— .80	—
tiarelloides, Bl. hellrosa Sternchen, 50—60, IV—VI	— .70	—

HOSTA, siehe Funkia**HUTCHINSIA** — Gamskresse — Cruciferae Δ I

alpina, Blattrosette glänzend, Bl. weiß, 3—10, IV—VIII m. Tb.	— .60	—
---	-------	---

HYACINTHUS (Muscari) — Trauben- oder Bisamhyazinthe — Liliaceae

botryoides, Perlhyazinthe Δ	10 Knöllchen	— .50	—
B. grasartig, Bl. blau, 15, IV—V			
comosus, Bl. dunkelblau, gröber, 25—30, V—VI Δ D		— .80	—

		1 St. DM.	100 St. DM.
HYPERICUM — Hartheu — Hypericaceae			
	Siehe auch unter „Laubhölzer“		
polyphyllum, Bl. goldgelb, 10—15, ab V Δ I	m. Tb.	—60	48.—
HYSSOPUS — Ysop — Labiate			
officinalis, B. aromatisch, Bl. blaue Rispen, 40—60, VIII Δ		—60	—
IBERIS — Schleifenblume — Crucifere I Δ			
saxatilis, B. fein, Bl. weiß, 15—20, V		—50	40.—
sempervirens Little Gem (Weißer Zwerg)		—60	48.—
Wuchs niedrig, Bl. weiß, zierlich, 15, V			
— Schneeflocke, üppig, Bl. blendendweiß, groß, 20—40, V		—50	40.—
— Zwerg-Schneeflocke, schön dicht, Bl. weiß, 20, V		—60	48.—
INCARVILLEA — Freiland-Gloxinie — Bignoniaceae			
delavayi, B. groß, gefiedert, Bl. tiefrosenrot, 40—60, V—VI $\Delta \times$		—60	48.—
grandiflora brevipes, B. üppig, Bl. lebh. hellkarmin, 15—25, V Δ		—60	48.—
INULA — Alant — Komposite			
ensifolia		—60	48.—
B. schmallanzettlich, Bl. klargelb, feinstrahlig, 20—30, VII—VIII			
helenium, B. groß, herzförmig, Bl. gelb, 100—200, VIII		—80	—
IRIS — Schwertlilie — Iridaceae $\times \infty$			
cristata Δ		1.—	—
Einblütig, zartamethyst, weiß und orange, 5—10, VI—V			
germanica, Deutsche Schwertlilie		—80	—
Bl. violett, braun geädert, 30—60, V—VI			
germanica-Hybriden in folgenden Sorten:			
— Ambassadeur, violett, 60 s		—80	—
— Balder, gelboliv, und pflaumenfarbig, 60, s		—60	—
— Corrida, hellila und dunkellila, 80 s		—60	—
— Dalila, gelbweiß, violett und scharlachrot, 70—80, s		—60	—
— Dr. Thouvenet, rötlichlila, teils dunkler, 40—50, s		—60	—
— Eckesachs, lavendelblau, groß, 75, f		—80	—
— Empress of India, hellblauviolett, 80—100, s		—60	—
— Flammenschwert, dunkelgelb, und samtigbraun, 60—70, m		—80	—
— Folkwang, rosa und weinrot, braungelb geädert, 50—70, m		—80	—
— Gajus, reingelb, weißgrundig mit Purpur u. Gelb, 50, m		—80	—
— Grace Sturtevant, braunpurpur, dunkelkarmin, 100, m		2.50	—
— Hortense, hellschwefelgelb, bräunlich geädert, 60—80, m		—60	—
— Imperator, weinrot und dunkelpurpur, 60—80, s		—80	—
— Kharput, dunkelviolet, 50, m		—80	—
— Lent. A. Williamson, rotviolett, teils dunkelsamtig, 100, s		—80	—
— Lohengrin, hellblau und hellviolett, 70, s		—80	—
— Lord Lambourne, blau, 80, s		—80	—
— Loreley, hellgelb, rahmfarben mit Purpurblau, 40, f		—60	—
— Mad. Chéreau, milchweiß, Rand azurblau, 90, s		—80	—
— Maori King, dunkelgoldgelb, und schwarzbraun, 40—50, f		—80	—
— Mrs Alan Gray, hellila und rötlich, 60, m		—80	—
— odoratissima, hell-lichtblau, 100, s		—80	—
— Prinzess Viktoria Luise, gelb und lilamauve, 60—70, s		—60	—
— Prosper Langier, hellschokoladen und blutrot, 60, s		1.—	—
— Queen of May, rosalila, 50—70, m		—80	—
— Rheinixie, reinweiß und tief veilchenblau, 100, m		—60	—
— Rheintraube, rein lavendelblau und purpurviolett, 80, m		—80	—
— Richard II, blau; straff, 60—80, m		—80	—
— Riese von Cönnern, lavendelblau, groß, 80, m		—80	—
— Senlac, dunkelweinrot, 90, s		2.50	—

IRIS (Fortsetzung):

	1 St. DM.	100 St. DM.
germanica-Hybriden:		
— Shekinah, schwefelgelb, 80, s	—80	—
— Titurei, dunkelblau, 70, f	—60	—
interregna-Hybriden, in folgenden Sorten:		
— Charmant, hell-lavendelblau, 50, f	—60	—
— Dorothea, hell-katleyenfarbig, 50, f	—80	—
— Freya, perlfarbig, violett geflammt, 40, f	—80	—
— Gentius, blau, 40—50, f	1.—	—
— Golden Bow, dunkelgelb, 40—50, f	3.—	—
— Prince Victor, purpurblau, teils heller, 50, f	—80	—
— Royal, blau, 40, f	—80	—
— Sangreal, schwefelgelb, 40—50, f	1.—	—
kaempferi hybrida lilacina, lavendellila, 70, VII ×	—80	—
— — Montblanc, weiß, 70, VII	—80	—
— — Sämlinge, in schönen Farben gemischt	—70	—
laevigata monstrosa, blauweiß, breit, dreiteilig, 40—60, VII—VIII	1.—	—
ochroleuca gigantea, lichtgelb, 80—100, VI—VII	1.—	—
orientalis gigantea sulfurea	1.—	—
Feinlaubig, Bl. schwefelgelb, 60—80, VII		
— Snow Queen, reinweiß, 80—120, VI	—60	48.—
sibirica Blue King, blau, 80, VI	—60	48.—
— coerulea, Laub grasartig, Bl. blau, 60—70, VI	—60	48.—
— Emperor, lichtblau, 80, VI	—60	48.—
— Phosphorflamme, tief dunkelblau und phosphorblau, 70, VI	—60	48.—
KIRENGESHOMA — Wachsglocke — Saxifragaceae		
palmata, B. weinartig, grob, Bl. gelbe Glocken, 50—70, VIII—IX	1.50	—
KNIPHOFIA, siehe Tritoma		
LAMIUM — Waldnessel — Labiate		
maculatum, Gefleckte Taubnessel	—40	32.—
Niederliegend, B. silberweiß gestreift, Bl. blau, 10—30, VII		
LATHYRUS — Wicke, Platterbse — Papilionaceae		
latifolius, Bl. tiefrosa, bis 200, VII—IX	—80	—
— roseus, Bl. rosa, kräftig gestielt, bis 150, VI—VIII	—80	—
LAVANDULA — Lavendel — Labiate Δ I D H		
spica, B. silbergrau, aromatisch, Bl. lavendelblau, 60, VII—VIII	—40	32.—
LEONTOPODIUM — Edelweiß — Komposite Δ		
alpinum (Gnaphalium leontopodium) Alpen-Edelweiß	1.—	—
B. fzig, Bl. weiße, filzige Sterne, 15, VI—VII Nicht düngen!		
sibiricum altaicum, Blütenstand auffallend groß, 20, VII	1.—	—
LEPTINELLA, siehe Cotula squalida		
LEUCANTHEMUM — Margerite — Komposite ×		
maximum-Sämlings-Hybriden,	—60	—
Bl. weiß, einf., groß, 60—80, ab VII		
— Esther Read, Bl. reinweiß, dicht gefüllt, 70, VII—VIII	1.50	—
— Etoile d'Anvers, (Stern von Antwerpen)	—80	—
Bl. weiß, Mitte klein, gelb, sehr groß, einfach, 100, VII—VIII		
— Niobe, Bl. reinweiß, leicht gewellt, groß, 80, VII—VIII	—80	—
LEUCOJUM — Knotenblume — Amaryllidaceae		
aestivum, Bl. groß, breite, weiße Glocke, 30—50, V—VI Δ B	—80	—
LIATRIS — Prachtscharte — Komposite		
spicata (Scratula spicata) Δ ×	—80	—
B. schmal, Bl. violett-purpurn, schmale lange Spieße, 40—60, VII—VIII		
LIGULARIA, siehe Seneio		

	1 St. DM	100 St. DM
LILIUM — Lilie — Liliaceae Δ		
<i>turbanki</i> , orangegelb, 50—60, VIII	1.50	—
<i>candidum</i> , Madonnenlilie	1.20	—
Bekannte weiße Lilie der Baucrngärten, 80—100, VII		
<i>giganteum</i> (L. <i>cordifolium</i>), Riesenlilie	3.—	250.—
B. herzförmig, groß, Bl. lange, weiße Kelche, 200—250, VII—VIII		
<i>henryi</i> , Bl. orangerot, groß, 200, VIII—IX	2.—	—
<i>marhan</i> (L. <i>martagon</i> x <i>hansonii</i>)	2.50	—
Vielblumig, hellorange, braunrot getuscht, bis 150, VII		
— G. F. Wilson, hellzitronengelb mit Karmin u. Purpur, 100—120, VII	2.50	—
<i>parviflorum</i> , gelb, klein, 50—70, VI—VII	2.—	—
<i>philadelphicum</i> , Orangebecherlilie Δ	2.—	—
Bl. orangerot, 50—75, VII—VIII		
<i>pyrenaicum</i> , Zitronen-Türkenbund	1.50	—
B. zierlich, Bl. zitronengelb, 60—80, V—VI		
— <i>aureum</i> , sattgelb, 60—70, V—VI	1.50	—
— <i>rubrum</i> , rötlichgelb, 60—70, V—VI	1.50	—
<i>regale</i> , Königsilie	1.50	—
B. zierlich, Bl. marmorweiß, außen rosa, 100—150, VII—VIII		
<i>speciosum album</i> , Prachtlilie	2.50	—
B. breit, dunkel, Bl. weiß, groß, edel, 60—80, IX—X		
<i>tigrinum</i> , Tigerlilie	— .70	56.—
Bl. mennigrot, 80—150, VII—VIII		
— <i>plenum</i> , Bl. gefüllt, mit Lachsschimmer, 80—100, VII—VIII	— .70	56.—
<i>umbellatum incomparabile</i> , Feuerlilie Δ	1.50	—
Bl. dunkelorange mit Blutrot, sehr leuchtend, 80—100, VII—VIII		
— <i>Vermillon Brillant</i> , Bl. weinrot, 60—80, VII—VIII Δ	1.50	—
<i>willmottiae</i> , Willmotts Türkenbund Δ	2.50	—
Bl. leuchtend orange, schwarz gefleckt, 70—150, VII—VIII		
— <i>unicolor</i> , Bl. reinrot, große, lockere Str. 70—100, VII—VIII	2.50	—
LIMONIUM , siehe <i>Statice</i>		
LINOSYRIS , siehe <i>Aster linosyris</i>		
LINUM — Lein — Linaceae		
<i>alpinum</i> , Alpenlein Δ	m. Tb.	— .60
Bl. weißlichblau, 30, VII		
LOBELIA — Lobelie — Lobeliaceae		
<i>cardinalis</i> Δ	1.50	—
B. schmal, Bl. lebhaft kardinalrot, 40—80, VII—IX		
LUNARIA — Mondviole — Cruciferae		
<i>rediviva</i> , Silberblatt Δ x Für Trockensträube	— .80	—
B. herzförmig, Bl. lila, Samenscheiden silbern, 30—60, V—VII		
LUPINUS — Lupine — Papilionaceae x		
<i>polyphyllus</i> Hybriden-Sämlinge, schönes Farbenspiel	— .50	40.—
— Russel-Hybriden-Mischung	— .60	48.—
Besonders auffallende, auch schokoladen und orange Töne		
— — <i>Jean of York</i> , dunkelrosa, dicht, straff	— .80	—
LYCHNIS — Lichtnelke — Caryophyllaceae		
<i>alpina</i> , siehe <i>Viscaria alpina</i> und Formen		
<i>galcedonica</i> , „Brennende Liebe“ Δ x	— .60	48.—
Blütenköpfe scharlachrot, 50—100, VII		
<i>viscaria splendens plena</i> , Pechnelke Δ I x	— .60	48.—
Bl. karminrot, gefüllt, Stiele klebrig, 40, V—VI		
LYCORIS — Amaryllidaceae		
<i>squamigera</i> (<i>Amaryllis hallii</i>) Δ D	2.50	—
Zwiebel kugelig, B. schmal, zieht ein, Bl. lilarosa, 50, VII—VIII		

	1 St. DM	100 St. DM
LYSICHITUM — Offenscheide — <i>Araceae</i>		
<i>camtschatcense</i>	4.—	—
<i>B. groß, stengellos, Bl. Calla-artig, Scheide weiß, 50—70, V—VI</i>		
LYTHRUM — Weiderich — <i>Lythraceae</i>		
<i>alatum</i> (<i>L. roseum</i>)	—50	—
<i>Bl. quirlig, sattkarmin, 100—150, VII—VIII</i>		
<i>virgatum</i> Rose Quecn. <i>Bl. rosakarmin, 80—100, VII—VIII</i>	—60	—
MALVA — Malve — <i>Malvaceae</i>		
<i>alcea, reichverzweigt, Bl. zartrosa, 60—80, VI—IX</i> ×	—50	—
MECONOPSIS — Scheinmohn — <i>Papaveraceae</i>		
<i>cambrica</i> (<i>Papaver cambricum</i>) Δ	—50	—
<i>B. blaugrün, Bl. hellgelb, 30—60, V—VIII</i>		
MEGASEA , siehe <i>Bergenia</i>		
MELANTHIUM — Höckerblume — <i>Liliaceae</i>		
<i>virginicum</i> ■	1.—	—
<i>Dicker Wurzelstock, B. grasartig, Bl. rahmweiß, 100, VII</i>		
MENTHA — Minze — <i>Labiatae</i>		
<i>piperita</i> , Pfefferminze D Δ	—50	—
<i>Aromatisch, wuchernd, Bl. lila, 50—80, VI—VIII</i>		
MERTENSIA — Lungenwurz — <i>Boraginaceae</i>		
<i>echioides</i> Δ	—50	40.—
<i>B. hellgrün, sitzend, Bl. dunkelultramarinblau, 15, VI—IX</i>		
MIMULUS — Gauklerblume — <i>Scrophulariaceae</i>		
<i>luteus, Bl. gelb' mit Braun, 30—40, VI</i>	—50	—
MOLTKIA — Moltkie — <i>Boraginaceae</i>		
<i>doerfleri</i> Δ	—50	—
<i>B. lanzettlich, dunkelgrün, Bl. leuchtendblau, 20—40, VI—VII</i>		
MORINA — Kardendistel — <i>Dipsaceae</i>		
<i>longifolia</i> (<i>M. elegans</i>) ×	—80	—
<i>B. stachlig gezähnt, Bl. weißlichrosa, 60—80, VI—VIII</i>		
MUSCARI , siehe <i>Hyacinthus</i>		
NEPETA — Nepte, Katzenkraut — <i>Labiatae</i>		
<i>musini</i> ○○ Δ B	—40	32.—
<i>B. silbergrau, schmal, aromatisch, Bl. himmelblau, 30, V—IX</i>		
— <i>superba</i> , Wuchs dicht, <i>Bl. frischblau, üppig, 30—40, V—IX</i>	—40	32.—
OENOTHERA — Nachtkerze — <i>Onagraceae</i>		
<i>fruticosa, B. dunkelgrün, Bl. goldgelb, 30—60, VI—VIII</i> Δ	—60	48.—
<i>missouriensis</i> (<i>Oe. macrocarpa</i>) Δ	—60	48.—
<i>Niederliegend, Bl. schwefelgelb, groß, 30, VII—IX</i>		
OMPHALODES — Nabelnuß — <i>Boraginaceae</i>		
<i>verna, Frühlings-Vergißmeinnicht</i> Δ ■	—50	—
<i>Kriechend, Bl. himmelblau, 5—15, III—V</i>		
— <i>alba, Bl. weiß, sonst wie die Art</i>	—50	40.—
ORIGANUM — Dost — <i>Labiatae</i>		
<i>officinatum compactum</i> ○○ Δ B I D	—50	40.—
<i>Aromatisch, Bl. rosarila, 15—25, VII—IX</i>		
ORNITHOGALUM — Milchstern — <i>Liliaceae</i>		
<i>umbellatum, Stern von Bethlehem, Elfuhr-Blume</i> Δ	—40	—
<i>Bl. weiß, doldig, 10—30, V, Zum Verwildern!</i>		
OROBUS — Waldwicke — <i>Papilionaceae</i>		
<i>vernus, Frühlings-Waldwicke</i> Δ	—60	—
<i>Bl. leuchtend karmin, 30, III—V</i>		
PACHYSANDRA — Dickanthere — <i>Buxaceae</i> I ■		
<i>procumbens, B. groß, Bodendecke, bis 30</i>	—80	—
<i>terminalis, Schattenbodendecke, B. lebhaftgrün, bis 25</i>	—30	24.—

PAEONIA — Pfingstrose, Gichtrose — Ranunculaceae

albiflora - Hybriden in folgenden Sorten: X

	1 St. DM.	100 St. DM.
— Albatre, elfenbeinweiß, karmin gestreift, 70, m	1.—	—
— Assmannshausen, schneeweiß, 80, s	1.20	—
— Avalanche, weiß, extra groß, 60, s	1.—	—
— Duguescien, lebhaft karminrosa, 80, m	—80	—
— Duke of Wellington, rahmweiß, Mitte elfenbein, 70, f	1.—	—
— Emma, schneeweiß mit lila Anflug, 70, s	1.20	—
— Festiva, mattrosa, ballförmig, dicht gefüllt, 80, m	—80	—
— Festiva maxima, reinweiß, karmin geflammt, 100, f	1.—	—
— Fokker, karminrot, 80, f	—80	—

— FRIESENBLUT Neuheit!

1 Stck. DM. 3.—

Bei dem reichhaltigen Sortiment meiner einfachblühenden Japan-Paeonien als Züchtungsgrundlage habe ich aus den zahlreichen interessanten Sämlingen einen ausgewählt, den ich nach sorgfältiger Prüfung unter dem Namen „FRIESENBLUT“ dem Handel übergebe. Die Pflanze hat gesundes, dunkelgrünes Laub und bringt eine Fülle schalenförmiger Blüten auf straffen, 60—70 cm hohen Stielen hervor. Die Farbe ist leuchtend seidig blutrot, noch gesteigert durch die ballartigen, gelben Staubgefäße in der Mitte der Blütenhülle. Die erprobt wetterfesten Blüten gehören zu den mittelfrühen des Paeonien-Sortimentes.

Mit „FRIESENBLUT“ gebe ich dem Liebhaber der edlen, einfachen Paeonien einen neuen Edelstein für seinen Garten.

— Fragrans, karminrosa, innen lachs, 100, s D	—80	—
— General Bertrand, violettrosa mit Rahmfarben, 120, f	—80	—
— General Mac Mahon, tief purpurkarmin, 80, f	1.—	—
— Ginko-nishiki „Silber-Brokat“	1.50	—
Weiß, purpurn gestreift, mittelgroß, halbgef., 70, m		
— Gretchen, elfenbeinweiß, straff gestielt, 60, m	1.20	—
— Hinodeseikai „Aufgehende Sonne“	1.50	—
Karmin in Rosa übergehend, groß, innen rosig, 80, m		
— Iyakka-to „Blumenbewachsener Turm“	1.50	—
Flach, purpurrosa, Staubbl. strohgelb, bandartig, 80, s		
— Kame-no-kegoromo „Schildkrötengewand“	2.—	—
Purpurkarmin, Mitte weiß, halbgefüllt, 80, m		
— Karafune „Chinesischer Dschunk“	2.—	—
Weiß bis zartrosa, schalenförmig, Mitte rahmweiß, 70, f		
— Kari Rosenfeld, dunkelweinrot, 70 m	1.—	—
— La Rosière, rahmweiß, einfach, Staubbl. gelb, 70, m	—80	—
— Louis van Houtte, samtig kirschrot, dicht gef., 80, m	1.—	80.—
— Madame de Verneville, weiß, karminrot gefleckt, 70, f	1.—	—
— Madelon, silbrig karminrosa, 70 m	1.—	—
— Marie Lemoine, reinweiß, Mitte rahmweiß, 60, s	1.—	—
— Meigetsuko „Mondstrahl“, blaßlilarot, 100, s	1.50	—
— Monsieur de Chavigne, violettrosa, 80 f	—80	—
— Ohirama „Großer Saal“	2.—	—
Dunkelrosa, Staubbl. lockig, bandartig, strohgelb, 80, s		
— Omar Pascha, dunkelpurpur, groß, 100 f	1.—	—
— Prince Charles d'Arenberg, schalenförmig, karmin	—80	—
Mitte ballförmig lilarosa, 80, s		

PAEONIA (Fortsetzung):

albiflora-Hybriden:

	1 St. DM	100 St. DM
— <i>Purpurea superba</i> , dunkelpurpur, halbgef., Staubbl. lebhaft gelb, 100, s	—80	64.—
— <i>Raenthal</i> , silberlila, Staubbl. dunkelgolden, 80 f	1.20	—
— <i>Red Queen</i> , dunkelrosa, einfach, 70 s	—80	—
— <i>Riugegno</i> (Flußname)	2.—	—
— <i>Riuhasen</i> (Flußname)	2.—	—
Matt rosaweiß, Staubbl. weiß, Spitze geflammt, 100, s		
— <i>Rosea elegans</i> , Rand tellerartig, lilarosa	—80	64.—
Mitte ballartig, weißlich rosalila, 100, f		
— <i>Rubens</i> , rosa mit Lachs, großer hoher Ball, 80, f	—80	—
— <i>Seioba</i> (Frauennamen)	2.—	—
Dunkelrosa, fast einfach, Staubbl. bandartig, gewellt, strohgelb, 60, s		
— <i>Soeur Melanie</i> , dunkelpurpur, 80, s	1.—	—
— <i>Someganoko</i> , „Gefleckte Hirschfarbe“	2.—	—
Karmin, Staubbl. rot und gelb, 100, s		
— <i>Tamabotan</i> , „Perle“, rahmweiß, schwach rot gestr., 80, s	1.50	—
— <i>Tsingtau</i> , weinrosa, Mitte rahmfarben, 80, m	1.50	120.—
— <i>Victoire tricolore</i> , dunkelrot, Staubbl. gelb, 70, m	—80	64.—
— <i>Walter Faxon</i> , reinrosa, Mitte dunkler, 70, m	1.—	—
— <i>Yamatosangai</i> , rosa mit Weiß u. Hellgelb, halbgef., 80, m	2.—	—
— <i>Zansetsu</i> , „Frühlingsschnee“	2.—	—
Reinweiß, sehr groß, einfach, 60, s		
— <i>Hybriden-Sämlinge</i> , in schöner Farbmischung	—60	—
— <i>Hybriden-Sämlinge</i> japanischer Sorten	—80	—
<i>anomala</i> , rosalila, klein, einfach, 50, V—VI	—80	—
— <i>alba</i> , weißblühend, sonst wie die Art	—80	—
<i>arborea</i> Moutan, Baum-Paeonie	1.20	—
B. blaugrün, Bl. purpurn, 50—80, V—VI		
<i>lutea</i> , strachig, Bl. gelb, einfach, 80—100, VI—VII	1.50	—
— <i>delavayi</i> , strachig, Bl. stumpfrot, einf., 80—100, VI—VII	1.50	—
<i>officinalis</i> , echte Bauern-Pfingstrose, „rosa einf.“, 80, V	—80	—
— <i>alba plena</i> , groß, weiß gefüllt, 80, V	2.—	—
— <i>lobata</i> , einfach, rosa, 80, V	1.50	—
— <i>rosea plena</i> , groß, rosa gefüllt, 80, V	2.—	—
— <i>rubra plena</i> , groß, blutrot gefüllt, 80, V	2.—	—
<i>velutchi</i> , B. zierlich zerteilt, Bl. purp. karminrot, einf., 50, V—VI	—80	—

PAPAVER → Mohn — Papaveraceae

cambricum, siehe Meconopsis

orientale in folgenden Sorten: ×

— <i>Lord Lambourne</i> , orange, tief geschlitzt, 60—70, V—VI	—80	—
— <i>Peter Pan</i> , kirschrot, 30—40, V—VI	—70	—
— <i>Prinzess Victoria Luise</i> , zart lachsrosa, 80—100, VI—VII	—70	—
— <i>Salmon Glow</i> , leuchtd. lachsfarbig orange, 50—60, VI—VII	—80	—
— <i>Sturmflackel</i> , feurigrot, windfest, 30—40, VI—VII	—80	—

PARONYCHIA — Mauerraute — Caryophyllaceae

<i>nivea</i> , B. filzigwollig, Bl. weiß, 5, V—VII I Δ	—40	32.—
--	-----	------

1 St.
DM 100 St.
DM**PELTIPHYLLUM** (Saxifraga) — Saxifragaceae**peltatum**, Schildblatt-Steinbrech

B. groß, als Vogeltränke, Bl. rosa, 60—80, IV—V

— .60

—

PHLOX — Flammenblume — Polemoniaceae**douglasii hybrida**, lilarot, 5, IV—V Δ I

— .60

—

paniculata (Ph. decussata)-Hybriden, in folgenden Sorten: \times VI—X— **Aida**, tief weinrot, Auge scharlach, 50—60, s

— .80

—

— **Carmen**, leuchtend dunkelweinrot, dicht, 50, s

— .70

—

— **Erntefeuer**, leuchtend lachskarmin, 70, s

— .80

—

— **Europa**, weiß mit karmin Auge, 100, f

— .60

—

— **Eva Förster**, feurig lachsrot mit Weiß, 80, f

— .60

48.—

— **Feuerreiter**, erdbeerrot, 100, m

— .80

64.—

— **Frau Alfred v. Mauthner**, lachszinnober, 60—70, s

— .80

64.—

— **Frau Anton Buchner**, dunkelgrün, Bl. weiß, 80, f

— .60

48.—

— **Fräulein v. Laßberg**, reinweiß, 50—60, s

— .80

—

— **Frithjof**, tief lilarosa, 100, m

— .60

—

— **Georg Stipp**, lachsrot mit Auge, 100, m

— .80

64.—

— **Junius**, lachsrot, 80, sehr früh

— .70

56.—

— **Kapitän König**, lachsrösa, Mitte blutrot, 60, m

— .80

—

— **Kirmesländer**, schneeweiß, Auge rot, 100, s

— .80

—

— **Le Mahdi**, tief dunkelblau, 70, s

— .70

—

— **Nelkendom**, nelkenrosa, 40—60, s

— 1.—

—

— **Paul Hoffmann**, magentarot, straff, 100, m

— .80

64.—

— **Professor Went**, rubinpurpur, 70, m

— .80

—

— **Rosenteller**, leicht lilarosa, groß, 50, m

— 1.—

—

— **Septemberglut**, lachskarmin, 100, s

— .70

56.—

— **Septemberschnee**, reinweiß, 100, s

— .80

64.—

— **Spätrot**, warm zinnoberrot, 100, s

— .80

64.—

— **Wenn-schon-denn-schon**, purpurviol. m. hell. Stern, 80, m

— .80

—

— **William Ramsay**, tief violettpurpur, 100, f

— .70

56.—

— **setacea atripurpurea**, tief dunkelrosa, 20, V I Δ

— .60

—

— **Daisy Hill**, karminpurpur, 15—20, V I Δ

— .60

48.—

— **Leuchstern**, karminrosa, sternartig, 10—15, V I Δ

— .80

64.—

— **Schneewittchen**, weiß, 10, IV—V I Δ

— .70

—

— **subulata**, siehe Phlox setacea und Formen— **suffruticosa Magnificense**, Bl. purpurkarmin, 70, VI—VII \times

— .60

48.—

PHYSOSTEGIA — Drachenkopfbiume — Labiate \times — **virginiana imbricata**, Bl. violett, 100—120, VII—VIII

— .60

—

PHYTEUMA — Teufelskralle — Campanulaceae— **scheuchzeri**, Bl. himmelblau, 20—30, VII—VIII Δ

— .60

—

PLATYCODON — Ballonblume — Campanulaceae \times — **mariesi macranthum**, Bl. blau, breite Glocken, 50—60, VII—VIII

— .60

48.—

PODOPHYLLUM — Fußblatt — Berberidaceae— **emodi**, Maiafel, Alraune \div ■

— 1.50

—

— B. groß, Austrieb schön, Bl. weiß, Fr. eiförmig, rot, 40—60, V

— **majus**, Fr. noch größer, sonst wie die Art

— 1.50

—

POLEMONIUM — Sperrkraut — Polemoniaceae B— **coeruleum**, Himmelsleiter, Bl. himmelblau, 50—70, VI—VII

— .50

40.—

— **richardsoni**, Bl. groß, himmelblau, 40—60, IV—V u. VII—VIII

— .80

—

— **album**, Bl. weiß, sonst wie die Art

— .80

—

POLYGONATUM, siehe Convallaria polygonatum

	1 St. DM	100 St. DM
POLYGONUM — Knöterich — Polygonaceae I		
<i>affine</i> , kriechend, B. lanzettl., Bl. rosa Ähren, 15—20, VIII—X	—50	40.—
<i>bistorta</i> , Otternzunge, Wiesenknöterich B	—50	—
Rötlichweiß, bis 100, V—VIII, Wildfutter!		
<i>reynoutria</i> , zum Verwildern als Bodendecke	1.—	—
B. grün, rau, derb, Bl. johannisbeerrot in achselständ. Trauben, 25—40, VII—X		
<i>weyrichi</i> , Bl. grünlichweiß, 150, IX, B	—60	—
POTENTILLA — Fingerkraut — Rosaceae		
<i>nepalensis willmottiae</i> , Bl. weinrot, 25—40, V—VIII Δ	—60	48.—
PRIMULA — Primel — Primulaceae		
<i>acaulis</i> Berliner Rot, weinrot, 15—20, IV—V Δ	—80	64.—
— Werner Dorn, hellweinrot, 10—15, IV—V Δ	—80	—
<i>amocna</i> Pliger Kamaruta, bordeauxrot, 15—20, IV—V Δ	—80	—
<i>auricula-Hybriden</i> (Pr. pubescens), Garten-Aurikel Δ	—70	56.—
B. dick, graugrün, Bl. groß, schönes Farbenspiel, 10—20, V—VI		
<i>bullesiana</i> , Terrakotta-Primel Δ ×	—50	40.—
Etagenprimel, rot, orange und gelbe Töne, 60—80, VI—VII		
<i>clusiana</i> , purpurrosa, 5—10, IV—V Δ	—80	—
<i>denticulata</i> , Kopf- oder Ballprimel Δ	—60	—
Dichte, lichtblaue Blütenköpfe, 20—30, III—IV		
<i>florindae</i> (Pr. sikkimensis florindae) Δ ×	—50	40.—
B. groß, üppig, Bl. gelb, nickend, 60—80, VI—VIII D		
<i>helenae</i> Dr. van Vleuthen, hellrot, 10—15, III—IV Δ	—80	—
— Gartenglück, mattrosa mit Lachsschein, 10—15, III—IV Δ	—70	—
— Tuchers Varletät, violett, 10—15, III—IV Δ	—70	—
<i>hybrida</i> Olympiagrüß, lilarot, 15—20, III—V Δ	—80	—
<i>japonica purpurea</i> , Japan-Etagenprimel Δ	—50	40.—
Bl. leuchtend dunkelkarmin, 30—60, V—VIII		
<i>juliae</i> , Kaukasus-Teppichprimel Δ	—80	—
Bl. lebhaft dunkelviolet, kleinlaubig, 5, IV—V		
<i>luteola</i> , rein primelgelb, langröhrig, 10—20, IV—V	—70	—
<i>officinalis</i> , Himmelsschlüssel, Schlüsselblume Δ ×	—50	—
Dottergelb, langröhrig, 15—30, V—VI		
<i>velut</i> , sattkarmin mit orange Stern, 20, V—VI Δ	—80	—
<i>veris clatior grandiflora</i> , Bunte Gartenprimel Δ ×	—50	40.—
Mischung bester Farben und großblumiger Formen		
PTEROCEPHALUS — Federköpfchen — Dipsaceae		
<i>parnassi</i> (Scabiosa pteroccephala) Δ	m. Tb.	1.—
Rasig, Bl. rosa, 10—20, ab VI		
PULMONARIA — Lungenkraut — Boraginaceae B		
<i>angustifolia azurea</i> , blau, 15—30, IV Δ ■	—60	48.—
<i>rubra</i> , rot, 30—40, IV—V	—60	48.—
<i>saccharata variegata</i> , B. weiß gefleckt, Bl. rotviolett, 10—30, III—IV Δ ■	—60	—
PULSATILLA, siehe Anemone pulsatilla und Formen		

	1 St. DM	100 St. DM
PYRETHRUM — Insektenpulverpflanze — Komposite X		
roseum-Hybriden, in folgenden Sorten: V—VI u. Herbst		
— Alfred Mikkelsen, dunkelrot, einfach, 60—70	1.—	—
— Elleen May Robinson, mattrosa, einfach, 60—70	1.—	—
— Queen Mary, silberrosa, gefüllt, 50—60	1.—	—
RODGERSIA — Schaublatt — Saxifragaceae		
aesculifolia, B. kastanienartig, Bl. weiß, 80, VII	1.50	—
pinnata, B. fingerig, Bl.-Rispen rotgestielt, 80—120, VII—VIII	1.50	—
— alba, Bl. reinweiß, 80, VII	1.50	—
— rubra, B. u. Bl.-Schäfte besonders rot, 80, VII	1.50	—
— superba, Austrieb rot, Bl. rosa, Fr. tiefrot, 100, VII	2.—	—
podophylla, B. gelappt, Bl. grünlichweiß, 60—80, VII	1.50	—
sambucifolia, B. holunderartig gefiedert, Bl. weiß, 60—80, VII	1.50	—
RUDBECKIA — Sonnenhut — Komposite X		
occidentalis maxima, hellgelb, groß, 100—200, VI—VIII	—60	—
speciosa (R. neumanni), orangegelb, 20—40, VIII—Frost	—60	48.—
RTA — Raute — Rutaceae		
graveolens, B. fein, Bl. gelb, 80—100, VII—IX D	—80	—
SAGINA , siehe Spargula pilifera		
SALVIA — Salbei — Labiate		
bulleyana, B. grün, derb, Bl. mattblau, 50, VI—VII	—80	—
officinalis, B. graufilzig, Bl. violett, 80—100, VI—VII D	—60	—
SANTOLINA — Heiligenblume — Komposite		
lindavica, B. silbrig, Bl. hellgelb, 30, VII—VIII Δ I m. Tb.	—60	48.—
pinnata, B. grün, Bl. weiß, 30—40, VII—VIII Δ I „	—60	48.—
tomentosa, B. silbergrau, dicht, Bl. gelb, 50, VII—VIII Δ I „	—60	—
viridis, B. grün, Bl. hellgelb, 30—40, VII—VIII Δ I „	—60	—
SAPONARIA — Seifenkraut — Caryophyllaceae		
ocymoides, kriecht, Bl. rosenrot, 10—20, ab VI Δ „	—60	—
SATUREJA — Quendel — Labiate		
pygmaea lilacina, B. schmal, graugr., Bl. bl., 20—25, VI—VII Δ	—60	—
SAXIFRAGA — Steinbrech — Saxifragaceae Δ I		
(Siehe auch Bergenia)		
alzoön, Traubensteinbrech	—60	—
B. silbrig, rosettig, Bl. weiß, 20—30, V—VII		
— carinthiaca, B. silbrig, Bl. weiß, 20—25, V—VI	—60	48.—
— lutca, krustig, Bl. milchweiß, 20, V—VII	—60	—
andrewsi, wertvoll für Einfassungen	—30	24.—
Rosetten frischgrün, Bl. weiß, 20—40, VI—VII		
apiculata, B. glänz. hellgr., Bl. groß, primelgelb, 10, III—IV, m. Tb.	—80	—
arcndsi magnifica, zart helirosa, 15—25, IV—VI „	—60	48.—
— Purpurmantel, dichtpolsterig, satt karminpurpur, 20, IV—VI „	—60	48.—

SAXIFRAGA (Fortsetzung):

	1 St. DM	100 St. DM
<i>arendsi rosea superba</i> , dicht, karminrosa, 20, IV—VI m. Tb.	—60	—
— Schneeteppich, schneeweiß, 15, IV—V	—60	48.—
— Schwefelblüte, hellschwefelgelb, 10—15, V—VI	—60	48.—
<i>cotyledon</i> (S. pyramidalis) ×	—80	—
Robuste Rosetten, Bl. weiß in hohen Rispen, 50—70, V—VI	—70	—
<i>elisabethae ochroleuca</i> , krustig, Bl. schwefelgelb, 10—15, III	—70	—
<i>geuderi</i> , krustig, Bl. hellgelb, 10, IV	—70	—
<i>geum haworthi</i> , Bl. weiß, 10—20, V—VI *	—50	40.—
<i>haagi</i> , Bl. dunkelgelb, 10, IV	—50	—
<i>hybrida Mrs. Leng</i> , Bl. gelb, 10, III	—80	64.—
<i>lingulata</i> , krustig, silbrig, Bl. weiß, 20—30, VI—VII	—70	—
— <i>alberti</i> , stumpfblättrig, Bl. weiß, 20, VI—VII	—70	56.—
— <i>lantoscana</i> , B. kurz, Bl. weiß, 25—30, VI—VII	—70	—
— <i>major</i> , dichtpolsterig, Bl. weiß, 30—40, VI—VII	—70	—
<i>longifolia</i> , krustig, Bl. weiß, 50—70, VI—VII m. Tb.	1.—	—
— <i>superba</i> , Bl. in breit. Rispen, weiß, 40—60, VI—VII	1.25	—
<i>marginata cariophylla</i> , silbrig, Bl. weiß, 10—15, IV	—80	—
— <i>rochelliana</i> , silbrig, kleinrosettig, Bl. weiß, 5, V—VI	—80	—
<i>media</i> , B. silbrig, krustig, Bl. rot, 5—10, IV—V	1.—	—
<i>obristi salomoni</i> , Bl. creme, 5, IV	—70	—
<i>oppositifolia latina</i> , Bl. mattpurpurrosa, 5, V	1.—	—
<i>peltata</i> , siehe <i>Peltiphyllum peltatum</i>	—	—
<i>petraschi</i> , silbrig, Bl. weiß, 5—10, IV	—70	—
<i>pseudo-borisi</i> , B. bläulich krustig, Bl. gelb, 5, III	—70	—
<i>pyramidalis</i> , siehe <i>S. cotyledon</i>	—	—
<i>rotundifolia</i> , Bl. weiß, 20—30, VI—VII	—60	—
<i>sancta</i> , Bl. zitronengelb, 5—10, III—IV m. Tb.	—70	—
<i>suendermanni kellereri</i> , Bl. groß, rosenrot, 5, III—IV	1.—	—
<i>umbrosa</i> , Porzellan-Steinbrech, rosettig, Bl. weiß, 25, VI	—40	—

SCABIOSA — Grindkraut — Dipsacacee

<i>caucasica</i> Diamant, Bl. himmelblau, 50—60, VI—IX ×	—80	—
<i>pterocephala</i> , siehe <i>Pterocephalus parnassi</i>	—	—

SEDUM — Mauerpfeffer — Crassulaceae Δ I OO

<i>acre</i> , B. klein, gelbgrün, Bl. gelb, 5, IV—V	—30	24.—
<i>album chloroticum</i> , B. klein, grün, Bl. weiß, 5—10, VI	—40	32.—
— <i>murale</i> , B. dunkel, Bl. weiß, 10—15, VI	—40	32.—
<i>anopetalum</i> , Bl. schwefelgelb, 20—25, V—VI	—50	—
<i>clongatum</i> , Bl. dunkelrotbraun, 40, VI—VII	—60	—
<i>ewersi</i> , B. bläulich, Bl. rosarot, 10—15, VIII—IX	—50	40.—
— <i>homophyllum</i> , B. weißgrün, Bl. weiß, 5, V—VI	—50	—
<i>hartmanni</i> , B. bläulich, Bl. weiß, 15, VI—VII	—50	—
<i>hybridum</i> , B. sattgrün, Bl. gelb, 20, VI—VII	—30	24.—
<i>laconicum</i> , rasenartig, B. graugrün, Bl. weiß, 5—10, VI—VII	—30	24.—
<i>lydium</i> , B. grün, Bl. rötlichweiß, 5—10, V—VI	—30	24.—
— <i>glaucum</i> , B. blau, Bl. weißlich, 5—10, V—VI	—50	—
<i>oreganum rubrum</i> , B. rot, Bl. gelb, 10—15, V—VI *	—60	48.—
<i>rupestre</i> , Blautannensed., B. graubl., Bl. goldgelb, 15—25, VII	—40	—
<i>sarmentosum</i> , B. hellgrün, Bl. blaßgelb, 5—10, VI—VII m. Tb.	—60	—
<i>sicboldi</i> , B. graubl., Bl. rosa, 20, VI—VII, Ampelpflanze	—80	—
<i>spathulifolium purpureum</i> , B. rot, Bl. gelb, 10—15, VI—VII	—70	—
<i>spectabile</i> Carmen, B. dick, Bl. dunkelrosa, breit, 30—40, IX—X	1.—	—
<i>spurium album superbum</i> , Bl. reinweiß, groß, 15—30, VII	—50	—
— Schorbuser Blut, B. gerötet, Bl. blutrot, 10—15, VI—VII	—70	56.—
<i>telephium fabaria</i> , B. breit, dick, Bl. rosa Dold., 20—30, VII—VIII	—80	—

	1 St. DM	100 St. DM
SEMPERVIVUM — Hauslauch, Hauswurz — <i>Crassulaceae</i> Δ I ∞		
<i>atriviola</i> <i>aceum</i> , Rosette groß, violettrot, Bl. gelb	— .60	48.—
<i>borisi</i> , R. mittel, stark behaart, dicht, Bl. gelb	— .60	—
<i>calcaratum</i> , R. groß, grün, Bl. gelblich	— .40	32.—
<i>hybridum</i> Alpha, R. mittel, weißbehaart, Bl. rosa	— .50	40.—
— Beta, R. mittel, bräunlich, Bl. dunkelrosa	— .50	—
<i>kosanini</i> , R. mittel, behaart, Bl. weißlich	— .50	40.—
<i>rubicundum giganteum</i> , R. groß, Spitze rot, Bl. rot	— .80	—
<i>tectorum triste</i> , R. groß, rotbraun, Bl. dunkelrosa	— .70	—
<i>valesiacum</i> , R. mittel, wollig, Bl. gelb	— .60	48.—
<i>violaceum</i> , R. mittel, Bl. gelb	— .60	48.—
SENECIO — Kreuzkraut, Goldkerze — <i>Komposite</i> \times B		
<i>clivorum subrenatum</i> (Ligularia)	1.—	—
B. breitrund, Bl. gelb, abgestumpft, 80—100, VII—VIII	—	—
— <i>Othello</i> , B. dunkelrot, Bl. tieforange, 120—150, VII—VIII	1.—	—
<i>hessei</i> (Ligularia)	1.25	100.—
B. groß, dreieckig, Bl. leuchtend orangegclb, große Rispen, 150—200, VII	—	—
<i>palmatilobus</i> (Ligularia)	1.25	—
B. schön zerteilt, Bl. lebhaft gelb, 120—150, VI—VII	—	—
<i>wilsonianus</i> (Ligularia)	1.—	—
B. groß, Bl. gelb, schmale, spitze Rispen, 150—180, VIII	—	—
SERRATULA , siehe <i>Liatris</i>		
SIDALCEA — Doppelmalve — <i>Malvaceae</i> B \times		
<i>hybrida</i> Mrs. Lindbergh, Bl. dunkelrubinrot, 50, VII—VIII	1.—	—
<i>oregona</i> Rosy Gem, Bl. tiefrot, 100—120, VII—VIII	— .60	48.—
SILENE — Leimkraut — <i>Caryophyllaceae</i> Δ		
<i>acaulis exscapa</i> , zierliche Polster, Bl. hellrosenrot, 5, V m. Tb.	— .60	—
<i>alpestris plena</i> , Bl. weiß, gefüllt, 10—15, V—VI	— .70	—
<i>schafta</i> , Bl. leuchtendrosa, 10—15, V—VI	— .60	—
SMILACINA — Falscher Salomonssiegel — <i>Liliaceae</i>		
<i>raccmosa</i> , B. grün, Bl. weiße Kopfdolden, 40—60, VII—VIII ■	— .60	—
SOLANUM — Nachtschatten — <i>Solanaceae</i>		
<i>dulcamara</i> , klettert, Bl. tiefviolett, 100, VI—VIII	1.—	—
SOLDANELLA — Alpenglöckchen — <i>Primulaceae</i>		
<i>alpina</i> , Bl. lilarosa, 5—10 III—IV Δ m. Tb.	— .80	—
SOLIDAGO — Goldrute — <i>Komposite</i> B \times		
<i>aspera</i> (S. rugosa), Bl. gelb, langfederig, 150—180, IX—X	— .50	40.—
<i>elliptica</i> , Bl. goldgelb, breit, 40—60, VIII—IX	— .50	—
<i>hybrida</i> Frühgold, Bl. gelb, langfederig, straff, 100—120, VIII	— .50	40.—
— Goldstrahl, straff, Bl. goldgelb, dicht, 70—90, VIII—IX	— .50	—
— Schwefelgeysir, Bl. locker, gelb, 70—90, VII—VIII	— .80	—
<i>virgaurea nana</i> , straff, windfest, Bl. gelb, 30—50, VIII—IX	— .50	40.—

	1 St. DM.	100 St. DM.
SPERGULA — Knebel, Mastkraut — <i>Caryophyllaceae</i>		
<i>plifera</i> (<i>Sagina subulata</i>) I B $\infty \Delta$	—40	32.—
Moosartiger, grüner Rasenersatz, Bl. weiße Sternchen, 3 VI—VIII		
SPIRAEA — Spierstaude — <i>Rosaceae</i>		
<i>aruncus</i> (<i>Aruncus silvester</i>) Prinzenfeder	1.—	—
Männliche Form, Bl. in großen weißen Ständen, 80—120, VII—VIII		
— weibliche Form, Bl. mehr grünlich	1.—	—
— <i>kneiffi</i> , B. dunkelgrün, feingefiedert, Bl. weiß, 60—80, VI—VII	1.50	—
<i>filipendula plena</i> , „Mädestuß“	—60	—
Grüne Blattrosette, Bl. weiß, gefüllt, 20—40, VII—VIII		
<i>humboldti</i> , B. hellgrün, Bl. weiß, 80—120, VII—VIII	1.—	—
<i>palmata</i> , Bl. leuchtend rosarot, 75, VI—VII	—60	48.—
STACHYS , siehe <i>Betonica grandiflora superba</i>		
STACHYS , siehe <i>Betonica grandiflora superba</i>		
<i>armeria</i> , siehe <i>Armeria maritima</i>		
<i>auriculaefolia</i> (<i>Limonium binervosum</i>)	—50	40.—
Kleinste Art, Bl. rosa, 10—15, VII—VIII		
<i>globulariaefolia</i> , Bl. lila, 15—20, VII—VIII	—50	40.—
STENANTHIUM — Federwolke — <i>Liliaceae</i>		
<i>robustum</i> , Schaft kräftig, Bl. weiß, überhängend, 150, VII—IX	1.50	—
SUGEROKIA , siehe <i>Heloniopsis japonica</i>		
SYNTHYRIS — Frühlingsschelle — <i>Scophulariaceae</i>		
<i>reniformis</i> , Bl. violett, 15—25, IV $\Delta \blacksquare$	—60	48.—
TELEKIA , siehe <i>Bupthalmum speciosissimum</i>		
TEUCRIUM — Gamander — <i>Labiatae</i>		
<i>chamaedrys</i> Δ I H	1000 St. DM 120.—	—20 16.—
B. klein, dunkelgrün, Bl. lilarosa Rispe, 30—50, VII—IX		
<i>cinerum</i> , B. graugr., Bl. gelblichw. 10—15, VIII—X $\Delta \infty$ m. Tb.	—60	—
<i>incanum</i> $\Delta \infty$	—60	—
B. weißwollhaarig, dicht, Bl. weiß, 10—15, VIII—X		
THALICTRUM — Wiesenraute — <i>Ranunculaceae</i> B		
<i>aquilegifolium</i> , Bl. dunkellila, 80—100, VI—VII	—60	—
— <i>album</i> , Bl. weiß, 80—100, VI—VII	—60	—
— <i>purpureum</i> , Bl. purpur, 80—100, VI—VII	—60	—
<i>diptrocarpum</i> , Tibet-Amstelraute	—80	64.—
B. sehr zierlich, Bl. dunkelpurpur, 100—150, VII—IX		
<i>flavum</i> , B. grün, Bl. schwefelgelb, 150—200, VII—VIII	—60	—
<i>minus adlantifolium</i> , B. zierlich, grau, 20—40, VII—VIII Δ	—60	—
THYMUS — Thymian — <i>Labiatae</i> B I D Δ		
<i>cltrlorus</i> , B. nach Zitronen duftend, verholzt, 30, VII m. Tb.	—60	—
— <i>aureo-variegatus</i> , B. gelbbunt, sonst wie die Art	—60	—
<i>serpyllum album</i> , B. hellgrün, rasenbildend, Bl. weiß, 5—10, VII	—40	—
— <i>carneus</i> , Bl. fleischfarbig lila, 5—10, VII	—40	—
— <i>coccineus</i> , Bl. karminrot, 5—10, VII	—40	—
TIARELLA — Schaumblüte — <i>Saxifragaceae</i> $\Delta \blacksquare$		
<i>cordifolia</i> , B. frischgrün, kriechend, Bl. weiß, 20—30, IV—V	—40	32.—

		1 St. DM	100 St. DM
TRADESCANTIA — Dreimasterblume — <i>Commelinaceae</i>			
virginiana alba, B. breit grasartig, Bl. reinw., 40—60, VI—VIII	— .60	—	
— I. C Wegucilin, Bl. schön rein blau, 60—80, V—IX	— .70	—	
— Leonora, Bl. tiefviolett, groß, 40—60, VI—VIII	— .70	—	
TRITOMA (Kniphofia) — Fackellilie — <i>Liliaceae</i> ×			
galpini, Bl. orange safranfarbig, 60—80, VII—IX	1.50	—	
hybrida Royal Standard, Bl. gelb m. Scharlach, 70—90, VII—IX	1.50	—	
tucki, Bl. gelbrot, 75, VI—VIII Besonders hart!	1.25	100.—	
TROLLIUS — Trollblume — <i>Ranunculaceae</i> ×			
asiaticus Exelsior, Bl. feurig orangerot, 30—50, IV—V	— .80	—	
europaeus, Bl. hell goldgelb, 50, IV—V	— .80	—	
— giganteus, Bl. dottergelb, groß, 50—70, IV—V	— .80	—	
hybridus Commander on Chief, Bl. dklgelb, 60—80, IV—V	— .80	—	
— Goldquelle, Bl. goldgelb, 50—70, V	— .80	—	
— Golden Monarch, Bl. dottergelb, groß, 40—50, V	1.—	—	
— Sämlings-Mischung, Bl. in gelben Tönen, 50—70, V	— .50	40.—	
ledebouri, Bl. orange mit breiten Staubbl., 50—80, VI—VII	1.—	—	
TUNICA — Felsennelke — <i>Caryophyllaceae</i> Δ			
saxifraga, Bl. zartrosa, lockere Schleier, 20—30, ab VII	— .60	—	
UVULARIA — Trauerglockenblume — <i>Liliaceae</i>			
flava, Bl. sattgelb, 30—50, IV—V	— .60	—	
grandiflora (U. lanceolata), Bl. hellgelb, 40—60, IV—VI	— .60	—	
VERATRUM — Germer — <i>Liliaceae</i>			
album, B. grün, gefaltet, Bl. weiß, 80—100, VII	1.50	—	
nigrum, B. grün, gefaltet, Bl. dunkelschwarzrot, 80—100, VII	1.—	—	
VERBASCUM — Königskerze — <i>Scrophulariaceae</i> B			
pannosum, B. weißfilzig, Bl. gelb, 150—200, VII—VIII	— .50	—	
phoeniceum, Bl. braunviolett, 80—100, VI—VIII	— .50	40.—	
VERNONIA — Eisenkraut — <i>Komposite</i>			
arkansana (V. crinita), Bl. amarantpurpur, 150—200, IX—X	1.—	—	
VERONICA — Ehrenpreis — <i>Scrophulariaceae</i> Δ			
Neuseeländer-Arten siehe unter „Laubhölzer“			
gentianoides, B. rosettig, Bl. hellblau, 25—40, V—VII	— .50	—	
— angustifolia, B. lanzettlich, Bl. hellblau, 30—50, V—VI	— .60	—	
— stenophylla, B. schmal, Bl. hellblau, 30—50, V—VI	— .60	—	
— variegata, B. weißbunt, Bl. hellblau, 25—30, V—VII	— .60	—	
latifolia, B. graugrün, Bl. tief dunkellila, 60—70, VI—VII	— .60	—	
— Royal Blue, Bl. dunkelblau, 20—30, VI—VII	— .60	—	
longifolia, B. groß, frischgrün, Bl. lila, 60—80, VII—VIII	— .50	40.—	
VINCA — Sinngrün — <i>Apocynaceae</i> I ■			
major, B. groß, dunkelgrün, Bl. blau, 15—25, V—VI Rankt	— .70	56.—	
— maculata, B. gelbbunt, Bl. blau, 15—25, V—VI	— .70	—	
minor, B. klein, Bl. blau, 10—20, V	— .40	32.—	
— plena, Bl. blau gefüllt, 10—20, V	— .60	—	
— roscipena, Bl. rosa gefüllt, 10—20, V	— .60	—	

	1 St. DM.	100 St. DM.
VIOLA — Veilchen — <i>Violaceae</i> $\Delta \times$		
<i>cornuta</i> Altona, Bl. cremegelb, 10—15, ab V	—40	32.—
— Goldelse, Bl. lebhaft gelb, 10—15, ab V	—60	—
— G. Wermig, Bl. dunkelveilchenblau, 15—25, ab V D	—40	32.—
— hybrida Hansa, (Perle von Vierlanden)	—40	32.—
Bl. marineblau mit kleinem weißem Auge, 15—20, ab V		
— W. H. Woodgate, Wuchs kräft., Bl. dklblau, gr., 25—30, ab V	—40	32.—
<i>gracilis</i> Lord Nelson, Bl. dunkelpurpur, 10—15, V	—40	32.—
<i>odorata</i> Königin Charlotte, Echtes Duftveilchen	—40	32.—
Bl. veilchenblau, 10—20, III—IV und Herbst D		
— Triumph, Duftveilchen, Bl. tiefblau, groß, 10—20, III—IV	—50	40.—
VISCARIA — Pechnelke — <i>Caryophyllaceae</i>		
(Siehe auch <i>Lychnis</i>)		
<i>alpina</i> , B. schmal, Bl. rosa, 15—20, V—VI Δ	—50	—
— <i>alba</i> , Bl. weiß, sonst wie die Art Δ	—50	—
WALDSTEINIA — Ungarwurz — <i>Rosaceae</i>		
<i>geoides</i> , B. groß, Bl. gelb, 20—30, VI	—60	—
<i>trifoliata</i> , B. dunkel, Bl. gelb, 10—15, VI Bodendecke!	—30	24.—
YUCCA — Palmlilie — <i>Liliaceae</i> I Δ		
<i>filamentosa</i> , als Solitär im Rasen wertvoll!	m. B.	2.50 —
B. schmal, blaugrau, fädig, Bl. große, weiße Glocken an hohen Schäften, 100—150, VII—VIII		
— <i>elegantissima</i> , Bl. schmal, spitz, Bl. weiß 80,—100, VII—VIII	m. B.	3.— —

Bei Auftreten unbekannter

Pflanzen-Schädlinge und -Krankheiten

sowie zwecks kostenloser Beratung beim Kampf gegen alle Pflanzenfeinde wende man sich an die nächstliegende

Hauptstelle für Pflanzenschutz

die am Sitz der Landwirtschafts- und Bauernkammern überall eingerichtet ist.

Diese Stellen sind stets gut über die örtlichen Verhältnisse unterrichtet und können so am ehesten die richtigen Hinweise geben, wie den aufgetretenen Schädigungen begegnet werden kann.

Winterharte Freiland-Farne

	1 St. DM.	100 St. DM.
ASPIDIUM — Schildfarn, Punktfarn — Polypodiacee		
boothii, 50—70	— .80	—
fillx-mas, Wurmfarne, 50—100	— .60	—
— barnesi, 80	— .80	—
— dacdaleum, 70	— .80	—
— erosum crenatum, 50—60	— .60	—
— furcans, 80—100, wintergrün	— .80	—
— furcatum, 100—120	— .60	—
— lineare polydactylum, 60—80	1.—	—
— paleaceum, 80—100, wintergrün	— .80	—
— propinquum crispum, 30—50, wintergrün	1.—	—
— squamulosum monstrosum, 30—50 I	1.—	—
— subintegrum, 60	— .80	—
pseudomas polydactylum, 40—70	— .80	—
thelypteris, Wasserfarn, 30—50	— .60	—
— uliginosum, 50—70	— .60	—
ATHYRIUM — Frauenfarn — Polypodiacee		
fillx-femina angustatum cristatum, 60—80	1.50	—
— — pulchrum, 50—60	1.50	—
— bisfurcatum, 30—50	1.—	—
— cristatum purpureum, 60—80	1.—	—
— cruciatum crispum, 30—40	1.50	—
— erosum minus, 15—25, Einfassungsfarn!	— .50	40.—
— fritzellae, 40—60	1.—	—
— graminicon, 30—50	1.—	—
— monstrosum, 40—60	1.—	80.—
— multidentatum, 60—80	1.—	—
— pritchardi cristatum, 50—70	1.—	—
— pseudo-victoriae, 40—60	1.50	—
BLECHNUM — Rippenfarn — Polypodiacee		
spicant, 30—40 I	— .80	—
DICKSONIA — Wollfarn — Cyatheacee		
punctilobula, Mattenfarn, 40—70, Einfassungsfarn!	— .60	48.—
ONOCLEA — Sumpffarn — Polypodiacee		
sensibills, 20—30	— .80	—
— Interrupta, roter Austrieb, 20—30	— .80	64.—
OSMUNDA — Traubenfarn — Osmundacee		
regalis, Königsfarn, 60—100	1.50	—
STRUTHIOPTERIS — Straußenfarn — Polypodiacee		
germanica, Trichterfarn, 60—80	— .60	48.—
pennsylvanica, 80—100	— .80	—

Ziergräser

AUSDAUERND

WINTERHART

		1 St. DM.	100 St. DM.
ALOPECURUS — Fuchsschwanz — Gramineae			
<i>pratensis aureo-variegatus</i> , Wiesenfuchsschwanz	.	— .60	—
<i>B. gelbbunt</i> , 30—50, VII			
ARUNDINARIA — Rohrgras — Bambusaceae I			
<i>japonica</i> (Sasa, Bambusa metake), <i>B. grün</i> , 60—100	m. B.	2.—	—
<i>nltida</i> (Bambusa), <i>B. schmal</i> , grün, 150—200	„	2.—	—
ASPRELLA — Flaschenbürstengras — Gramineae Δ			
<i>hystrix</i> (<i>Hystrix patula</i>), <i>B. schilfart.</i> , Ähre weißl., bis 60, VII		1.—	—
AVENA — Zierhafer — Gramineae Δ			
<i>sempervirens notarisii</i> (<i>A. candida</i>), <i>B. blaugr.</i> , 30—50, VIII-IX		— .80	—
BAMBUSA , siehe <i>Arundinaria</i>			
ELYMUS — Haargras — Gramineae			
<i>glaucofolius</i> , <i>Blaugras</i> , <i>B. blaubereift</i> , 100, VII—VIII	.	1.—	—
FESTUCA — Schwingel — Gramineae Δ			
<i>alpina</i> , <i>B. grün</i> , 20, VI—VII	.	— .60	—
<i>crinum ursi</i> , Bärenschwingel, <i>B. grün</i> , 10—20, VI—VII	.	— .60	—
<i>glacialis</i> , <i>B. graublau</i> , zierlich, 10—20, VI—VII	.	— .60	—
HYSTRIX , siehe <i>Asprella</i>			
IMPERATA — Eulalie — Gramineae			
<i>sacchariflora</i> (<i>Miscanthus saccharifer</i>), Silberfahnengras	.	— .80	—
<i>B. breit schilfartig</i> , grün, 120—180, IX—X			
PHALARIS — Glanzgras — Gramineae			
<i>arundinacea picta</i> , <i>B. weißbunt</i> , 80—120, VIII—IX	.	— .60	—
SCIRPUS — Binse — Cyperaceae			
<i>criophorus</i> , <i>B. sattgrün</i> , schmal, 60—100, VIII—IX	.	— .80	—
SESLERIA — Elfengras — Gramineae			
<i>coerulea</i> , <i>Blaues Kopfgras</i> , 10—20, IV—V	.	— .60	—

Bel Bedarf an

Gartenbau-Schrifttum

wende man sich an

„Gärtnerische Fachbuchhandlung
der Deutschen Gärtnerbörse“

(22c) AACHEN, Postschließfach Nr. 224.

Sie besorgt und liefert als Sortimentsbuchhandlung sämtliche Werke, Bücher und Fachschriften aller Verlage des In- und Auslandes.

Verlangen Sie bei obiger Anschrift:

„Buch und Spaten“, das Fachbücher-Verzeichnis.

Druckfehler-Berichtigung

Seite 9: Der Rosen-Sortenname der untersten Zeile muß richtig lauten:
Fisher & Holmes

Seite 65: Fünfte Zeile von unten ist zu streichen. An ihre Stelle ist zu setzen:
officinalis L. Δ I Gewürzstrauch m. Tb. 2.— —

Seite 79: Bei **ACANTHOLIMON** ist der deutsche Name „Stachelnüßchen“
zu streichen und durch „**Igelpolster**“ zu ersetzen.

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen.

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussehen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der Hundertstückpreis gilt, soweit er angegeben ist, bereits bei Abnahme von 50 Stück einer Art und Sorte, der Tausendstückpreis entsprechend ab 500 Stück.
5. Mit dem Erscheinen neuer Angebote oder Verzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

6. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
7. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu packen, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen- oder Wagenladungen nicht eintreten können.
8. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen werden.
9. Für Schaden, die durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorsehuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen.
12. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
13. Gewähr für Echtheit von Obstsorten, Unterlagen und Stammbildnern wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst- und Rosenpflanzen sowie bei anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen.

14. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen 5 Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz.

15. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
16. Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung DM 50.— nicht übersteigt.
17. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verboten ist. Die Lieferung von Rosen der Güteklasse C als Ersatz für Güteklasse A erfordert jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Bestellers.

Muster und Maße.

18. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
19. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
20. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße des Bund deutscher Baumschulen bindend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand.

21. Erfüllungsort ist Weener (Ems). Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ebenfalls Weener (Ems), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl entweder Weener (Ems) oder der Geschäftssitz des Kunden.
22. Bei fachlicher Streitigkeit (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des Bund deutscher Baumschulen entscheidet das Bundesgericht endgültig. Bei Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.

Zusätze der Firma:

Um deutliche und vollständige Angabe des Namens und Wohnortes des Bestellers, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten. Angabe der gewünschten Versandzeit sowie Art des Versandes, ob durch die Post oder Bahn, als Expres- Fracht- oder Eilgut ist notwendig. Unterbleiben diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne aber dann jede Verantwortlichkeit ab. Bei fernmündlich erteilten Aufträgen muß ich jede Verantwortung für Hörfehler ablehnen und bitte daher, schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen zu lassen.

Gartenbaubetriebe werden in ihrem eigenen Interesse höflichst gebeten klare Angaben zu machen aus denen zu ersehen ist, daß sie Wiederverkäufer sind, da nur so die Berechnung einwandfrei erfolgen kann.

WEENER (Ems), im Herbst 1949.

Herm. A. Hesse
Baumschulen, Weener (Ems)

Wegweiser

durch den Hesse-Katalog

INHALT

	Seite
Firma-Angaben	1
Obstsortiment	2—8
Rosen-Sortiment	9—16
Edelrosen-Sorten	9—10
Polyantha-Rosen	11
Kletter-Rosen	12
Park- und Wildrosen	13—16
Koniferen-Nadelhölzer	17—33
Laubhölzer	34—74
Junge Heckenpflanzen	75
Trauerbäume	76
Schlingpflanzen	77—78
Stauden	79—105
Farne	106
Ziergräser	107

ABKÜRZUNGEN

Im Text:

B.	= Blatt
Bl.	= Blüte
Fr.	= Frucht
f	= früh
m	= mittelfrüh
s	= spät
10—20	= Zentimeter-Höhe
III—IV	= Blüh-Monat

Im Fettdruck:

B	= Bienennährpflanze
D	= Duft auffallend
H	= Heckenpflanze
I	= Immergrüne
m. B.	= Mit Ballen
m. Tb.	= Mit Topfballen

Zeichen:

△	= Für Steingärten
✧	= Zierfrüchtig
*	= Schöne Herbstfärbung
×	= Schnittstaude
■	= Für Schattenlage
☉	= Für vollsonnige u. trockene Lage



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)